

*Vous savez
où trouver
des noisetiers ?*
PARTICIPEZ !

À LA CHASSE AUX NOISETTES

**Enquête sur le muscardin
en Provence-Alpes-Côte d'Azur**

Contact :
Pierre Rigaux - LPO PACA
pierre.rigaux@lpo.fr
6 avenue Jean Jaurès,
83400 Hyères
04 94 12 17 62



PACA

À LA CHASSE AUX NOISETTES



La LPO PACA est à la recherche d'un grimpeur habile qui raffole des noisettes : le muscardin.

Vous savez où trouver des noisetiers...

Les noisettes sont rongées par des petits mammifères..

Alors, elles nous intéressent !

Pourquoi une enquête sur le muscardin ?

La LPO PACA lance une grande enquête participative pour préciser la répartition du muscardin dans la région et mieux le protéger.

Très discret, le muscardin semble se raréfier en France, mais on sait peu de choses sur sa répartition. C'est une espèce protégée et, en région PACA, il fait partie des mammifères les moins bien connus.

La connaissance de ce petit mammifère mystérieux passe par la participation de chacun. Participez à la connaissance et à la protection du muscardin, partez à la chasse aux noisettes !

Les données de présence du muscardin seront intégrées à la base de données en ligne www.faune-paca.org. Une synthèse sera proposée à partir des observations faites dans toute la région.

Comment participer ?

1/ Cherchez les noisettes et récoltez des indices!




Tout le monde peut enquêter, nul besoin d'être spécialiste de la faune sauvage. Pour participer, il vous suffit de ramasser des noisettes rongées par le muscardin qui tombent sur le sol de façon plus ou moins éparpillée sous les noisetiers. La meilleure période se situe entre fin août et fin septembre avant que le muscardin entre en hibernation. Néanmoins les restes de noisettes rongées peuvent être trouvés pendant plusieurs mois.

Cherchez dans les zones riches en buissons : ronciers, lisières, haies épaisses, sous-bois riches en végétation, parcelles de régénération forestière de feuillus... Privilégier les noisetiers productifs et âgés en bord de chemin, près de buissons épais, des ronciers ou de chèvrefeuilles, en lisières forestières... Éviter les grands taillis de noisetiers purs sans autre végétation, les noisetiers trop à l'ombre dans les futaies, ou encore les noisetiers trop jeunes et improductifs.

2/ Envoyer vos indices à la LPO PACA

Une fois votre récolte terminée, conservez vos noisettes en ayant pris soin de noter précisément le lieu exact et la date de la récolte. Puis envoyez le tout à : LPO PACA - Pierre Rigaux - 6 avenue Jean Jaurès - 83400 Hyères

IDENTIFIER VOS INDICES



L'identification n'est pas chose aisée ! Les Mulots, les campagnols et les écureuils raffolent également des noisettes. Un examen attentif s'impose donc...



Noisettes rongées par le muscardin

Le trou fait par le Muscardin dans la noisette est très régulier, souvent presque rond. Le bord interne du trou ne comporte pas de traces de dents, et paraît lisse. Des toutes petites traces de dents sont bien visibles sur la partie externe de la noisette. Elles sont obliques par rapport au trou et dessinent comme un cercle clair autour du trou.

Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider à découvrir l'identité du «grignoteur» :

Avant l'envoi des noisettes par courrier, vous pouvez nous faire parvenir par courriel les photos des noisettes en gros plan.



Noisette rongée par un campagnol roussâtre

Noisettes rongées par les mulots, les campagnols et les écureuils

Les mulots et le campagnol roussâtre font un trou de forme moins régulière et dont le bord ne paraît pas lisse. Les traces de dents sont plus visibles et perpendiculaires au trou. Il peut y avoir ou non des traces de dents à l'extérieur autour du trou. Quant à l'écureuil, il casse les noisettes sans laisser de trace de grignotage sur le trou.

Les mulots, les campagnols et l'écureuil roux sont des mammifères communs : on trouve donc beaucoup plus souvent des noisettes rongées par eux que par les muscardins ! Dans tous les cas, conservez les noisettes pour que l'identification puisse être confirmée par un spécialiste.

LE MUSCARDIN

Ce petit mammifère méconnu fait partie de la même famille que le loir et le lérot (les gliridés), comme eux il est nocturne. De la taille d'une souris, de couleur brun orangé, il se déplace avec agilité sur les branches fines des buissons où il vit caché. Il se nourrit de petits fruits sauvages, de fleurs, de bourgeons et d'insectes.

Pour en savoir plus sur le muscardin :

Revue « La Hulotte » n° 59 : « le rat d'Or », excellent numéro consacré au muscardin



Le muscardin

Nom scientifique :

Muscardinus avellanarius

Longueur : 6 à 8 cm plus la queue de même longueur

Poids : entre 20 et 35 g selon la saison

Habitats : milieux buissonnants, jusqu'à plus de 1500 mètres d'altitude

Nourriture : petits fruits, insectes (chenilles, pucerons), fleurs, feuilles, noyaux.

Particularités : pelage brun roux-orangé, grands yeux, longues vibrisses, queue préhensile velue sur toute sa longueur.

Nid d'été : boule de 10 à 15 cm de diamètre dissimulée dans un buisson

Reproduction : 3 à 7 petits naissent en été dans le nid

Hiberne dans un nid caché au sol, d'octobre à mars/avril voire moins en région méditerranéenne.



© Marc CORAIL

Pour plus d'informations sur l'enquête muscardin,

Contactez :

Pierre Rigaux - LPO PACA

pierre.rigaux@lpo.fr

6 avenue Jean Jaurès,

83400 Hyères

04 94 12 17 62