



## J'ai trouvé un jeune Ecureuil roux, Hérisson d'Europe, Loir gris, Lapin de garenne

### A savoir :

Un jeune mammifère qui se déplace au sol doit être surveillé, en prenant soin de rentrer les animaux domestiques. S'il s'agit d'un jeune écureuil et que la femelle adulte est visible, il est préférable de remettre le jeune dans l'arbre et de veiller à ce que sa mère le récupère. Une femelle reprend généralement en charge l'élevage de ses jeunes même après un léger dérangement ou une manipulation. Si le jeune paraît faible, ne se déplace pas, a les yeux fermés, il convient de le prendre en charge en suivant les conseils détaillés ci-après.



**Cas particuliers:**  
**Jeune Lièvre d'Europe et faons:**  
*Référez-vous aux fiches conseils 'jeune lièvre' ou 'faon'*

Durant les premières semaines de sa vie, le levraut ne dégage aucune odeur corporelle qui pourrait attirer les prédateurs. Sa mère n'est pas très loin et le surveille en permanence, revenant régulièrement auprès de lui pour le nourrir. Le pelage du levraut se confond parfaitement avec son environnement le rendant difficile à localiser en sous-bois ou dans les hautes-herbes...

Les cervidés (chevreuil, cerf...) développent cette même stratégie pour assurer la survie des jeunes faons.



**En haut:**  
Loir gris

**A Gauche:**  
Hérisson d'Europe  
Ecureuil roux  
Lapin de Garenne



**Différencier un lapereau d'un levraut:**

Le lapin de Garenne a le pelage uni contrairement au Lièvre d'Europe dont le pelage est de plusieurs couleurs. Malgré leur ressemblance, ces deux espèces n'ont pas les mêmes mœurs ni les mêmes manières d'élever leurs jeunes.



Lièvre d'Europe

## Comment savoir si l'animal doit être pris en charge

### Déterminer la situation

#### Age de l'animal :

- Les yeux sont ouverts et il a beaucoup de poils: il est en train de s'émaniciper.
- Les yeux sont fermés et il a peu ou pas de poils: il n'est pas normal de le trouver seul, il y a donc nécessité de le prendre en charge.

#### Le lieu de la découverte :

- Si l'animal est dans un abri: il est dans un environnement naturel où la mère viendra le chercher.
- Si l'animal est à découvert et seul: il faut évaluer l'état de l'animal et s'assurer que la mère est dans les parages. Si ce n'est pas le cas, il y a nécessité de prendre en charge l'animal.

#### Etat général de l'animal :

- Il y a des blessures apparentes et/ou il semble affaibli: il y a nécessité de le prendre en charge.

Voici quelques situations au cours desquelles un jeune mammifère a besoin d'une prise en charge:

- Un jeune hérisson est seul en plein jour
- Un jeune écureuil faible au pied d'un arbre coupé

### Dans le cas d'une prise en charge nécessaire

#### Préparation du conditionnement de l'animal:

1. Prendre un carton et faire des trous sur le dessus,
2. Mettre du papier journal au fond,
3. Fournir à l'animal un tissu en polaire pour qu'il puisse s'y abriter sans s'emmêler les griffes.

#### Eau et nourriture:

Ne rien donner à l'animal (lait, eau, foin, paille,...), cela peut aggraver son état.

#### Capture de l'animal:

1. Utiliser des gants et un tissu,
2. S'approcher calmement de l'animal et le recouvrir avec le tissu,
3. Le porter le plus proche possible du sol et le déposer dans le carton: une mauvaise chute risque de lui briser les os,
4. Fermer le carton.

#### Conditionnement:

- Le garder dans une pièce au calme,
- **Le maintenir au chaud** (entre 25°C et 28°C) à l'aide d'une bouillotte ou d'une bouteille d'eau chaude emmitouflée dans un tissu, posée dans le carton,
- Le protéger des mouches à l'aide d'un drap déposé sur le carton,
- Contacter rapidement le centre de sauvegarde de la faune sauvage au 04 90 74 52 44,
- Transporter le plus rapidement possible le jeune animal vers un point relais indiqué par le centre.





## GESTES A NE PAS FAIRE

- **Ne pas parler, exhiber ou caresser l'animal:** les animaux sauvages sont très stressés au contact de l'homme, ce qui peut aggraver leur état.
- **Ne pas nourrir:** en fonction de son état, l'animal n'aurait pas la force de digérer et pourrait en mourir. De plus, donner une alimentation non appropriée à des individus très jeunes peut entraîner une mort rapide et douloureuse.
- **Ne pas donner de lait ou d'eau à l'animal:** tous les laits ont des compositions différentes. L'administration du mauvais lait peut empoisonner l'animal et entraîner une mort rapide et douloureuse.



## ATTENTION ! Ne tentez en aucun cas d'élever un jeune mammifère chez vous.

Les soins à la faune sauvage sont très différents des soins à la faune domestique.

Pour favoriser les chances de survie de l'animal, les soins doivent être effectués par des professionnels dans des infrastructures adaptées.

Les conséquences d'une mauvaise prise en charge sont multiples: carences dues à une mauvaise alimentation, blessures suite à un mauvais conditionnement, application de mauvais traitements pour soigner une maladie...

### Exemple d'un écureuil roux élevé par des particuliers pendant deux ans



Il a été trouvé très jeune après une prédation chien, par une famille.

Cette dernière a appliqué tout type de conseils trouvés sur Internet.

Les détenteurs ont attendu deux ans avant de l'apporter au centre de sauvegarde car l'animal leur semblait ne pas bien aller depuis deux semaines. A l'accueil, l'animal était paralysé par une malformation de la colonne vertébrale qui se soudait à cause de carences alimentaires. Un résultat irréversible qui a nécessité l'euthanasie de l'animal.

Ce type d'accueil est très fréquent en centre de sauvegarde.

### Plus vous attendez et plus vous les condamnez !



Jeune écureuil amené rapidement au centre par des particuliers:

**Vie en captivité:** 3 mois puis relâché



Jeune écureuil gardé 3 mois par des particuliers puis amené au centre:

**Vie en captivité:** >1 an puis relâché



Jeune écureuil gardé 2 ans par des particuliers et apporté après l'observation de comportements anormaux:

**Vie en captivité:** La totalité de sa vie



## La faune sauvage et la loi

**La détention d'animaux sauvages est interdite sans autorisation spéciale.**

N'hésitez pas à contacter le centre de sauvegarde ou l'ONCFS de votre département pour plus de renseignements.



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
Provence-Alpes-Côte d'Azur



Fiche conseil faune sauvage en détresse

Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage

Château de l'environnement 84480 Buoux • crsfs-paca@lpo.fr • paca.lpo.fr • Tél. : 04 90 74 52 44

