



J'ai trouvé un Pigeon biset, une Tourterelle turque

A savoir :

Pour des raisons d'hygiène **le centre** régional de sauvegarde de la faune sauvage **ne peut pas accueillir les pigeons et tourterelles.**

I / Il s'agit d'un oisillon :

Etat général de l'animal :

Situation normale : Si le jeune est au sol sans signe de blessures et qu'il n'y a aucune trace de cadavre d'adulte dans les environs alors ce jeune n'est pas en situation de détresse. Il est tombé du nid mais ses parents peuvent continuer à s'en occuper si vous le remettez en place grâce à la méthode de la dernière page.

Situation anormale : Il y a des traces de blessures apparentes et/ou, une de ses pattes semble cassée, et/ou ses deux ailes ne sont pas plaquées de manière symétrique au corps, et/ou il y a à proximité les cadavres de 2 adultes, alors il faut lui porter secours en suivant le protocole décrit dans les pages suivantes.

+ Dans le cas d'une prise en charge nécessaire

1. Conditionner l'animal

- Prendre un carton ou une caisse de transport pour animaux domestiques,
- Tapisser le fond de papier journal et une couche de sopalin,
- Mettre deux petites branches au sol,
- En dehors des canicules, maintenez-le au chaud (entre 25°C et 28°C) à l'aide d'une bouillotte ou d'une bouteille d'eau chaude accolée au carton,
- Le protéger des mouches à l'aide d'un drap ou d'une moustiquaire déposée sur le carton ou autour de la caisse,
- Changer le papier journal tous les jours afin que le plumage ne se salisse pas.



2. Hydrater et nourrir un oisillon peu emplumé :

- A l'aide d'une seringue, faites-lui couler, avant et après chaque nourrissage, des gouttes d'eau sur le bec (jamais directement dans le bec).

- Une fois par jour, donnez-lui une goutte de Tonivit (disponible en clinique vétérinaire) mélangée à la nourriture. C'est une étape très importante pour limiter les risques de carences.

- Confectionnez un jabot artificiel pour nourrir l'oisillon:

1. Procurez-vous une seringue de 20mL, un gant latex et de la pâtée aux œufs si l'oisillon est très peu emplumé, ou des petites graines pour passereaux si l'oisillon est emplumé. (ces aliments sont disponibles en animalerie),
2. Coupez le bout de la seringue et limez,
3. Coupez un doigt du gant et découpez un petit trou au bout,
4. Enfilez le doigt sur la seringue,
5. Mettez du mélange pâtée aux œufs/eau ou des graines dans la seringue,
6. Prenez l'oisillon et passez lui le bec à travers le trou du doigt en latex pour qu'il puisse accéder à la nourriture,
7. Soyez patient pendant les premiers nourrissages, l'oisillon prendra rapidement le réflexe de se nourrir avec cette technique,
8. Nourrissez-le jusqu'à ce que le jabot (la partie sous le bec) gonfle, et attendez qu'il se vide pour refaire un nourrissage.
9. Pour le gavage à la pâtée, à la fin de chaque nourrissage, nettoyez-lui le bec avec un sopalin humidifié avec de l'eau chaude, afin que la pâtée ne colle pas au plumage.

- Lorsque l'oisillon est emplumé, mettez-lui à disposition une petite coupelle avec de l'eau et une petite coupelle avec des graines en plus d'utiliser la technique du jabot artificiel. Une fois qu'il commence à picorer seul, arrêtez la technique du jabot artificiel.



Jeune pigeon biset peu emplumé à gauche



Jeune tourterelle turque emplumée à droite

Technique du jabot artificiel en bas



3. L'apprentissage du vol :

Les pigeons et tourterelles sont des espèces qui se développent très rapidement. Si l'oiseau commence à voler, mettez-lui des perchoirs en hauteur. Une fois qu'il se perche facilement, vous pouvez le faire voler dans une pièce pendant plusieurs jours pour qu'il termine de se muscler. Lorsque l'oiseau vole dans la pièce, ouvrez-lui la fenêtre et laissez-le partir de lui-même. Les premiers jours, il devrait revenir, n'hésitez donc pas à lui mettre des graines à disposition et de l'eau. Lorsque vous décidez de fermer la fenêtre, signalez-le à l'oiseau en mettant des images sur la vitre, autrement il risque de rentrer en collision avec cette dernière, ce qui peut lui être fatal.

II / L'oiseau est un adulte blessé

1. Conditionner l'animal:

- Prendre un carton ou une caisse de transport pour animaux domestiques,
- Tapisser le fond de papier journal et une couche de sopalin,
- Mettre deux petites branches au sol,
- Si l'oiseau vous semble affaibli, maintenez-le au chaud (entre 25°C et 28°C) à l'aide d'une bouillotte ou d'une bouteille d'eau chaude accolée au carton,
- Le protéger des mouches à l'aide d'un drap ou d'une moustiquaire déposée sur le carton ou autour de la caisse,
- Changer le papier journal tous les jours afin que le plumage ne se salisse pas.

2. Hydrater et nourrir l'animal:

Mettez-lui une petite gamelle d'eau à disposition: il ne faut pas que l'oiseau puisse s'asseoir dedans ou la renverser.

Mettez-lui une gamelle avec des graines pigeons-tourterelles à disposition. (n'ajoutez aucun autre aliment).

3. Soigner l'animal:

Dans le cas d'une collision (avec une vitre, un véhicule...) ou d'une prédation, l'animal peut être sonné et un début d'hémorragie à l'intérieur du corps peut être en train de se déclencher, il faut alors laisser l'animal au calme dans le noir pendant 24h. S'il y a des plaies, désinfectez-les tous les jours avec un coton-tige imbibé de désinfectant.

Pour des blessures plus graves, il est nécessaire de consulter un vétérinaire expérimenté dans les soins aux oiseaux.

4. Relâcher l'animal:

Attendez une journée sans vent ni pluie,

Emmenez l'oiseau dans un carton avec du journal au fond et des trous sur le dessus, à l'endroit où vous souhaitez le relâcher,

Ouvrez le carton et laissez l'oiseau sortir de lui-même. Restez une quinzaine de minutes à l'observer pour vous assurer que l'oiseau est prêt.



Tourterelle turque

🔍 Comment replacer un oisillon à proximité de son nid ?

Pour mettre en sécurité un oisillon, munissez-vous :

- ▶ D'un carton **large** à bords hauts
- ▶ De papier journal ou sopalin
- ▶ D'une corde

1. Ouvrez le carton et placez le sopalin ou le journal au fond.
2. Accrochez la corde en forme d'anse de panier sur le dessus du carton.
3. Placez l'oisillon dans le carton.
4. Pendez le carton au bout d'une branche fine et à 1m30 de hauteur **dans un rayon de 50mètres** autour du lieu de découverte.

En l'absence d'arbre vous pouvez déposer ou accrocher le carton à un volet, sur le bord d'une fenêtre, sur un toit,....dans un rayon de 50 mètres autour de l'endroit où vous avez trouvé le jeune animal. Attention le carton doit rester ouvert afin que les parents puissent venir nourrir l'oisillon à l'intérieur. L'oisillon sortira de lui-même lorsqu'il aura la masse musculaire suffisante pour se mettre à l'abri. Ne mettez ni eau ni nourriture dans le carton. En cas de grosses pluies, vous pouvez rentrer le carton pour le ressortir ensuite.



La faune sauvage et la loi

Le Pigeon domestique est considéré comme animal domestique.

La détention d'oiseaux sauvages en captivité est interdite sans autorisation spéciale.

N'hésitez pas à contacter le centre de sauvegarde ou l'ONCFS de votre département pour plus de renseignements.



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur



Fiche conseil faune sauvage en détresse

Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage

Château de l'environnement 84480 Buoux • crsfs-paca@lpo.fr • paca.lpo.fr • Tél. : 04 90 74 52 44

