

ESPAGNE

Bilan ornithologique

- **Du 2 avril au 29 juin 2017**

Claire LEMONNIER
Frédéric MALVAUD
La Tisonnerie
50250 St Nicolas de Pierrepont
frederic.malvaud@bbox.fr
06.83.07.39.55

INTRODUCTION AU VOYAGE

Trois mois au printemps, du 2 avril au 29 juin, nous ont permis de contacter la plupart des oiseaux nicheurs et quelques migrateurs printaniers de la péninsule ibérique. Seuls les oiseaux de l'extrême Sud-Est de l'Espagne et ceux inféodés aux Pyrénées étaient en dehors de notre zone de voyage.

Même avec trois mois disponibles, nous avons dû faire des choix (drastiques !) de secteurs à prospecter et nous nous sommes laissés conduire par le plaisir de la découverte.

Le premier mois (avril) nous a permis de découvrir le Nord-Est (dont Majorque) et quelques sites du Centre-Ouest ; le deuxième (mai) a été consacré à l'Andalousie ; et enfin, en juin, nous avons prospecté l'Estrémadure et le Nord-Ouest.

COTE PRATIQUE.

a) Nous avons fait du camping en nature ; nous dormons sur le toit de la voiture (tente de toit) sur des petits chemins que l'on veut le plus perdus possible. Pas toujours faciles à trouver, mais on y arrive la plupart du temps (un seul échec, dans le parc de Somiedo, Asturies). Cela n'a pas été simple en Andalousie, car souvent il s'agit de grandes propriétés sans chemins publics. Nous avons partout été très bien accueillis par la population, les espagnols sont très chaleureux. Pour ceux qui sont intéressés, nous disposons des plans détaillés des zones de bivouacs (49 au total sur 89 nuits).

b) Cartes : Nous avons utilisé les cartes Michelin par région d'Espagne (1/400 000ème) ainsi que quelquefois des cartes plus détaillées trouvées sur place. Le GPS de la voiture nous a beaucoup aidé, surtout lorsque nous avions des points particuliers avec les coordonnées géographiques.

c) Etat des routes : Elles sont très bonnes partout. Mais attention, les villages espagnols c'est souvent l'aventure...on arrive dans une rue qui devient de plus en plus étroite au fur et à mesure que l'on avance...Donc, éviter d'entrer dans les villages est plus sûr !

d) Eau : Nous avons utilisé (nous avons une réserve de 75 l d'eau à renouveler) les fontaines dans les villages, les sources en montagnes, les stations services, un puits sur le site d'El Burgo, des points d'eau dans des toilettes publiques et de temps en temps avons acheté des grandes bouteilles pour l'eau potable.

e) Climat : En trois mois de printemps, nous avons eu tous les climats, de -5° le matin dans les sierras en avril à la canicule en juin en Estrémadure (mais il y avait la même canicule en Normandie à ce moment !). Nous avons eu des périodes de pluie (surtout fin avril et fin juin), du brouillard, du vent très fort (dans le sud de l'Andalousie, mi mai).

f) Approvisionnement : Aucun problème, il y a des superettes et des distributeurs de monnaie partout.


DEROULEMENT

2	Avril	Dimanche	Voyage vers Vic (Catalogne)
3	Avril	Lundi	Voyage Bateau à 23 h
4	Avril	Mardi	Majorque Cap blanc
5	Avril	Mercredi	Capocorb Portocolom
6	Avril	Jeudi	Portocolom San Jordi
7	Avril	Vendredi	S'Albuféra
8	Avril	Samedi	S'Albuféra Pollença
9	Avril	Dimanche	Tramuntana
10	Avril	Lundi	Ile Cabrera
11	Avril	Mardi	Voyage Bateau et vers Vic
12	Avril	Mercredi	Voyage vers Blancas
13	Avril	Jeudi	Téruel
14	Avril	Vendredi	Albaracin
15	Avril	Samedi	Voyage vers Blancas
16	Avril	Dimanche	Blancas
17	Avril	Lundi	Blancas Voyage vers Gallocanta
18	Avril	Mardi	Voyage vers Ventosa
19	Avril	Mercredi	Ventosa Voyage vers Lagunaseca
20	Avril	Jeudi	Lagunaseca
21	Avril	Vendredi	Lagunaseca
22	Avril	Samedi	Voyage vers Cabaneros
23	Avril	Dimanche	Cabaneros
24	Avril	Lundi	Voyage vers Sierra Canalizas
25	Avril	Mardi	Sierra Canalizas
26	Avril	Mercredi	Voyage vers Sierra Madrona
27	Avril	Jeudi	Voyage vers Sierra de Andujar
28	Avril	Vendredi	Sierra de Andujar
29	Avril	Samedi	Sierra de Andujar
30	Avril	Dimanche	Sierra de Andujar
1	Mai	Lundi	Sierra de Andujar
2	Mai	Mardi	Voyage vers Rincon
3	Mai	Mercredi	Rincon et voyage vers Fuente de Piedra
4	Mai	Jeudi	Fuente de Piedra et voyage vers Ronda

5	Mai	Vendredi	Sierra Los Merinos
6	Mai	Samedi	Sierra Los Merinos
7	Mai	Dimanche	Voyage vers Rio Guadiaro
8	Mai	Lundi	Rio Guadiaro
9	Mai	Mardi	Voyage vers Casares (Sierra Crestellina)
10	Mai	Mercredi	Casares
11	Mai	Jeudi	Casares
12	Mai	Vendredi	Voyage vers Jimena
13	Mai	Samedi	Jimena
14	Mai	Dimanche	Voyage vers Castellar
15	Mai	Lundi	Voyage vers Bolonia
16	Mai	Mardi	Bolonia
17	Mai	Mercredi	Bolonia
18	Mai	Jeudi	Voyage vers Barbate
19	Mai	Vendredi	Barbate et Charco Redondo
20	Mai	Samedi	Vejer de la Frontera
21	Mai	Dimanche	Barbate Forêt
22	Mai	Lundi	Marais de Vejer et lagune de Barbate
23	Mai	Mardi	Voyage vers Coto Donana
24	Mai	Mercredi	Donana Rianzuella
25	Mai	Jeudi	Donana Acebuche et La Rocina
26	Mai	Vendredi	Donana Valverde
27	Mai	Samedi	Voyage vers la Sierra Morena
28	Mai	Dimanche	Sierra Morena (Sierra Norte) avec Rafaël
29	Mai	Lundi	Setefilla
30	Mai	Mardi	Voyage vers Andujar
31	Mai	Mercredi	Sierra de Andujar : Jandula et Rumblar
1	Juin	Jeudi	Sierra de Andujar : Rumblar
2	Juin	Vendredi	Sierra de Andujar : Jonquillo
3	Juin	Samedi	Voyage vers Almadenejos (Sierra Canalizas)
4	Juin	Dimanche	Voyage vers Caceres (Estrémadure)
5	Juin	Lundi	Lomo de Hierro et Santa Marta
6	Juin	Mardi	Santa Marta
7	Juin	Mercredi	Santa Marta et vergers de Monroy
8	Juin	Jeudi	Vergers de Monroy et Torrejon
9	Juin	Vendredi	Rio Almonte et Hinojal
10	Juin	Samedi	Rio Almonte et Hinojal
11	Juin	Dimanche	Hinojal et Torrejon
12	Juin	Lundi	Castillo de Monfragüe et Caceres
13	Juin	Mardi	Santa Marta
14	Juin	Mercredi	Castillo de Monfragüe et voyage vers Ahigal
15	Juin	Jeudi	Ahigal et voyage vers Gredos Candelario
16	Juin	Vendredi	Gredos Candelario et voyage vers La Hoya
17	Juin	Samedi	La Hoya et voyage vers Gredos
18	Juin	Dimanche	Gredos : Puerto del Pico

19	Juin	Lundi	Gredos : Grande lagune
20	Juin	Mardi	Voyage vers Villafafila
21	Juin	Mercredi	Villafafila
22	Juin	Jeudi	Voyage vers Somiedo
23	Juin	Vendredi	Farapona
24	Juin	Samedi	Valle de Lago
25	Juin	Dimanche	Farapona
26	Juin	Lundi	Voyage vers La Demanda
27	Juin	Mardi	San Millan de Cogolla
28	Juin	Mercredi	Valdezcaray
29	Juin	Jeudi	Voyage vers la France

LES SITES VISITES



NORD EST

Nous avons séjourné dans le nord-est de l'Espagne (Majorque, steppes de Blancas, serrania de Cuenca) en début de voyage, du 2 au 22 avril.

		Vic	1: Majorque	2: Steppes de Blancas	Sierra de Alarcón	Gallocanta	3: Alto Tajo	4: Serrania de Cuenca
	Espèces							
1	accenteur mouchet							x
2	aigle botté	x	x	x			x	x
3	aigle de Bonelli		x					
4	aigrette garzette		x					
5	alouette calandre			x				
6	alouette calandrelle		x	c		x		
7	alouette des champs			c		x		
8	alouette lulu	x		x	x	x		c
9	autour des palombes					x		


	Espèces	Vic	1: Majorque	2: Steppes de Blancas	Sierra de Albaracin	Gallocanta	3: Alto Tajo	4: Serrania de Cuenca
10	<i>bécasseau de Temminck</i>		x					
11	bécassine des marais		x					
12	bec-croisé des sapins		x					x
13	bergeronnette grise		x		x	x		
14	bergeronnette printanière flava		x					
15	bihoreau gris		x					
16	bouscarle de Cetti		x				x	
17	bruant fou							x
18	bruant proyer		c	x		c		
19	bruant zizi		x			x	x	c
20	busard cendré			x		x		
21	busard des roseaux		x					x
22	buse variable	x					x	x
23	caille des blés					x		
24	canard chipeau		x					
25	canard colvert	x	x				x	
26	chardonneret élégant		c		x	x	x	x
27	<i>chevalier aboyeur</i>		x					
28	<i>chevalier arlequin</i>		x					
29	<i>chevalier culblanc</i>		x					
30	<i>chevalier sylvain</i>		x					
31	chevêche d'Athéna			x				
32	chouette hulotte	x						x
33	cigogne noire							x
34	circaète Jean-le-Blanc			x	x		x	x
35	cisticole des joncs		x					
36	cochevis de Thékla		c	c				
37	cochevis huppé					c		
38	cormoran huppé		x					
39	corneille noire	x		x		x	x	x
40	coucou geai							
41	coucou gris	x	x	x		x	x	c
42	crave à bec rouge			x	x	x		x
43	échasse blanche		x					
44	effraie des clochers	x	x					
45	épervier d'Europe						x	
46	étourneau sansonnet		x					
47	étourneau unicolore			x		c		
48	faucon crécerelle	x	c	x	x	x		x

	Espèces	Vic	1: Majorque	2: Steppes de Blancas	Sierra de Albaracin	Gallocanta	3: Alto Tajo	4: Serrania de Cuenca
49	faucon hobereau		x					
50	faucon pèlerin						x	
51	fauvette à lunettes							x
52	fauvette à tête noire	x	x		x		x	x
53	fauvette des Baléares		x					
54	fauvette grisette							x
55	fauvette mélanocéphale	x	c					x
56	fauvette orphée					x	x	c
57	fauvette passerinette	x		x		x	x	x
58	fauvette des Balkans		x					
59	fauvette pitchou							x
60	flamant rose		x					
61	foulque caronculée		x					
62	foulque macroule		x		x			
63	fuligule milouin		x					
64	gallinule poule d'eau		x					
65	ganga unibande			x				
66	geai des chênes	x					x	
67	gobemouche gris						x	
68	gobemouche noir		x			x		x
69	goéland d'Audouin		x					
70	goéland leucophée	x	c					
71	grand corbeau	x	x	x	x		x	x
72	grand cormoran		x					
73	grande aigrette		x					
74	gravelot à collier interrompu		x					
75	grèbe castagneux		x		x			
76	grèbe huppé		x					
77	grimpereau des jardins	x			x		x	x
78	grive draine	x			x		x	x
79	grive musicienne	x	x					
80	guêpier d'Europe			x				
81	héron cendré		x					
82	héron gardeboeufs		x					
83	hirondelle de fenêtre		x			x	x	
84	hirondelle de rivage		x					
85	hirondelle de rochers		x		x		x	x
86	hirondelle rousseline	x						
87	hirondelle rustique	x	x	x	x	x		x
88	huppe fasciée	x	c	c		x		c

	Espèces	Vic	1: Majorque	2: Steppes de Blancas	Sierra de Albaracin	Gallocanta	3: Alto Tajo	4: Serrania de Cuenca
89	hypolaïs polyglotte		x				x	
90	linotte mélodieuse		x	x		x		x
91	lusciniolle à moustaches		x					
92	martinet à ventre blanc	x					x	
93	martinet noir		x					
94	martinet pâle		x					
95	merle noir	c	x		x	x	x	c
96	mésange à longue queue	x					x	
97	mésange bleue	c	x				x	x
98	mésange charbonnière	x	c		x			x
99	mésange huppée							x
100	mésange noire				x		x	x
101	milan noir		x	x				
102	milan royal		x				x	
103	moineau domestique		c		x	x		x
104	moineau friquet			x				
105	moineau soulcie			x		x		
106	monticole bleu		c					
107	<i>mouette pygmée</i>		x					
108	mouette rieuse		x					
109	nette rousse		x					
110	oedicnème criard		c	x				
111	perdrix rouge		c			x		x
112	petit gravelot		x					
113	petit-duc scops		x					
114	pic de Sharpe	x			x		x	x
115	pic épeiche	x					x	x
116	pic épeichette	x						
117	pie bavarde	x		x				x
118	pie-grièche à tête rousse		x					
119	pigeon biset		x		x	x		
120	pigeon ramier	c	c	x	x	x	x	x
121	pinson des arbres		c	x	x	x	x	x
122	pipit des arbres						x	
123	pipit rousseline		x	c				
124	pouillot de Bonelli	x			x	x	x	c
125	<i>pouillot fitis</i>		x	x				
126	pouillot véloce	x	x				x	
127	puffin de Scopoli		x					

	Espèces	Vic	1: Majorque	2: Steppes de Blancas	Sierra de Albaracin	Gallocanta	3: Alto Tajo	4: Serrania de Cuenca
128	puffin des Baléares		x					
129	râle d'eau		x					
130	roitelet à triple bandeau	x	x		x		x	x
131	rossignol philomèle		x		x	x	x	x
132	rougegorge familier	c	x		x		x	x
133	rougequeue à front blanc		x	x		x		
134	rougequeue noir	x		x	x		x	
135	rousserolle turdoïde		x					
136	sarcelle d'hiver		x					
137	serin cini	x	x		x	x	x	x
138	sirli de Dupont			x				
139	sittelle torchepot	x					x	
140	tadorne de Belon		x					
141	talève sultane		x					
142	tarier pâtre		c					c
143	torcol fourmilier		x				x	
144	tourterelle des bois		x					
145	tourterelle turque		c		x	x	x	
146	traquet motteux		x	c	x	c		c
147	traquet oreillard			x				
148	troglodyte mignon	x	x		x		x	
149	vautour fauve		x	x		x	x	x
150	vautour moine		x					
151	vautour percnoptère						x	x
152	verdier d'Europe		c				x	
		39	103	38	32	37	47	52

1. Majorque



Majorque est la plus grande île des Baléares (superficie : 3600 km², longueur : 100 km, largeur 80 km).

- La façade nord-est est montagneuse (Sierra de Tramuntana, altitude 1400m). Le paysage est constitué de garrigues et d'une forêt de pins.
- La côte est rocheuse
- Le centre de l'île (El Pla) est cultivé (oliveraies, amandiers, figuiers et cultures de fruitiers).

L'avifaune est remarquable et l'île abrite quelques joyaux : Faucon d'Eléonore, Vautour moine, Aigle de Bonelli, deux endémiques (Fauvette des Baléares et Puffin des Baléares), et un certain nombre de sous-espèces :

- endémiques des Baléares (ssp balearica): Gobemouche gris, Bec-croisé des sapins, Mésange bleue et Roitelet à triple bandeau.
- endémiques des îles de la Méditerranée occidentale : Pie-grièche à tête rousse (ssp badius), Fauvette de Moltoni.

Il faut y ajouter la ssp « witherbyi » du bruant des roseaux (nicheuse aussi sur la côte méditerranéenne française), présente uniquement dans la réserve de S'Albuféra en petit nombre et une population de Goéland d'Audouin, espèce très localisée.

C'est aussi le seul endroit de la planète où ne vit que le Cochevis de Thékla (absence du Cochevis huppé). C'est pratique pour l'identification !

Nous y avons observé en une semaine (du 4 au 10 avril) 103 espèces, dont la Fauvette des Baléares. La Fauvette de Moltoni et le Gobemouche


gris nous ont échappé (pas arrivés). Nous n'avons pas réussi à trouver le Bruant des roseaux.

Espèces abondantes : Bruant proyer, Chardonneret, Fauvette mélanocéphale, Cochevis de Thékla, Faucon crécerelle, Goéland leucophaée, Huppe, Mésange charbonnière, Moineau domestique, Monticole bleu, Œdicnème criard, Perdrix rouge, Pigeon ramier, Pinson, Tarier patre, Tourterelle turque, Verdier.

Il est intéressant de se procurer sur place le livre suivant : « A Birding Tourist's Guide to Majorca », 2nd Edition (Rebassa, Manchado, Torrens, Oriola). 2013, qui présente l'avifaune et les circuits de découverte.


1 a. Cap Blanc

Paysage de falaises et de garrigues basses. Nous avons vu 24 espèces dont le Torcol et le Bec-croisé des sapins. La Fauvette des Baléares est théoriquement représentée sur ce site ; nous l'avons cherché en vain.




1b. Salines de Salobrar de Campos

Ces marais salants sont la deuxième zone humide de Majorque (300 ha). On peut y rencontrer tous les oiseaux d'eau, et singulièrement le Flamant rose. Nous y avons vu 17 espèces, dont les flamants.




1c. Portocolom

Remarquable zone de garrigues basses, c'est le site présentant la plus forte densité de Fauvette des Baléares. Nous y avons vu, en plus de cette fauvette (2 chanteurs), 25 espèces, dont le Goéland d'Audouin.



1f. Ile de Cabrera

Cette petite île est un Parc national. Elle est située au sud de l'île et on y va à partir du port de Colonia Sant Jordi (Goélands d'Audouin dans le port). L'accès est restreint (un seul sentier autorisé, et c'est très strict !) et on a seulement 5 heures de présence possible. C'est un excellent site pour voir les oiseaux marins pendant la traversée en bateau (mais le jour où nous y sommes allés, ils étaient absents !), la Fauvette des Baléares, des passereaux migrateurs. Nous y avons vu 21 espèces, dont la Fauvette des Baléares (3 chanteurs), une Fauvette passerinette « albistriata » qui est accidentelle en Espagne (en provenance des Balkans), le Gobe-mouche noir, le Rougequeue à front blanc, le Cormoran huppé (ssp « desmarestii »).




2. Steppes de Blancas (Aragon)

Situées au sud de l'Aragon, non loin de Tέρuel, elles constituent la marge sud des steppes de la vallée de l'Ebre. On y trouve une importante population de Sirli de Dupont, sur un site moins connu et moins fréquenté que les steppes de Belchite.

Les alouettes calandrelles, des champs y sont communes (dans la steppe) comme les calandres dans les zones cultivées. Commune aussi les espèces suivantes : cochevis de Thékla, Huppe fasciée, Pipit rousseline, Traquet motteux,


Nous y avons vu cette année 38 espèces dont le Sirli de Dupont, le Ganga unibande, le Traquet oreillard, le Crave, la Chevêche.

2: Steppes de Blancas



3. Alto Tajo (Castille La Mancha)


C'est un Parc naturel assez peu connu. On y découvre de superbes falaises à Ventosa, près de Molina de Aragon. Nous y avons vu 47 espèces, dont de nombreux rapaces : faucon pèlerin, milan royal, percnoptère, vautour fauve, épervier, aigle botté, mais aussi le pipit des arbres, le torcol, le martinet à ventre blanc.



4. Serrania de Cuenca (Castille La Mancha)

C'est une vaste sierra, au nord-est de Cuenca, dont l'altitude maximale est de 1800m. Le secteur est boisé (pins) sur l'essentiel de sa superficie. Nous avons choisi un secteur au nord de la sierra, assez différent puisque composé surtout de garrigues basses de type méditerranéen, juste au sud du village de Lagunaseca.


Nous y avons vu 52 espèces, dont toutes les fauvettes méditerranéennes, y compris l'orphée et la Fauvette à lunettes. Mais aussi la cigogne noire, le bruant fou, le Circaète. L'Alouette lulu et le Coucou gris y sont particulièrement abondants.



CENTRE-OUEST

Nous avons séjourné à deux moments différents dans cette région d'Espagne : du 22 au 26 avril en Castille la Mancha (Parc national de Cabaneros et Sierra Canalizas), puis du 3 au 14 juin en Estrémadure, pour terminer dans la sierra de Gredos (Castille Léon) du 15 au 19 juin. C'est le domaine d'un ciste remarquable (Jara blanche, *Cistus ladanifer*), très aromatique (odeur de miel) et de la Pie bleue.

On y découvre les steppes dans la région de Caceres et la « dehesa », qui est en fait une forêt de chênes (surtout chêne liège) éclaircie pour le pâturage.



	Espèces	5: Cabaneros	6: Sierra Canalizas	Sierra Madrona	18: Steppes de Caceres	19: Monfragüe	20: Ahigal	21: Sierra de Gredos
1	accenteur mouchet							c
2	agrobate roux						x	
3	aigle botté	c	x		x	x	x	x
4	aigle de Bonelli		x					
5	aigle ibérique	x			x			
6	aigle royal	x			x	x		
7	alouette calandre				c			
8	alouette calandrelle				x			
9	alouette des champs				x			x
10	alouette lulu	c	c			x		x
11	bec-croisé des sapins							x
12	bergeronnette des ruisseaux				x			x
13	bergeronnette grise		x		x	x		x
14	bergeronnette printanière flava							
15	bergeronnette printanière iberiae							x
16	bondrée apivore							x

	Espèces	5: Cabaneros	6: Sierra Canalizas	Sierra Madrona	18: Steppes de Caceres	19: Monfragüe	20: Ahigal	21: Sierra de Gredos
17	bouscarle de Cetti		x			x		
18	bruant fou					x		c
19	bruant ortolan							x
20	bruant proyer	c	c		c	x		x
21	bruant zizi	x		x	x	x		x
22	busard cendré				c			
23	busard des roseaux		x		x			
24	buse variable				x	x	x	x
25	caille des blés							c
26	canard colvert	x	x		x	x	x	
27	chardonneret élégant	x	x		x	x	x	x
28	chevalier guignette		x					
29	chevêche d'Athéna	x			c			
30	choucas des tours				c			
31	chouette hulotte							x
32	cigogne blanche		x		x	x		x
33	cigogne noire		x		x	x		
34	cincle plongeur							x
35	circaète Jean-le-Blanc		x	x	x			
36	cisticole des joncs				c			
37	cochevis de Thékla				x	x	x	
38	cochevis huppé	c	c		c	x		
39	corneille noire							x
40	coucou geai				x			x
41	coucou gris	c	x					x
42	échasse blanche				c			
43	élanion blanc				x			
44	engoulevent à collier roux				x			
45	engoulevent d'Europe							x
46	épervier d'Europe		x					
47	étourneau unicolore	x	x		c	c	c	c
48	faisan de Colchide					x		
49	faucon crécerelle		x			x		x
50	faucon crécerellette				c			
51	fauvette à tête noire	x	x	x		x		x
52	fauvette grisette							c
53	fauvette mélanocéphale	x		x	x	c	x	
54	fauvette orphée					c	x	


	Espèces	5: Cabaneros	6: Sierra Canalizas	Sierra Madrona	18: Steppes de Caceres	19: Monfragüe	20: Ahigal	21: Sierra de Gredos
55	fauvette passerinette	x	x	x				
56	fauvette pitchou							x
57	gallinule poule d'eau		x		x	x		
58	ganga cata				x			
59	ganga unibande				x			
60	geai des chênes	c		x	x	x		x
61	gorgebleue à miroir							x
62	grand corbeau	x	x		x	x		x
63	grand cormoran						x	
64	grèbe castagneux		x		x			
65	grimpereau des jardins					x	x	
66	grive draine	x	x				x	c
67	grosbec casse-noyaux	x			x	x		
68	guêpier d'Europe	c	c		c	c	c	
69	héron cendré		x		x	x	x	
70	héron gardeboeufs					x		
71	hirondelle de fenêtre		x		c	x	x	x
72	hirondelle de rivage							x
73	hirondelle de rochers				x	x		x
74	hirondelle rousseline	x	x	x	c	x		x
75	hirondelle rustique	c	x	x	c	x	x	x
76	huppe fasciée	c	c		c	x	x	x
77	hypolaïs polyglotte		x					x
78	linotte mélodieuse				x		x	x
79	loriot d'Europe	c	c	x	x	x		c
80	martinet à ventre blanc				x	x		
81	martinet cafre					x		
82	martinet noir	x	x		x	x		x
83	martinet pâle					x		x
84	martin-pêcheur d'Europe		x		x			
85	merle noir	x	c	x	c	x	x	x
86	mésange à longue queue		x	x	x	x		x
87	mésange bleue	x	x		x	x	x	x
88	mésange charbonnière	c	x	x	x	x	x	x
89	mésange huppée	x						x
90	mésange noire							x
91	milan noir		x		c	c	c	x
92	milan royal						x	x
93	moineau domestique	x	x	x	c	x	x	x

	Espèces	5: Cabaneros	6: Sierra Canalizas	Sierra Madrona	18: Steppes de Caceres	19: Monfragüe	20: Ahigal	21: Sierra de Gredos
94	moineau espagnol	x			c		x	
95	moineau soulcie					x		x
96	monticole bleu				x	x		x
97	monticole de roche							x
98	oedicnème criard				x			
99	ouette d'Egypte		x				x	
100	outarde canepetière		x					
101	perdrix rouge	x	c	x	x	x		x
102	petit gravelot				c	x		
103	petit-duc scops	x						
104	pic de Sharpe	x						
105	pic épeiche	x	x			x		x
106	pic épeichette					x		
107	pie bavarde		x		x			x
108	pie bleue	c	c	x	c	c	x	x
109	pie-grièche à tête rousse	c	x		c	c	c	
110	pie-grièche méridionale				c	x	x	
111	pigeon biset	x			x	x	x	x
112	pigeon ramier	x	c	x	x	x	x	c
113	pinson des arbres	x	c	x	x	x	x	x
114	pipit rousseline							x
115	pipit spioncelle							x
116	pouillot de Bonelli	x						c
117	roitelet à triple bandeau							x
118	rollier d'Europe				x			
119	rossignol philomèle	x	c	x		x		x
120	rougegorge familier			x				x
121	rougequeue noir				x	c	x	x
122	rousserolle turdoïde		x					
123	serin cini	x	x		x	x	c	x
124	sittelle torchepot	x				x		x
125	tarier des prés	x						
126	tarier pâtre		x		c	x	x	x
127	tourterelle des bois		c		x			
128	tourterelle turque	x	c		x	x	x	
129	traquet motteux							c
130	traquet oreillard				x		x	
131	troglodyte mignon	x		x	x	x		x
132	vautour fauve	x	x	x	c	x	x	x

	Espèces	5: Cabaneros	6: Sierra Canalizas	Sierra Madrona	18: Steppes de Caceres	19: Monfragüe	20: Ahigal	21: Sierra de Gredos
133	vautour moine	x	x		x	x	x	
134	vautour percnoptère				x	x		
135	verdier d'Europe				x	x	x	
		49	57	21	79	68	40	75

5. Parc de Cabaneros (Castille La Mancha)


Parc national, Cabaneros est donc très peu accessible. On a en fait uniquement la route (CM 4017) avec un observatoire et un petit sentier. Nous avons en fait prospecté le secteur au nord-est d'Avellanar et celui à l'est de Horcajo de los Montes, tous deux hors parc, à partir des pistes et petites routes, car les grandes propriétés sont très fermées. Nous y avons vu cependant 49 espèces dont l'Aigle royal, l'Aigle ibérique, le Vautour moine, le Moineau espagnol, le Grosbec.




6. Sierra Canalizas et sierra de Alcudia (Castille La Mancha)

Il s'agit surtout d'une large vallée (Rio Guadiana). Nous avons prospecté un secteur près de Sarecuela (prairies abritant l'Outarde canepetière) le 23 avril et un secteur près d'Almadenejos, à l'est d'Almaden (Sierra de Alcudia), les 24 et 25 avril, puis les 3 et 4 juin.

Nous y avons vu 57 espèces dont l'Aigle de Bonelli, le Vautour moine, l'Outarde canepetière, le Guêpier, le Circaète, l'Ouette d'Égypte, la Cigogne noire, le Grosbec.






18. Steppes de Caceres (Estrémadure-Caceres)

C'est une des plus belles zones de steppes d'Espagne. Nous y avons séjourné du 4 au 13 juin. Les steppes sont traversées par des rios surmontés de petites falaises et en périphérie on trouve des vergers d'oliviers.

Si nous n'avons pas réussi à voir une seule Outarde barbue (trop farouches en juin ?), les autres espèces étaient au rendez-vous (79 au total) : gangas cata (le plus commun) et unibande, Rollier, Chevêche, Faucon crécerellette (ces trois espèces abondantes dans les nichoirs de la petite route au sud de la zone), aigles ibérique et royal, Coucou geai, Cigogne noire, Moineau espagnol, Pie-grièche méridionale...

Le long des rios, Bergeronnette des ruisseaux et Petit gravelot sont communs.

Dans la steppe, les espèces dominantes sont l'Alouette calandre, le Bruant proyer, le Choucas, le Cisticole, le Cochevis huppé, l'Echasse, l'Étourneau unicolore, le Guêpier, les hirondelles de fenêtre et rousseline, la Huppe.




19. Monfragüe (Estrémadure-Caceres)

Parc très célèbre pour ses populations de rapaces, la Monfragüe est une destination naturaliste « incontournable ». Des chemins de découverte et des observatoires (sur la route menant à Portilla del Tiétar) permettent aujourd'hui de facilement découvrir le parc. Nous avons cette année séjourné du 8 au 13 juin sur la frange ouest du parc, (près de Torrejon, paysage de dehesa et près de Seradilla), puis sur le castillo de Monfragüe.

Nous y avons vu 68 espèces dont le Martinet cafre, le Pic épeichette, l'Aigle botté, le Vautour moine, la Cigogne noire, le Grosbec, le Rougequeue noir.

Sont communes les espèces suivantes : fauvelles mélanocéphale et orphée, Guêpier, hirondelles rustique et rousseline, Pie-grièche à tête rousse.




20. Vergers d'Ahigal (Estrémadure-Caceres)

C'est un secteur bien peu connu, composé de vergers familiaux en bordure de villages, au nord de Plasencia. Nous y avons séjourné les 14 et 15 juin. Nous y avons observé 40 espèces, dont l'Agrobate roux et le Traquet oreillard.

Serin, Mésange charbonnière, Rougequeue noir, Pie-grièche à tête rousse sont des espèces communes.

20 : Vergers d' Ahigal



21. Sierra de Gredos (Castille-Léon)


La sierra de Gredos est une sierra de haute altitude (2600m), souvent enneigée jusqu'en juin. Beaucoup d'espèces pyrénéennes ou nordiques trouvent ici leur limite sud de répartition. La sierra abrite la plus importante population ibérique de Gorgebleue (ssp *azuricollis* sans miroir).

Nous y avons séjourné du 15 au 19 juin et observé 75 espèces dont la Gorgebleue, le Bruant ortolan, l'Engoulevent d'Europe, le Monticole de roche, le Cincle plongeur.

Caille des blés, Accenteur mouchet, pipits rousseline, spioncelle et des arbres, Bruant fou sont des espèces communes.

Ici, dans les prairies d'altitude, les trois pipits cohabitent.

Le Bouquetin des Pyrénées est abondant.



ANDALOUSIE

Nous avons séjourné en Andalousie du 27 avril au 2 juin. Nous y avons vu 167 espèces et parmi les plus fréquentes ou abondantes l'Aigle botté, le Bruant proyer, le Chardonneret, le Faucon crécerelle, la fauvette mélanocéphale, le Guêpier, la Huppe, le Pigeon ramier, la Tourterelle des bois, le Vautour fauve.


	Espèces	7: Sierra de Andujar	8 et 9: Lagunes	10 : Sierra de Los Méridos	11: Rio Guadiaro	12 et 13: Sierras du sud	14 et 15: Estrecho	16: Donana	17: Sierra Norte
1	aigle botté	x	x	x	x	x	x	x	x
2	aigle de Bonelli					x			x
3	aigle ibérique	x							
4	aigle royal			x					x
5	aigrette garzette						x	c	x
6	alouette calandre							x	
7	alouette calandrelle						x	x	

	Espèces	7: Sierra de Andujar	8 et 9: Lagunes	10 : Sierra de Los Méridos	11: Rio Guadiaro	12 et 13: Sierras du sud	14 et 15: Estrecho	16: Donana	17: Sierra Norte
8	alouette lulu	c		c	x	x		x	x
9	autour des palombes			x	x				
10	avocette élégante		x						
11	<i>bécasseau minute</i>		x						
12	<i>bécasseau sanderling</i>						x		
13	<i>bécasseau variable</i>		x				x		
14	bec-croisé des sapins			c					
15	bergeronnette des ruisseaux					x			
16	bergeronnette grise	x			x	x	x		x
17	bergeronnette printanière iberiae						x	x	
18	bihoreau gris							c	
19	blongios nain							x	
20	bondrée apivore	x		x		x	c		
21	bouscarle de Cetti	x	x			x		x	x
22	bruant fou	x		c	x				x
23	bruant ortolan	x							
24	bruant proyer	c	x	c	c	x	x	x	c
25	bruant zizi	x		x	x	x	x		x
26	busard des roseaux		x				x	x	
27	buse variable	x	x			x	x	x	x
28	caille des blés							x	
29	canard chipeau		x					x	
30	canard colvert	x	x		x	x	x	x	x
31	chardonneret élégant	x	x	x	c	c	c	c	x
32	<i>chevalier aboyeur</i>		x						
33	chevalier gambette		x						
34	chevalier guignette	x	x				x		
35	chevêche d'Athéna	c				x			
36	choucas des tours		x				x	c	x
37	chouette hulotte	x			x	x	x	x	
38	cigogne blanche		x			x	x	c	
39	cigogne noire								x
40	circaète Jean-le-Blanc	x			x	x	x	x	x
41	cisticole des joncs		x			x	x	x	x
42	cochevis de Thékla	x			x	x		x	x
43	cochevis huppé	c	c		x	c	x	c	c
44	coucou geai	x							

	Espèces	7: Sierra de Andujar	8 et 9: Lagunes	10 : Sierra de Los Méridos	11: Rio Guadiaro	12 et 13: Sierras du sud	14 et 15: Estrecho	16: Donana	17: Sierra Norte
45	coucou gris	x			x	x	x	x	x
46	crabier chevelu						x	c	
47	crave à bec rouge	x		x	x				
48	échasse blanche		x				x	c	
49	élanion blanc							x	
50	engoulevent à collier roux	c				x	x	x	x
51	épervier d'Europe	x			x				
52	érismature à tête blanche		x					x	
53	étourneau unicolore	x	x		x	x	x	c	c
54	euplecte vorabé							x	
55	faisan de Colchide						x		
56	faucon crécerelle	x	x	x	x	x	x	x	x
57	faucon crécerellette					x	x	x	
58	faucon pèlerin				x	x	x		
59	fauvette à tête noire	x			x	c	x		x
60	fauvette mélanocéphale	x	x		x	c	c	c	c
61	fauvette orphée	x		x					
62	fauvette passerinette	x			x				x
63	fauvette pitchou	x						x	
64	flamant rose		x				x	x	
65	foulque macroule		x					x	
66	fuligule milouin		x					x	
67	gallinule poule d'eau		x				x	x	
68	geai des chênes	c			x	x			c
69	glaréole à collier						x	x	
70	gobemouche gris				x	c	c		
71	gobemouche noir		x				x		
72	gobemouche noir ibérique				x				
73	goéland brun		x						
74	goéland leucophée						x	x	
75	grand corbeau	x		x	x	x	x	x	x
76	grand cormoran								x
77	<i>grand gravelot</i>		x				x	x	
78	grand-duc d'Europe					x			x
79	gravelot à collier interrompu		x				x		
80	grèbe à cou noir		x					x	
81	grèbe castagneux		x		x			x	x
82	grèbe huppé		x					x	

	Espèces	7: Sierra de Andujar	8 et 9: Lagunes	10 : Sierra de Los Méridos	11: Rio Guadiaro	12 et 13: Sierras du sud	14 et 15: Estrecho	16: Donana	17: Sierra Norte
121	moineau soulcie	x			x	x			x
122	monticole bleu			x	x	x	x		x
123	mouette rieuse		x						
124	nette rousse		x					c	
125	oedicnème criard		x					x	
126	perdrix rouge	c		x			x		c
127	petit gravelot		x			x			
128	petit-duc scops	x			x				
129	pic de Sharpe	c					x		x
130	pic épeiche	x			x	x	x	x	
131	pie bavarde	c						x	x
132	pie bleue	c	x					x	c
133	pie-grièche à tête rousse	x	x	x	x	x		x	x
134	pie-grièche méridionale				x				
135	pigeon biset	x	x			x	x	x	x
136	pigeon colombin	x							
137	pigeon ramier	c	x	x	x	c	x	x	x
138	pinson des arbres	c		x	x	x	x	x	x
139	pipit rousseline					x	x	x	
140	pouillot de Bonelli			x	x	c	x		
141	<i>pouillot fitis</i>		x						
142	pouillot ibérique					x			
143	roitelet à triple bandeau			x	x	x			
144	rossignol philomèle	x	x		x	c	x	c	c
145	rougegorge familier	x			x	x			x
146	rousserolle effarvate		x				x	c	
147	rousserolle turdoïde		x					c	
148	sarcelle marbrée							x	
149	serin cini	x		x	x	c	x	x	x
150	sittelle torchepot				x	x			
151	spatule blanche						x	c	
152	sterne hansel		x						
153	sterne naine						x		
154	talève sultane		x					x	
155	tarier des prés		x						
156	tarier pâtre		x		x	c	c	x	x
157	torcol fourmilier								x
158	tourterelle des bois	c	x	x		x	x	x	x

	Espèces	7: Sierra de Andujar	8 et 9: Lagunes	10 : Sierra de Los Méridos	11: Rio Guadiaro	12 et 13: Sierras du sud	14 et 15: Estrecho	16: Donana	17: Sierra Norte
159	tourterelle turque	x	x			x	x	x	x
160	traquet oreillard			x					x
161	traquet rieur				x				
162	troglodyte mignon	x			x	x	x	x	x
163	vanneau huppé		x					x	
164	vautour fauve	x		x	C	C	x	x	x
165	vautour moine	x			x				x
166	vautour percnoptère					x			
167	verdier d'Europe		x		x	C	C	C	
		73	68	33	64	77	82	98	75




7. Sierra de Andujar (Andalousie-Jaen)

Cette sierra d'altitude assez faible (800/900m) située au nord de Cordoue est le principal domaine (avec Donana) du Lynx ibérique. Nous l'avons cherché, sans succès cependant.

Par contre l'Aigle ibérique est bien présent. Nous y avons vu 73 espèces dont, en plus de l'aigle ibérique, l'Aigle botté, l'Engoulevent à collier roux (commun), la Chevêche, le Petit-duc, le Coucou geai.

Parmi les espèces communes, on peut noter : Alouette lulu, Bruant proyer, fauvettes (mélancéphale, orphée, passerinette, pitchou), Grosbec, Guêpier, Huppe, Lorient, Pic de Sharpe, Pie bleue, Tourterelle des bois.




8. Lagune de Rincon (Andalousie-Cordoba)

C'est une petite lagune située au sud de Cordoue, dans un paysage d'oliveraies en culture intensive. Il n'y a pas d'accueil, juste un observatoire.

C'est sûrement un des meilleurs endroits d'Andalousie (et d'Europe) pour voir l'Erismature à tête blanche. Nous y avons vu 3 mâles et deux femelles. Et on peut ajouter Héron pourpré, Grèbe à cou noir, Hypolaïs obscure, Nette rousse, Talève sultane. Il y aurait aussi la Foulque caronculée mais nous ne l'avons pas vue.

Au total 36 espèces les 2 et 3 mai.




9. Lagune de Fuente de Piedra (Andalousie-Malaga)

A la différence de Rincón, c'est une grande zone, avec une grande maison d'accueil et beaucoup de monde. Plusieurs observatoires et un sentier permettent de découvrir la zone. C'est le lieu de la principale colonie espagnole de Flamant rose.

Nous y avons séjourné les 3 et 4 mai et observé 50 espèces dont, en plus des flamants, la Sterne hansel, l'Echasse, l'Avocette, l'Erismature à tête blanche, le Bécasseau minute, la Nette rousse.

Nous y avons observé la Mangouste.


9: Fuente de Piedra



10. Sierra de Los Méridos (Andalousie-Malaga)

La sierra de Los Merinos constitue la partie nord de la sierra de Las Nieves, elle-même inscrite dans la serrania de Ronda, au nord d'El Burgo. Elle se situe au nord-est de la ville de Ronda. Elle abrite le sapin d'Andalousie (*Abies pinsapo*).


Nous y avons vu, du 4 au 7 mai, 33 espèces, dont l'Aigle royal, le Bec-croisé des sapins, le traquet oreillard.



11. Rio Guadiaro (Andalousie-Malaga)

Juste à l'ouest de Ronda, nous avons séjourné du 7 au 9 mai à Montejaque, sur les bords du rio Guadiaro. Ce secteur abrite le Martinet cafre, que nous n'avons cependant pas réussi à trouver ici (trop tôt certainement).

Nous y avons vu 64 espèces, dont l'Autour des palombes, le Gobemouche noir ibérique (migrateur dans une forêt de chêne liège), le Faucon pèlerin, le Traquet rieur, les martinets à ventre blanc et pâle, le Moineau soulcie, le Petit-duc, la Pie-grièche méridionale, le Vautour moine.




12. Sierras de Crestellina et Utrera (Andalousie-Malaga)

Cette petite sierra est composé d'un secteur de falaises (accessible par un chemin balisé au nord de Casares), des bords du rio Genal et de la sierra Utrera au sud de Casares.

Ce dernier secteur est connu (Banos de la Hedionda) pour abriter l'Agrobate roux et la sierra Crestellina pour abriter le Martinet cafre. Nous n'avons trouvé ni l'un ni l'autre mais observé cependant 64 espèces du 9 au 12 mai, dont le Faucon pèlerin, le Percnoptère, l'Hypolaïs obscure, le Martinet pâle, le Monticole bleu, le Guêpier, l'Aigle de Bonelli, le Moineau soulcie.

12: Sierra Crestellina




13. Jimena et Castellar (Andalousie-Cadix)

Les abords des châteaux de Jimena et du Castillo de Castellar sont connus pour abriter le Martinet cafre, qui nous a échappé aussi sur ce site.

Nous avons séjourné du 12 au 15 mai et avons pu contacter 58 espèces, dont :

- à Jimena : Faucon pèlerin, Martinet pâle, Martin-pêcheur, Pouillot ibérique, Percnoptère.
- à Castillo de Castellar : Engoulevent à collier roux, Faucon crécerellette, Pouillot ibérique ainsi que la Mangouste.




14. Bolonia et Sierra de la Plata (Andalousie-Cadix)

Ce site (une falaise de la sierra de la Plata) est connu pour avoir abrité la première colonie de Martinet Cafre d'Europe à partir de 1964, puis quelques années après les premiers martinets des maisons !

Malheureusement, ces deux espèces ont déserté le site depuis 2013 ou 2014, donc après un demi-siècle de présence...

Nous les avons cherchés en vain du 15 au 18 mai. Mais avons assisté à une remarquable migration de bondrées apivores (1000 estimées en 3 jours) déportées de Gibraltar et Tarifa vers ce site par de très forts vents d'Est. Elles étaient accompagnées par de nombreux milans noirs.

Nous avons vu sur ce site 38 espèces, dont en plus de celles déjà citées, le Monticole bleu, le Gravelot à collier interrompu (sur la plage de Bolonia), l'Engoulevent à collier roux, l'Aigle botté, le Circaète.




15. Barbate (Andalousie-Cadix)

Ce site est constitué d'une lagune (à l'Est de Barbate), d'une forêt de pins qui bordent les falaises maritimes (à l'Ouest) et d'une zone de marais (au nord, juste avant la ville de Vejer de la Frontera).

Nous avons pu y observer l'Ibis chauve réintroduit près de Vejer. L'autre site est au nord-ouest du cap de Trafalgar.

Au total, nous avons observé 67 espèces, dont, en plus de l'Ibis chauve :

- en forêt et sur les falaises maritimes : Faucon pèlerin, Gobemouche noir (migrateur).
- dans les marais de Vejer : Ibis falcinelle, Circaète.
- sur la lagune : remarquable colonie de 200 glaréoles à collier, Alouette calandrelle, Sterne naine.



16. Donana (Andalousie-Huelva)

Le parc de Coto Donana, delta du Guadalquivir, est non seulement la plus grande zone humide d'Espagne, mais avec le delta du Danube, une des plus importantes zones humides d'Europe.


Nous y avons vu 98 espèces lors d'un séjour du 23 au 26 mai.


Toutes les espèces de hérons dont le Blongios (sauf le Butor), l'Ibis falcinelle, l'Erismature à tête blanche, la Sarcelle marbrée, la Spatule blanche, un très grand nombre de milans noirs, l'Euplecte vorabé (tisserin africain récemment implanté) ont été observés dans les marais.

Dans les zones de cultures nous avons vu l'Elanion blanc, les alouettes calandre et calandrelle, la Caille, le Faucon crécerellette.

Et en plus des oiseaux, la mangouste et la couleuvre à échelons.

16 : Donana






17. Sierra Norte (Andalousie-Séville)


Située au nord-est de Séville, la Sierra Norte est partie intégrante de la Sierra Morena. C'est un remarquable secteur pour les rapaces et aussi un bastion du Martinet cafre, que nous verrons sur deux sites.

Nous y verrons 75 espèces dont, en plus du Martinet cafre, le Martinet des maisons (Sétefilla étant le seul site d'Espagne abritant les deux espèces de martinets africains), l'Aigle de Bonelli, la Cigogne noire, le Grand-duc, l'Engoulevent à collier roux.

Nous y avons aussi découvert la rare couleuvre à capuchon.



17a: Setefilla



NORD-OUEST

Nous avons observé 99 espèces dans le nord-ouest de l'Espagne, dont les espèces nordiques comme le Bruant jaune, la Mésange nonnette, le Chocard, la Fauvette des jardins, la Pie-grièche écorcheur, absentes du reste de l'Espagne. Mais aussi l'Outarde barbue qui a son principal bastion mondial dans les steppes de Villafafila.

	Espèces	22: Villafafila	23: Somiedo	24: Sierra de la Demanda
1	accenteur mouchet		C	X
2	aigle botté	X		X
3	alouette calandre	X		
4	alouette calandrelle	X		


	Espèces	22: Villafafila	23: Somiedo	24: Sierra de la Demanda
5	alouette des champs	x		
6	bergeronnette des ruisseaux		c	x
7	bergeronnette grise		x	x
8	bondrée apivore		x	
9	bouscarle de Cetti	x		
10	bouvreuil pivoine		x	x
11	bruant fou		x	x
12	bruant jaune		c	
13	bruant proyer	x		
14	busard cendré	c		
15	busard des roseaux	c		
16	buse variable	x	x	
17	caille des blés	x	c	
18	canard colvert	x	x	
19	chardonneret élégant	x	x	
20	chevêche d'Athéna	c		
21	chocard à bec jaune		x	
22	choucas des tours	x		
23	chouette hulotte			x
24	cigogne blanche	c		
25	cincle plongeur		c	x
26	circaète Jean-le-Blanc		x	
27	cisticole des joncs	x		
28	cochevis huppé	x		
29	corneille noire	x	c	
30	coucou gris		x	
31	crave à bec rouge		x	
32	effraie des clochers	x		
33	engoulevent d'Europe		x	
34	étourneau unicolore	c		
35	faucon crécerelle		x	
36	faucon crécerellette	c		
37	faucon hobereau			x
38	fauvette à tête noire		c	x
39	fauvette des jardins		c	x
40	fauvette grisette		x	
41	fauvette passerinette	x		
42	gallinule poule d'eau	x		
43	ganga unibande	x		

	Espèces	22: Villafafila	23: Somiedo	24: Sierra de la Demanda
44	geai des chênes		c	x
45	grand corbeau	x	c	
46	grimpereau des jardins		x	x
47	grive draine			x
48	grive musicienne		x	x
49	guêpier d'Europe	x		
50	héron cendré	x		
51	<i>hibou des marais</i>	x		
52	hirondelle de fenêtre		x	
53	hirondelle de rochers		x	x
54	hirondelle rustique	x	x	x
55	huppe fasciée	x		
56	linotte mélodieuse		c	x
57	martinet noir	x	x	x
58	merle noir		x	x
59	mésange à longue queue			x
60	mésange bleue		x	x
61	mésange charbonnière		x	x
62	mésange noire			x
63	mésange nonnette		x	x
64	milan noir	x	x	
65	milan royal	x		
66	moineau domestique	x	x	
67	moineau friquet	x		
68	moineau soulcie	x		
69	monticole de roche		x	
70	mouette rieuse	x		
71	outarde barbue	x		
72	perdrix grise		x	
73	perdrix rouge	x	x	
74	pic épeiche		x	x
75	pie bavarde	x	c	
76	pie-grièche écorcheur		x	x
77	pigeon biset	x	x	
78	pigeon colombin	x		
79	pigeon ramier	x	x	x
80	pinson des arbres		x	x
81	pipit des arbres		c	x
82	pipit rousseline			x

	Espèces	22: Villafafila	23: Somiedo	24: Sierra de la Demanda
83	pipit spioncelle		x	x
84	pouillot de Bonelli		x	
85	pouillot ibérique		x	
86	roitelet à triple bandeau		x	x
87	rougegorge familier		x	x
88	rougequeue noir	x	c	
89	serin cini		c	
90	sittelle torchepot			x
91	sterne hansel	x		
92	tarier pâtre	x	c	x
93	tourterelle turque	x		
94	traquet motteux	x	x	x
95	troglodyte mignon		x	x
96	vanneau huppé	x		
97	vautour fauve		x	x
98	vautour percnoptère		x	
99	verdier d'Europe	x		
		50	60	39

22. Villafafila (Castille-Léon)

Cette zone de lagunes et de steppes est connue pour sa population d'outardes barbues. Nous les avons vues facilement sur ce site, entre le 20 et le 22 juin. Nous avons observé 50 espèces dont, en plus des outardes, le Hibou des marais (de rares couples nicheurs en Espagne), le Faucon crécerellette, la Caille, la Chevêche, les moineaux friquet et soulcie, un de nos rares pigeons colombrins du voyage.




23. Parc de Somiedo (Asturies)

On est ici beaucoup plus dans le climat du Cotentin que dans le climat espagnol ! Bruant jaune, Pie-grièche écorcheur, Fauvette des jardins font leur apparition. Nous verrons 60 espèces dans la montagne de Somiedo et passerons une bonne partie du temps dans le brouillard où sous la pluie entre le 22 et le 25 juin.

Ont été observés aussi le Pouillot ibérique, la Bergeronnette des ruisseaux (commune) et le Cincle plongeur, la Caille, le Percnoptère et le Chocard. Nous avons entendu la rare Perdrix grise de montagne (ssp hispaniensis), mais sans réussir à la voir.

24: La Demanda



LES OISEAUX.

Nous avons observé 223 espèces (où sous-espèces) d'oiseaux lors de ce voyage, sur les 276 possibles (soit 80%).

Le tableau suivant fait le bilan. On peut distinguer :

- A Les espèces communes partout.
- B Les espèces communes localement.
- C Les espèces plus rares.
- D Les espèces que nous n'avons pas vu faute d'avoir séjourné dans leur aire de répartition ou à la bonne date.
- E Les espèces que nous n'avons pas vu bien que nous ayons séjourné sur des sites et aux dates où nous pouvions les rencontrer.

	Espèces	A	B	C	D	E
1	aigle botté	x				
2	alouette lulu	x				
3	bergeronnette grise	x				
4	bouscarle de Cetti	x				
5	bruant proyer	x				
6	bruant zizi	x				
7	buse variable	x				
8	canard colvert	x				
9	chardonneret élégant	x				
10	chouette hulotte	x				
11	cigogne blanche	x				
12	cochevis de Thékla	x				
13	cochevis huppé	x				
14	coucou gris	x				
15	étourneau unicolore	x				
16	faucon crécerelle	x				
17	fauvette à tête noire	x				
18	fauvette mélanocéphale	x				
19	fauvette orphée	x				
20	fauvette passerinette	x				
21	geai des chênes	x				
22	grand corbeau	x				
23	grimpereau des jardins	x				
24	guêpier d'Europe	x				
25	hirondelle de fenêtre	x				
26	hirondelle rousseline	x				
27	hirondelle rustique	x				
28	huppe fasciée	x				
29	hypolaïs polyglotte	x				
30	linotte mélodieuse	x				
31	loriot d'Europe	x				
32	martinet noir	x				
33	merle noir	x				
34	mésange à longue queue	x				
35	mésange bleue	x				
36	mésange charbonnière	x				
37	milan noir	x				
38	moineau domestique	x				
39	perdrix rouge	x				
40	pic de Sharpe	x				
41	pic épeiche	x				
42	pie bavarde	x				
43	pie-grièche à tête rousse	x				
44	pigeon biset	x				

	Espèces	A	B	C	D	E
45	pigeon ramier	x				
46	pinson des arbres	x				
47	roitelet à triple bandeau	x				
48	rossignol philomèle	x				
49	serin cini	x				
50	sittelle torchepot	x				
51	tarier pâtre	x				
52	tourterelle turque	x				
53	troglodyte mignon	x				
54	vautour fauve	x				
55	verdier d'Europe	x				
56	pouillot de Bonelli	x				
57	accenteur mouchet		x			
58	aigrette garzette		x			
59	alouette calandre		x			
60	alouette calandrelle		x			
61	alouette des champs		x			
62	bec-croisé des sapins		x			
63	bergeronnette des ruisseaux		x			
64	bihoreau gris		x			
65	bruant fou		x			
66	bruant jaune		x			
67	busard cendré		x			
68	busard des roseaux		x			
69	caille des blés		x			
70	chevêche d'Athéna		x			
71	choucas des tours		x			
72	cisticole des joncs		x			
73	corneille noire		x			
74	crave à bec rouge		x			
75	échasse blanche		x			
76	engoulevent à collier roux		x			
77	faucon crécerellette		x			
78	fauvette des jardins		x			
79	fauvette grisette		x			
80	foulque macroule		x			
81	gallinule poule d'eau		x			
82	gobemouche gris		x			
83	goéland leucophée		x			
84	grèbe castagneux		x			
85	grive draine		x			
86	héron cendré		x			
87	héron gardeboeufs		x			
88	héron pourpré		x			

	Espèces	A	B	C	D	E
89	hirondelle de rochers		x			
90	martinet pâle		x			
91	mésange huppée		x			
92	mésange noire		x			
93	moineau soulcie		x			
94	monticole bleu		x			
95	oedicnème criard		x			
96	petit-duc scops		x			
97	pie bleue		x			
98	pie-grièche méridionale		x			
99	pipit des arbres		x			
100	pipit rousseline		x			
101	rougegorge familier		x			
102	rougequeue noir		x			
103	rousserolle effarvatte		x			
104	rousserolle turdoïde		x			
105	torcol fourmilier		x			
106	tourterelle des bois		x			
107	traquet motteux		x			
108	traquet oreillard		x			
109	vautour moine		x			
110	agrobate roux			x		
111	aigle de Bonelli			x		
112	aigle ibérique			x		
113	aigle royal			x		
114	autour des palombes			x		
115	avocette élégante			x		
116	<i>bécasseau de Temminck</i>			x		
117	<i>bécasseau minute</i>			x		
118	<i>bécasseau sanderling</i>			x		
119	<i>bécasseau variable</i>			x		
120	bécassine des marais			x		
121	bergeronnette printanière flava			x		
122	bergeronnette printanière iberiae			x		
123	blongios nain			x		
124	bondrée apivore			x		
125	bouvreuil pivoine			x		
126	bruant ortolan			x		
127	canard chipeau			x		
128	<i>chevalier aboyeur</i>			x		
129	<i>chevalier arlequin</i>			x		
130	<i>chevalier culblanc</i>			x		
131	chevalier gambette			x		

	Espèces	A	B	C	D	E
132	chevalier guignette			x		
133	<i>chevalier sylvain</i>			x		
134	chocard à bec jaune			x		
135	cigogne noire			x		
136	cincle plongeur			x		
137	circaète Jean-le-Blanc			x		
138	cormoran huppé			x		
139	coucou geai			x		
140	crabier chevelu			x		
141	effraie des clochers			x		
142	élanion blanc			x		
143	engoulevent d'Europe			x		
144	épervier d'Europe			x		
145	érismature à tête blanche			x		
146	étourneau sansonnet			x		
147	euplecte vorabé			x		
148	faisan de Colchide			x		
149	faucon hobereau			x		
150	faucon pèlerin			x		
151	fauvette à lunettes			x		
152	fauvette des Baléares			x		
153	fauvette des Balkans			x		
154	fauvette pitchou			x		
155	flamant rose			x		
156	foulque caronculée			x		
157	fuligule milouin			x		
158	ganga cata			x		
159	ganga unibande			x		
160	glaréole à collier			x		
161	gobemouche noir			x		
162	gobemouche noir ibérique			x		
163	goéland brun			x		
164	goéland d'Audouin			x		
165	gorgebleue à miroir			x		
166	grand cormoran			x		
167	<i>grand gravelot</i>			x		
168	grand-duc d'Europe			x		
169	grande aigrette			x		
170	gravelot à collier interrompu			x		
171	grèbe à cou noir			x		
172	grèbe huppé			x		
173	grive musicienne			x		
174	grosbec casse-noyaux			x		
175	guifette moustac			x		

	Espèces	A	B	C	D	E
176	<i>hibou des marais</i>			x		
177	hirondelle de rivage			x		
178	hypolaïs obscure			x		
179	ibis chauve			x		
180	ibis falcinelle			x		
181	locustelle lusciniöide			x		
182	lusciniöle à moustaches			x		
183	martinet à ventre blanc			x		
184	martinet cafre			x		
185	martinet des maisons			x		
186	martin-pêcheur d'Europe			x		
187	mésange nonnette			x		
188	milan royal			x		
189	moineau espagnol			x		
190	moineau friquet			x		
191	monticole de roche			x		
192	<i>mouette pygmée</i>			x		
193	mouette rieuse			x		
194	nette rousse			x		
195	ouette d'Egypte			x		
196	outarde barbue			x		
197	outarde canepetière			x		
198	perdrix grise			x		
199	petit gravelot			x		
200	pic épeichette			x		
201	pie-grièche écorcheur			x		
202	pigeon colombin			x		
203	pipit spioncelle			x		
204	<i>pouillot fitis</i>			x		
205	pouillot ibérique			x		
206	pouillot véloce			x		
207	puffin de Scopoli			x		
208	puffin des Baléares			x		
209	râle d'eau			x		
210	rollier d'Europe			x		
211	rougequeue à front blanc			x		
212	sarcelle d'hiver			x		
213	sarcelle marbrée			x		
214	sirli de Dupont			x		
215	spatule blanche			x		
216	sterne hansel			x		
217	sterne naine			x		
218	tadorne de Belon			x		
219	talève sultane			x		

	Espèces	A	B	C	D	E
220	tarier des prés			x		
221	traquet rieur			x		
222	vanneau huppé			x		
223	vautour percnoptère			x		
224	chouette de Tengmalm				x	
225	corbeau freux				x	
226	faucou d'Eléonore				x	
227	fauvette de Moltoni				x	
228	gobemouche gris des Baléares				x	
229	grand tétras				x	
230	lagopède alpin				x	
231	locustelle tachetée				x	
232	merle à plastron				x	
233	niverolle alpine				x	
234	panure à moustaches				x	
235	perdrix gabra				x	
236	pic à dos blanc				x	
237	roselin githagine				x	
238	tarin des aulnes				x	
239	tichodrome échelette				x	
240	accenteur alpin					x
241	alouette pispette					x
242	<i>balbuzard pêcheur</i>					x
243	<i>barge à queue noire</i>					x
244	<i>barge rousse</i>					x
245	bécasse des bois					x
246	<i>bécasseau cocorli</i>					x
247	bruant des roseaux					x
248	busard St Martin					x
249	butor étoilé					x
250	canard souchet					x
251	combattant varié					x
252	<i>courlis cendré</i>					x
253	<i>courlis corlieu</i>					x
254	goéland railleur					x
255	grimpereau des bois					x
256	<i>guifette noire</i>					x
257	hibou moyen-duc					x
258	<i>huïtrier pie</i>					x
259	marouette de Baillon					x
260	marouette ponctuée					x
261	<i>marouette poussin</i>					x
262	océanite tempête					x

	Espèces	A	B	C	D	E
263	<i>phragmite des joncs</i>					x
264	pic mar					x
265	pic noir					x
266	<i>pluvier argenté</i>					x
267	<i>pluvier doré</i>					x
268	<i>pluvier guignard</i>					x
269	<i>pouillot siffleur</i>					x
270	réميز penduline					x
271	roitelet huppé					x
272	<i>sarcelle d'été</i>					x
273	<i>sterne caspienne</i>					x
274	sterne caugek					x
275	sterne pierregarin					x
276	venturon montagnard					x
		56	53	114	16	37

Parmi les 56 espèces communes partout (sauf dans l'extrême nord), on peut noter par exemple l'Aigle botté, l'Alouette lulu, les cochevis, les fauvettes méditerranéennes (mélancéphale, passerinette, orphée), le Guêpier, l'Hirondelle rousseline, la Huppe, le Lorient, le Milan noir, le Pic de Sharpe, la Pie-grièche à tête rousse, le Pouillot de Bonelli (sauf en Estrémadure), le Rossignol, le Serin, le Tarier pâtre, le Vautour fauve.

Parmi les 53 espèces communes localement, on peut noter par exemple :

- en montagne : l'Accenteur mouchet, la Caille, le Traquet motteux.
- dans les zones humides : les hérons (Aigrette garzette, Héron cendré, Bihoreau, Héron gardeboeufs), l'Echasse, les rousserolles effarvate et turdoïde.
- dans les steppes : les alouettes (Alouettes des champs, calandre, calandrelle), le busard cendré, la Chevêche.
- dans les sierras : le Bruant fou, l'Hirondelle de rochers.
- dans le Nord-Ouest : le Bruant jaune, la Fauvette grisette.
- en Andalousie : l'Engoulevent à collier roux, le Monticole bleu.
- à Majorque : l'Oedicnème criard, le Petit-duc, le Torcol.
- en Estrémadure : la Pie bleue, le Vautour moine.

Parmi les 16 espèces localisées dans les zones où nous ne sommes pas allées ou à des dates non conformes (et que nous n'avons donc pas contactées), on peut noter :

- dans les Pyrénées : le Lagopède alpin, le Grand Tétrás, la Niverolle, le Merle à plastron, le Pic à dos blanc, le Tarin des aulnes, le Tichodrome.
- dans le Sud-Est : le Roselin githagine.
- à Gibraltar : la Perdrix gabra.

- hors date : le Faucon d'Eléonore, la Fauvette de Moltoni, le Gobemouche gris des Baléares.

Parmi les 37 espèces non contactées que nous aurions pu observer, on peut noter :

- dans le Nord : le Roitelet huppé.
- en montagne : l'Accenteur alpin, le Grimpereau des bois, le Venturon.
- des limicoles migrateurs : bécasseau cocorli, barges, courlis, combattant.

1) Oiseaux nicheurs

Accenteur mouchet (*Prunella modularis*) : Ssp mabotti du sud de la France et d'Espagne (plus sombre dessus que la ssp du nord). Nous avons contacté un chanteur à Lagunaseca (sierra de Cuenca) le 20 avril, puis surtout en sierra de Gredos (du 15 au 19 juin) où il est l'espèce la plus abondante en altitude. Noté aussi communément à Somiédo et dans la sierra de la Demanda (du 22 au 28 juin).

Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*) : Il est présent en Andalousie, puis plus localement en Estrémadure. C'est une espèce très difficile à contacter. Il est présent en fait dans des habitats bien peu prospectés par les ornithologues : les vignes et oliveraies encore cultivées de manière traditionnelle. Nous l'avons contacté (1 chanteur et oiseaux en parade) le 15 juin à l'extrême nord de sa répartition en Estrémadure, au nord de Plasencia, sur la commune d'Ahigal, dans des oliveraies (plan 20). Il est aussi présent au sud de Séville (Don Rodrigo dans des vignes et Torre del Aguila dans des oliveraies), mais nous n'y sommes pas allés. Et il est aussi noté en sierra de Utrera (site des Banos de la Hedionda) en bordure de torrent, mais nous l'avons cherché en vain ici sur ce site.

Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) : C'est vraiment le rapace espagnol par excellence. Nous l'avons vu partout, du nord au sud du pays où il est commun, bien plus que la buse variable. Beaucoup d'oiseaux sont en phase claire, un petit nombre en phase foncée.

Aigle de Bonelli (*Aquila fasciata*) : Nous avons vu un premier couple sur Majorque (Tramuntana) le 9 avril (plan 1 e, Mortitx), puis un adulte et un immature en sierra de Utrera (au sud de Casares, sierra Crestellina) le 11 mai (plan 12), un couple à Setefilla (Sierra Norte) les 27 et 29 mai (plan 17 a), un adulte à Almadenejos (sierra Canalizas) le 4 juin (plan 6b).

Aigle ibérique (*Aquila adalberti*) : Un adulte le 24 avril à Avellanar (Cabaneros, plan 5), un immature à Jonquillo (Sierra de Andujar, plan 7)

le 28 avril, deux adultes (cris et parades) le 1^{er} mai (plan 7) à La Lancha (plan 7), un immature dans les steppes de Caceres (plan 18) le 4 juin, puis sur le même site le 5 juin un immature et un couple paradant, l'immature est encore observé sur ce site le 13 juin.

Aigle royal (*Aquila chrysaetos*) : Un premier oiseau (adulte avec transport de proie) près de Horcajo de Los Montes (plan 5) en bordure du parc de Cabaneros le 23 avril, un couple en sierra de Los Merinos les 5 et 6 mai (plan 10), 2 individus dans la Sierra Norte (Alanis, plan 17) le 28 mai, un immature le 12 juin au sud du Castillo de Monfragüe (plan 19), un immature dans les steppes de Caceres (plan 18) le 5 juin.

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) : Observée à Majorque (Réserve de S'Albuféra), dans les marais de Barbate, communément à Coto Donana et un oiseau à Setefilla.

Alouette calandre (*Melanocorypha calandra*) : commune dans les steppes de Blancas dans les parties basses cultivées, dans les zones de cultures de Donana, les steppes de Caceres, à Villafafila.

Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*) : 1 chanteur à Ses Salines (Majorque) le 7 avril, commune dans les steppes de Blancas et à Gallocanta, chanteurs dans les marais de Barbate et à Coto Donana (Valverde), commune dans les steppes de Caceres et à Villafafila.

Alouette des champs (*Alauda arvensis*) : commune dans les steppes de Blancas et à Gallocanta, dans les steppes de Caceres et à Villafafila. On la retrouve en altitude dans la Sierra de Gredos. Elle est absente de presque toute l'Andalousie.

Alouette lulu (*Lullula arborea*) : Nous l'avons trouvée communément à peu près partout dès lors que le paysage comprend des arbres. L'absence dans les sierras du Nord-Ouest (Somiedo et La Demanda) peut être due aux dates (elle chante moins fin juin).

Autour des palombes (*Accipiter gentilis*) : un mâle immature le 18 avril à Berrueco (Gallocanta), cris d'adulte à Serrato (Sierra de Los Merinos, Ronda) le 4 mai et un mâle dans la forêt de chênes à Montejaque (Rio Guadiaro le 8 mai (plan 11).

Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*) : six individus et un accouplement à la lagune de Fuente de Piedra les 3 et 4 mai.

Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*) : une famille sur le cap Blanc à Majorque le 4 avril (ssp balearica). Trois individus à Mortitx, toujours à

Majorque le 9 avril. Six oiseaux à Lagunaseca (Serrania de Cuenca) le 20 avril. Commun en sierra de Los Merinos (Ronda) et cris en sierra de Béjar (Gredos) le 15 juin.

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*) : Deux à Jimena le 13 mai le long du torrent Hozgarganta (plan 13), présente sur les rios des steppes de Caceres. Une à Gredos sur le chemin de la Laguna Grande le 19 juin. En fait, nous ne la trouverons communément que dans le parc de Somiedo (Asturies) et dans la sierra de la Demanda.

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*) : Commune un peu partout.

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) : Ssp *iberiae*. 5 sur la lagune de Barbate le 19 mai, 10 à Coto Donana (Valverde) le 26 mai, 1 en altitude à Gredos (Laguna Grande).

Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*) : nombreux dans la réserve de S'Albufera à Majorque, nombreux à Coto Donana (Valverde).

Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) : plusieurs chanteurs à Coto Donana (Valverde, plan 16 a). Les oiseaux sont facilement visibles près du pont.

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : Nous trouvons les premiers nicheurs avec un couple en sierra de Béjar (Candelario) le 15 juin. Une au col de Farrapona (Somiedo) le 25 juin.

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*) : contacts un peu partout.

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*) : Uniquement à Somiedo et la Demanda, donc à l'extrême nord de l'Espagne.

Bruant fou (*Emberiza cia*) : commun dans toutes les sierras, particulièrement à Gredos.

Bruant jaune (*Emberiza citrinella*) : Nous n'avons contacté cette espèce nordique qu'à Somiedo (où elle est commune).

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*) : un migrateur à Jonquillo (Andujar) le 30 avril. Commun en Sierra de Gredos (Candelario, Béjar et Chemin vers la Laguna Grande).

Bruant proyer (*Emberiza calandra*) : commun, voire abondant, partout. Absent des sierras de l'extrême nord (Somiedo, La Demanda).

Bruant zizi (*Emberiza cirulus*) : commun partout sauf dans les sierras de l'extrême nord (Somiedo, La Demanda).

Busard cendré (*Circus pygargus*) : Absent de Majorque. Vu partout communément dans les zones de steppes (Blancas, Gallocanta, Caceres, Villafafila).

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : Vu un peu partout dans les zones humides. Commun à Villafafila.

Buse variable (*Buteo buteo*) : Un peu partout, sauf à Majorque, mais bien moins commune que l'aigle botté.

Caille des blés (*Coturnix coturnix*) : un chanteur à Berrueco (Gallocanta) le 17 avril. Deux chanteurs à Donana dans des prairies (Villamanrique) les 23 et 24 mai. Un chanteur à Villafafila le 20 juin. Mais surtout l'espèce est commune en altitude (Sierras de Gredos et de Somiedo) à mi-juin où elle habite les prairies sommitales. Un oiseau est levé à Puerto del Pico (Gredos) le 18 juin.

Canard chipeau (*Mareca strepera*) : Quelques oiseaux sur les zones humides (marais de S'Albuféra à Majorque, lagune de Fuente de Piedra, Donana).

Canard colvert (*Ana platyrhynchos*) : Noté un peu partout.

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) : Il s'agit de la ssp « parva », la même que celle du sud de la France ou des îles de Macaronésie (Canaries, Madère). Il est très commun, souvent abondant, partout.

Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) : 1 oiseau à Blancas le 15 avril, commune dans la dehesa d'Andujar fin mai et début juin, 1 chanteur à Casares le 9 mai, 1 dans le parc de Cabaneros le 23 avril, commune dans les steppes de Caceres en Estrémadure (occupe entre autres les nichoirs en compagnie des rolliers et faucons crécerelletes), commune à Villafafila (Otero par exemple).

Chocard à bec jaune (*Pyrrhocorax graculus*) : 3 oiseaux au col de Farapona (Somiedo) le 25 juin.

Choucas des tours (*Corvus monedula*) : Localisé. Observé à la lagune de Fuente de Piedra, en forêt de Barbate, commun à Donana, petite colonie

au monastère de Setefilla (Sierra Norte), commun dans les steppes de Caceres où il occupe les nichoirs en compagnie des rolliers, chevêches et faucons crécerelles, quelques oiseaux à Villafafila.

Chouette hulotte (*Strix aluco*) : commune, sauf dans le centre ouest où nous ne l'avons contactée qu'à Gredos.

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : commune, particulièrement à Donana.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : un premier oiseau à Lagunaseca le 21 avril (migrateur ?). 2 à Cerro del Hierro (Sierra Norte) le 28 mai, 1 le 29 et le 30 mai à Setefilla, 1 à Almadenejos le 3 juin. 1 à Siruela le 4 juin. 1 au niveau du pont sur le rio Almonte sur la route entre Caceres et Talavan (plan 18), 2 dans les steppes d'Hinojal (Caceres) le 11 juin, 3 dans le parc de Monfragüe (Pena Falcon) le 13 juin.

Cinle plongeur (*Cinclus cinclus*) : 1 à Gredos (chemin vers Laguna Grande) le 19 juin, commun à Somiedo (1 famille avec deux jeunes le 24 juin à Villar de Vildas), 1 le 27 juin en vallée de Cardenas à El Rio (La Demanda).

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : nombreuses observations un peu partout.

Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) : Un peu partout en Andalousie, commune dans les steppes de Caceres et à Villafafila.

Cochevis de Thekla (*Galerida theklae*) : Abondant à Majorque où il est le seul cochevis. Commun un peu partout, dans des zones plus pierreuses et souvent plus collinéennes que les secteurs où on rencontre le Cochevis huppé. Mais les deux espèces peuvent cohabiter sur certains sites. Absent de l'extrême nord (Somiedo, La Demanda). Étonnamment pas contacté à Villafafila.

Cochevis huppé (*Galerida cristata*) : Commun un peu partout, sauf à Majorque. Souvent dans des zones plus basses et plus cultivées que les zones où on rencontre le Cochevis de Thékla.

Cormoran huppé (*Phalacrocorax aristotelis*) : Il s'agit de la ssp « *desmarestii* ». Observé à Majorque (Portocolom, Cabrera).

Corneille noire (*Corvus corone*) : Commune dans le Nord-est. Absente d'Andalousie et du Centre-Ouest. On la retrouve à partir de Gredos et ensuite plus au nord (Villafafila, Somiedo, La Demanda).

Coucou geai (*Clamator glandarius*) : un juvénile à Rumblar (Sierra de Andujar) dans la forêt de chêne-liège le 31 mai. Plusieurs observations d'adultes dans les steppes de Caceres (entre le 4 et le 12 juin). Une famille (adulte et 3 jeunes) le 18 juin à Herguijella (au nord de la Sierra de Gredos).

Coucou gris (*Cuculus canorus*) : entendu et observé un peu partout, surtout en avril et mai.

Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) : Premier oiseau le 19 mai sur la lagune de Barbate. Commun à Donana.

Crave à bec rouge (*Pyrhocorax pyrrhocorax*) : fréquent localement dans le Nord-Est (Steppes de Blancas, sierra de Albaracin, Gallocanta, serrania de Cuenca), aussi en Andalousie (sierras de Andujar et de Los Merinos, Rio Guadiaro). Absent du Centre-Ouest. On retrouve l'espèce à Somiedo dans les Asturies.

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) : Commune sur les zones humides de Majorque (Salobrar de Campos, S'Albuféra). Présente sur les lagunes de Rincon et Fuente de Piedra (accouplements sur ce dernier site), sur la lagune de Barbate et le marais de Vejer, commune à Donana, commune dans les steppes de Caceres.

Effraie des clochers (*Tyto alba*) : Nous l'avons contacté à Vic (Catalogne), deux fois à Majorque (Capocorp, Ses Salines), puis à Villafafilla.

Elanion blanc (*Elanus caeruleus*) : Un oiseau à Donana (Villamanrique, plan 16 a) le 23 mai en soirée, posé au bord de la piste, puis un deuxième un peu plus au sud le 26 mai dans la matinée, dans les mêmes conditions. Un oiseau en vol de loin le 9 juin au sud de Monroy (Steppes de Caceres, Estrémadure, plan 18). C'est une espèce pas facile à contacter, car souvent présent dans des zones de cultures assez banales, peu prospectées finalement. Il serait plus facile à voir l'hiver, période pendant laquelle il fréquente les rizières (comme celles de Vegas Altas au sud de Trujillo, Estrémadure ou à Donana).

Engoulevent à collier roux (*Caprimulgus ruficollis*) : commun en Andalousie où nous l'avons contacté un peu partout, ainsi qu'en Estrémadure.

Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) : Remplace le précédent dans le nord de l'Espagne et est aussi présent en altitude au sud. Nous l'avons contacté en sierra de Béjar (Candelario) et à Somiedo.

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) : Rares observations un peu partout (Alto Tajo, Andujar, rio Guadiaro, sierra Canalizas).

Erismature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*) : 3 mâles et deux femelles à la lagune de Rincon le 2 et 3 mai. Une femelle à la lagune Amarga (à côté de Jauja) le 3 mai. Un couple à la lagune Fuente de Piedra le 4 mai. 4 mâles le 26 mai à Donana (Valverde, plan 16 a), dont un oiseau de 1^{er} été à tête noire.

Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*) : Commun partout.

Euplecte vorabé (*Euplectes afer*) : Ce superbe tisserin (mâle jaune et noir), répandu dans toute l'Afrique sub-saharienne, s'est récemment implanté (quelques oiseaux) comme nicheurs dans les marais de Donana, après une première colonisation du sud du Portugal. Nous avons vu un mâle et 4 ou 5 oiseaux en plumage femelle ou jeune, près de la dehesa d'Abajo (plan 16a).

Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*) : C'est un oiseau rare en Espagne. Nous avons entendu des cris au nord de la forêt de Barbate et à Serradilla (Monfragüe).

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : Commun partout.

Faucon crécerellette (*Falco naumanni*) : Deux couples sur le castillo de Castellar le 14 mai. Un couple au nord de la forêt de Barbate le 19 mai. 5 oiseaux à Donana (dans les cultures près du centre Valverde) le 26 mai. Commun dans les steppes de Caceres où il occupe entre autres les nichoirs en compagnie des rolliers, choucas et chevêches. Commun à Villafafila.

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) : Un oiseau dans les landes au dessus de la vallée de la Cardenas (La Demanda) le 27 juin.

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) : Un oiseau à Ventosa (Alto Tajo) le 19 avril. 1 le 9 mai à Montejaque (Rio Guadiaro), 1 couple à Casares (Sierra Crestellina) le 9 mai, 1 oiseau avec une proie le même jour près de la rivière Genal à Casares, 1 couple le 13 mai à Jimena sur le château, 1 oiseau à Bolonia le 17 mai.

Fauvette à lunettes (*Sylvia conspicillata*) : Un couple cantonné à Lagunaseca (Serrania de Cuenca) le 20 avril dans une garrigue (plan 4).

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*) : Commune partout.

Fauvette des Baléares (*Sylvia balearica*) : Endémique des Baléares (absente de Minorque), elle a été récemment séparée de la Fauvette sarde. Elle est notée commune à Majorque mais est étonnamment difficile à contacter (au moins au mois d'avril). On peut supposer qu'elle chante plus tôt en saison. Nous l'avons contactée et bien observée (deux chanteurs) à Portocolom les 5 et 6 avril, puis sur l'île de Cabrera (3 chanteurs) le 10 avril.

Fauvette des jardins (*Sylvia borin*) : Elle est présente uniquement dans la partie nord de l'Espagne. Nous ne l'avons donc contactée logiquement qu'à Somiedo en juin où elle est commune, et dans La Demanda.

Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : Elle est surtout présente dans le nord de l'Espagne et aussi dans les sierras du sud, en altitude. Nous avons observée un oiseau (migrateur?) à Lagunaseca (Serrania de Cuenca) le 20 avril. Et il nous faudra attendre d'être à Gredos (à partir du 15 juin) pour la retrouver. Elle est commune sur ce site. Ensuite nous la retrouvons à Somiedo (Asturies) du 22 au 25 juin.

Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) : C'est de loin la fauvette la plus commune d'Espagne. Elle est abondante à Majorque et dans le sud (à partir de Cuenca), en Estrémadure. Elle « disparaît » à partir de Gredos, puis dans les Asturies et La demanda où elle est manifestement remplacée par la fauvette grisette.

Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*) : Un premier chanteur à Berrueco (Gallocanta) le 18 avril. Puis l'espèce est observée à Ventosa, Lagunaseca, en sierra de Andujar (commune), en sierra de Los Merinos, dans la Monfragüe, à Ahigal.

Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*) : Absente comme nicheuse de Majorque où elle est remplacée par la fauvette de Moltoni. 2 chanteurs à Vic (Catalogne) du 2 au 3 avril, puis le 12 avril. Puis notée communément un peu partout ensuite dans le centre (Gallocanta, serrania de Cuenca, Alto Tajo) et en Andalousie. Un oiseau à Villafafila le 21 juin (migrateur?).

Fauvette pitchou (*Sylvia undata*) : 2 chanteurs le 20 avril à Lagunaseca, 1 chanteur à Jonquillo (sierra de Andujar) le 27 avril, plusieurs chanteurs à Acebuche (Donana) le 25 mai, 2 chanteurs à Puerto del Pico (Gredos) le 18 juin.

Flamant rose (*Phoenicopterus roseus*) : Une dizaine à Salobrar de Campos (Majorque) le 6 avril. Nombreux oiseaux sur la lagune de Fuente de Piedra (principale colonie ibérique). Une dizaine à Barbate le 19 mai. Nombreux oiseaux à Coto Donana.

Foulque caronculée (*Fulica cristata*) : Un oiseau à la réserve de S'Albuféra (Majorque) le 7 avril (plan 1d), un deuxième le 8 avril sur le même site (et deux oiseaux équipés de colliers). L'espèce fait l'objet d'un programme de réintroduction sur Majorque.

Foulque macroule (*Fulica atra*) : Oiseaux observés à Majorque (Salobrar de Campos, S'Albuféra), sur un petit étang à Albaracin, sur les lagunes de Rincon et Fuente de Piedra ainsi qu'à Donana.

Fuligule milouin (*Aythya ferina*) : Plusieurs dizaines d'oiseaux observés à Majorque (S'Albuféra) les 7 et 8 avril, quelques oiseaux sur les lagunes de Rincon et Fuente de Piedra, plusieurs dizaines à Coto Donana.

Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*) : Un peu partout sur les zones humides.

Ganga cata (*Pterocles alchata*) : Beaucoup de contacts (dont des oiseaux posés) dans les steppes de Caceres entre le 4 et le 13 juin. Observé par couples ou tout petits groupes, souvent le soir ou le matin (plan 18)

Ganga unibande (*Pterocles orientalis*) : Etonnamment moins de contacts que pour le Ganga cata, mais sur plus de site : steppes de Blancas (13 le 16 avril), steppes de Caceres (2 le 4 juin, 2 le 7 juin, plan 18), 1 le 20 juin à Villafafila (plan 22).

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*) : Observé partout. Commun dans les dehesa de chênes et à Somiedo.

Glaréole à collier (*Glareola pratincola*) : Colonie (200 oiseaux) sur la lagune de Barbate les 19 et 22 mai. Quelques oiseaux à Donana (1 au sud de Séville le 23 mai, 3 à Valverde le 26 mai).

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : Premier à Ventosa le 19 avril, commun dans l'extrême sud.

Goéland d'Audouin (*Larus audouinii*) : 2 à Portocolom (Majorque) les 5 et 6 avril, 2 à Colonia Sant Jordi (Majorque), dans le port le 10 avril.

Goéland leucophée (*Larus michahellis*) : Commun à Majorque, sur la côte sud et Donana.

Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica azuricollis*) : Cette sous-espèce remarquable (endémique) existe sur quelques sites du nord-ouest de l'Espagne, surtout en sierra de Gredos où elle habite les landes humides d'altitude, un biotope ressemblant aux milieux utilisés par l'espèce type en Scandinavie. Elle a la gorge toute bleue, sans miroir. Plusieurs chanteurs le 16 juin au dessus de Candelario.

Grand corbeau (*Corvus corax*) : Observé un peu partout.

Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*) : Observation remarquable la nuit en bord de route, dans la sierra de Blanquilla (nord-ouest d'Algeciras), d'un oiseau posé sur un piquet de clôture, le 19 mai. Deux chanteurs, dont un bien observé au crépuscule au monastère de Setefilla (Sierra Norte) le 29 mai.

Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) : 6 le 7 avril à S'Albuféra (Majorque), 1 à Fuente de Piedra les 3 et 4 mai, 2 nicheurs sur la plage de Bolonia le 17 mai, 5 oiseaux sur la lagune de Barbate le 19 mai.

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*) : 4 individus à la lagune de Rincon le 2 mai, une trentaine sur l'étang de Rianzuella (Donana, près de la dehesa d'Abajo) le 24 mai, 2 à Valverde (Donana) le 26 mai.

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : Présent un peu partout dans les zones humides.

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) : 1 à S'Albuféra (Majorque) le 7 avril, 3 à la lagune de Rincon le 2 mai, une dizaine sur l'étang de Rianzuella (Donana, près de la dehesa d'Abajo) le 24 mai, une dizaine à Valverde (Donana) le 26 mai.

Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*) : Un peu partout.

Grive draine (*Turdus viscivorus*) : Commune, surtout dans les zones collinéennes et dans les sierras en altitude.

Grive musicienne (*Turdus philomelos*) : Niche uniquement dans le nord de l'Espagne. Chanteurs à Vic (Catalogne) le 2 avril, puis on retrouve des chanteurs dans l'extrême nord (Somiedo, La Demanda) à partir du 22 juin.

Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*) : Commun en sierra d'Andujar, particulièrement sur le site de la Lancha (plan 7), en Sierra Norte et en Estrémadure.

Guêpier d'Europe (*Meriops apiaster*) : commun partout, sauf dans l'extrême nord.

Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*) : 2 sur l'étang de Rianzuella (Donana, près de la dehesa d'Abajo) le 24 mai, une trentaine à Valverde (Donana) le 26 mai.

Héron cendré (*Ardea cinerea*) : un peu partout sur les zones humides.

Héron gardeboeufs (*Bubulcus ibis*) : Nombreux le 7 avril à S'Albuféra (Majorque), commun en Andalousie, singulièrement à Donana et en sierra de Retin (Barbate), 1 au castillo de Monfragüe le 14 juin.

Héron pourpré (*Ardea purpurea*) : 1 oiseau le 2 mai à la lagune de Rincon, nombreux à Valverde (Donana) le 26 mai.

Hibou des marais (*Asio flammeus*) : Le Hibou des marais est un nicheur rare en Espagne. Nous avons trouvé un couple nicheur à Villafafila les 20 et 21 juin, plusieurs oiseaux en soirée dans la même zone au crépuscule le 21 juin (plan 22).

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) : Commune partout.

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*) : Bien peu de contact avec cette hirondelle ! Quelques oiseaux à Salobrar de Campos (Majorque) le 6 avril, 2 à Valverde (Donana) le 26 mai, 2 le 18 juin à Herguijuella (au nord de Gredos).

Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*) : Commune partout dans les sierras.

Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica*) : 1 le 12 avril à Vic (Catalogne), commune en Andalousie et en Estrémadure.

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : Commune partout.

Huppe fasciée (*Upupa epops*) : Commune partout, sauf dans l'extrême nord.

Hypolaïs obscure (*Iduna opaca*) : Cette hypolaïs est présente surtout en Andalousie et très localement au nord-est. Nous l'avons contactée pour la première fois le 2 mai au bord d'un petit ruisseau au sud de Cordoue (Espejo), puis un chanteur sur la lagune de Rincon le 3 mai. 1 chanteur sur la lagune Amarga le 3 mai. 1 chanteur à la lagune Fuente de Piedra le 4 mai. 2 chanteurs à Casares au bord du rio Genal le 9 mai (plan 12). 1 chanteur sur l'étang de Rianzuella (Donana, près de la dehesa d'Abajo) le 24 mai.

Hypolaïs polyglotte (*Hyppolais polyglotta*) : Commune un peu partout, surtout en Andalousie.

Ibis chauve (*Geronticus eremita*) : Cette espèce très rare est très menacée. Elle n'existe plus à l'état sauvage que dans deux colonies au Maroc et fait l'objet de réintroductions en Turquie, en Autriche et en Espagne à Barbate. En 2017, seules deux petites colonies (quelques oiseaux) étaient encore effectives, l'une près de Vejer de la Frontera et l'autre au nord de Barbate, à Conil de la Frontera. Nous avons observé un couple avec deux poussins sur la colonie de Vejer (lieu-dit Barca de Vejer). Les oiseaux sont installés en bord de route sur une petite falaise à seulement quelques mètres de hauteur.

Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*) : 2 le 18 mai au nord de Vejer de la Frontera, abondant à Valverde (Donana), quelques oiseaux le 28 mai à Lora del Rio (Sierra Norte).

Linotte mélodieuse (*Linaria cannabina mediterranea*) : Commune partout.

Locustelle lusciniöide (*Locustella luscinioides*) : 2 chanteurs à Donana (La Rocina) le 25 mai.

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*) : Commun en Andalousie et en Estrémadure. Peut-être l'absence de contacts dans le nord-est de l'Espagne (début avril) est-elle due à leur arrivée plus tardive.

Lusciniöle à moustaches (*Acrocephalus melanopogon*) : 2 chanteurs à la réserve de S'Albuféra (plan 1 d) dont 1 très bien observé longuement au télescope le 8 avril.

Martinet à ventre blanc (*Tachymarptis melba*) : 150 en deux heures le 2 avril à Vic (Catalogne). 5 à Ventosa le 19 avril, 1 à La Lancha (sierra de Andujar) le 1^{er} mai, 5 à Montejaque le 7 mai, 5 autour du pont sur le rio

Almonte sur la route de Caceres à Talavan le 6 juin, 1 au dessus du castillo de Monfragüe le 12 juin.

Martinet cafre (*Apus caffer*) : Cette espèce africaine s'est implantée à partir des années 1960 en Andalousie, puis au Maroc. Elle reste rare en Espagne (moins de 200 couples), quoiqu'en augmentation et en progression vers le nord ; elle atteint l'Estrémadure aujourd'hui. Le Martinet cafre habite en couples isolés ou toutes petites colonies les sierras du sud de la péninsule ibérique, où il occupe d'anciens nids d'hirondelles rousselines. Aujourd'hui, la colonie de Bolonia, indiquée dans beaucoup de guides, est désertée et l'espèce est très difficile à trouver. Nous avons observé 2 couples sur le monastère de Setefilla en Sierra Norte (grâce à Rafaël Porrino, guide) du 27 au 30 mai. Il faut être très patient et souvent attendre longtemps avant de voir les oiseaux (plus facilement le soir ou le matin tôt). Un autre oiseau est observé sur le site de Cerro del Hierro (Sierra Norte, plan 17) le 28 mai. Enfin un oiseau est observé sur le castillo de Monfragüe le 14 juin.

Martinet des maisons (*Apus affinis*) : Espèce africaine répandue entre autres au Maroc, ce martinet est un nicheur récent en Espagne. A la différence du Martinet cafre, il recherche des sites plus anthropisés (souvent dans des ports) ; en 2017, une colonie existait à Chipiona, au nord de Cadix. Il est encore plus rare que le Martinet cafre. Nous avons eu la chance de voir deux oiseaux sur le monastère de Setefilla le 28 mai. Il se reproduit en effet dans une colonie d'hirondelles de fenêtre au nord du monastère (plan 17) et vient de temps en temps survoler le monastère. C'est probablement en fait le seul site espagnol où il est possible de voir ensemble les deux espèces de martinets africains.

Martinet noir (*Apus apus*) : Commun partout.

Martinet pâle (*Apus pallidus*) : Ce martinet est présent sur la côte Est et plus localement en Estrémadure. Il est toujours difficile à distinguer du Martinet noir et des oiseaux ont ainsi pu nous échapper. Une vingtaine à Portocolom (Majorque) le 5 avril, 1 à La Lancha (Andujar) le 1^{er} mai, 5 à Montejaque le 9 mai, une dizaine autour du rio Genal à Casares le 9 mai, 2 à Jimena le 13 mai, 3 nicheurs sur une petite maison au bord de la plage de Bolonia le 19 mai, 2 à Donana (Dehesa de Abajo) le 24 mai, 3 à Rumbler le 1^{er} juin (Andujar), 2 sur le castillo de Monfragüe le 14 juin, une colonie dans le village de Candelario (Gredos) le 16 juin.

Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*) : le premier à Jimena sur le rio Hozgarganta le 12 mai, 2 à Rianzuella (Donana) le 24 mai, 1 à Alanis (Sierra Norte) sur la rivière Onza (plan 17), 1 à Almadenejos le 3 juin (plan 6 b), 1 sur le rio Almonte (Caceres) le 8 juin.

Merle noir (*Turdus merula*) : Commun partout.

Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*) : un peu partout, observée plus fréquemment en Estrémadure. Il s'agit de la ssp « irbii », remarquable par son manteau gris. Nous avons aussi contacté dans la sierra de La Demanda la ssp « taiti », plus classique, du sud de la France et du nord de l'Espagne.

Mésange bleue (*Cyanistes caeruleus*) : Commune partout. Nous avons vu à Mortitx (Baléares, plan 1 e) le 9 avril 2 oiseaux de la ssp « balearicus », qui est peu commune.

Mésange charbonnière (*Parus major*) : Commune partout.

Mésange huppée (*Lophophanes cristatus*) : Peu commune, mais observée un peu partout dans les sierras. Une nidification sur la sierra de Los Merinos (Ronda, Andalousie) dans le tronc d'un arbre tombé au sol. Absente de Majorque.

Mésange noire (*Periparus ater*) : Observée dans le nord, mais bien peu ailleurs. 2 en sierra de Los Merinos, le 5 mai, 1 contact à La Hoya (Gredos) le 17 juin.

Mésange nonnette (*Poecile palustris*) : Cette espèce est localisée à l'extrême nord de l'Espagne. Nous l'avons observée à Somiedo et La Demanda).

Milan noir (*Milvus migrans*) : Observé partout, mais particulièrement abondant à Donana et dans les steppes de Caceres. Nous avons vu de nombreux migrants à Bolonia les 16 et 17 mai.

Milan royal (*Milvus milvus*) : 2 oiseaux le 9 avril à Pollença (Majorque), 1 à Ventosa (Alto Tajo) le 19 avril, 1 à Valverde (Donana) le 26 mai, 1 à Ahigal le 15 juin, 1 à Gredos le 18 juin, 1 à Otero (Villafafila) le 21 juin.

Moineau domestique (*Passer domesticus*) : Commun partout.

Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*) : Ce moineau est en fait présent essentiellement à l'ouest du pays. Nous avons contacté les premiers à Avellanar (Cabaneros) le 23 avril, puis à Donana dans les zones de cultures. Commun dans les steppes de Caceres, observé aussi à Ahigal.

Moineau friquet (*Passer montanus*) : Ce moineau est censé être commun dans toute l'Espagne. Pourtant, nous ne l'avons contacté que trois fois, et très peu d'individus à chaque fois. Est-il en fort déclin comme en France ?

2 individus le 16 avril à Blancas, 4 à Acebuche (Donana) le 25 mai et 3 à Villafafila le 20 juin.

Moineau soulcie (*Petronia petronia*) : Observé un peu partout en petit nombre, mais nettement plus souvent que le Moineau friquet. A noter une cinquantaine à Montejaque le 8 mai.

Monticole bleu (*Monticola solitarius*) : Commun à Majorque, commun dans les sierras d'Andalousie, observé aussi dans les steppes de Caceres, le long des cours d'eau, dans le parc de Monfragüe, à Gredos à plus faible altitude que le Monticole de roche.

Monticole de roche (*Monticola saxatilis*) : Plusieurs chanteurs le long du chemin menant à la Grande lagune de Gredos le 19 juin. 1 chanteur à Somiedo (col de Farapona) le 25 juin.

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : Une vingtaine à la lagune de Fuente de Piedra le 4 mai. Une dizaine à la grande lagune de Villafafila le 20 juin.

Nette rousse (*Netta rufina*) : Une famille avec 8 canetons le 8 avril à S'Albuféra (Majorque), une conquantaine à Rianzuella (Donana) le 24 mai, une dizaine à Valverde (Donana) le 26 mai.

Oedicnème criard (*Burhinus oedicephalus*) : Abondant à Majorque où nous l'avons trouvé partout, y compris dans des garrigues à végétation assez haute. Observé aussi dans les steppes de Blancas, une famille à la lagune de Rincon le 2 mai, un près de Villamanrique (Donana), en zone de cultures, le 24 mai, quelques contacts dans les steppes de Caceres (cris la nuit). Finalement, nous avons peu contacté l'espèce, mis à part à Majorque.

Ouette d'Egypte (*Alopochen aegyptiaca*) : 1 oiseau sur le lac de barrage d'Almadenejos le 24 avril. Il sera revu le 3 juin, mais cette fois-ci avec une femelle et 3 poussins. 1 oiseau sur un petit étang sur la route entre Oliva de Plasencia et Ahigal le 14 juin.

Outarde barbue (*Otis tarda*) : Les recherches de l'Outarde barbue se sont révélées vaines dans les steppes de Caceres entre le 5 et le 13 juin. Par contre, nous l'avons très facilement observée (males, femelles et jeunes, jusqu'à 27 ensemble) à Villafafila (plan 22, au nord est du village) les 20 et 21 juin.

Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*) : Un seul contact avec cette espèce en fort déclin en Espagne. Un mâle observé en sierra Canalizas dans une prairie (plan 6 a, Sarecuela) le 24 avril.

Perdrix grise (*Perdix perdix hispaniensis*) : Il s'agit d'une sous-espèce très particulière, habitant les landes de montagne dans les Pyrénées espagnoles et françaises et les monts cantabriques entre 1500 et 2500 m d'altitude. Elle est notée en déclin en Espagne. Il s'agit peut-être d'une espèce propre (au moins il y a quelques décennies car les populations semblent s'être hybridées avec des perdrix « de plaine » introduites par les chasseurs). Nous avons entendu des chants à Somiedo (col de Farapona) le 23 juin, mais sans voir les oiseaux. Des panneaux indiquent un programme de préservation sur le massif de la Demanda à Valdezcaray, mais nous n'avons pas pu contacter les oiseaux le 28 juin.

Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) : Commune partout.

Petit gravelot (*Charadrius dubius*) : 6 à la réserve de S'Albuféra (Majorque) le 8 avril, 1 à la lagune de Rincon le 2 mai, 1 à la lagune de Fuente de Piedra le 4 mai, 1 à Casares (rio Genal) le 9 mai, commun dans les steppes de Caceres et la Monfragüe le long des rios.

Petit-duc scops (*Otus scops*) : Commun à Majorque, en sierra de Andujar (belle observation d'un oiseau en chasse la nuit à Rumblar le 1^{er} juin), à Avellanar (Cabaneros), à Montejaque le 7 mai. Ce qui fait finalement bien peu. Cette espèce est notée en déclin en Espagne.

Pic de Sharpe (*Picus sharpei*) : Il s'agit du Pic vert ibérique, bien différentiable par le cri du Pic vert européen. Nous l'avons contacté communément un peu partout, sauf en juin au nord-ouest (question de date où est-il moins commun dans cette zone ?).

Pic épeiche (*Dendrocopos major*) : Commun partout.

Pic épeichette (*Dryobates minor*) : Cette espèce est très localisée en Espagne (surtout Estrémadure, région de Salamanque et Catalogne). Il est noté en expansion et est présent depuis peu en Andalousie. Nous l'avons contacté à Vic (Catalogne) les 2 et 12 avril, 1 le 10 juin à Seradilla (Monfragüe).

Pie bavarde (*Pica pica melanotos*) : Observée un peu partout, sauf dans le sud de l'Andalousie.

Pie bleue (*Cyanopica cooki*) : Abondante en Estrémadure et dans les régions de Castille avoisinantes (Cabaneros, Sierra Canalizas, Gredos), abondante aussi à Donana, en sierra de Andujar et en sierra Norte. 2 oiseaux à Corcoya (sud de Cordoue) le 3 mai.

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) : ssp « badius », observée à Capocorb et Ses Salines (Majorque) du 6 au 10 avril. Ssp « rutilans », commune en Andalousie et en Estrémadure. C'est, de loin, la pie-grièche la plus répandue en Espagne.

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) : Présente seulement dans le nord de l'Espagne. Nous l'avons contactée (2 couples) à Somiedo les 23 et 24 juin et dans la Sierra de La Demanda (Vallée de Cardenas) le 26 juin.

Pie-grièche méridionale (*Larus meridionalis*) : la première le 7 mai à Montejaque. Commune en Estrémadure.

Pigeon biset (*Columba livia*) : Il s'agit, comme en France, de populations férales. Il est commun partout.

Pigeon colombin (*Columba oenas*) : Très peu de contacts. Un chanteur à La Lancha (Andujar) dans la dehesa de chênes le 1^{er} mai, 1 autre dans le même milieu à Rumbiar (Andujar) le 1^{er} juin. Enfin un oiseau vu à Villafafila dans la steppe (!) le 21 juin.

Pigeon ramier (*Columba palumbus*) : Abondant partout ; c'est l'un des oiseaux les plus communs d'Espagne.

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) : Commun partout.

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) : C'est une espèce présente seulement dans le nord de l'Espagne. 1 chanteur à Ventosa le 19 avril (limite sud de répartition). Puis nous retrouvons l'espèce à Somiedo et dans La Demanda fin juin. Il habite les parties hautes des sierras, pas obligatoirement avec présence d'arbres, et côtoie alors les pipits spioncelles et...rousselines !

Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : Commun à Majorque et dans les steppes de Blancas. 1 chanteur à Casares (sud Andalousie) en zones de cultures le 10 mai, 2 à la lagune de Barbate le 19 mai, 2 à Valverde (Donana) le 26 mai. Etonnamment absent des steppes d'Estrémadure. Par contre nous le retrouvons communément en altitude à Gredos, en compagnie des pipits des arbres et spioncelles !

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) : Restreint aux sierras d'altitude du nord de l'Espagne. Chanteurs notés à Gredos, Somiedo, La Demanda. Il vie en sympatrie avec les pipits des arbres et rousselines.

Pouillot de Bonelli (*Rhadina bonelli*) : Commun, voire abondant, partout, sauf en Estrémadure où nous ne l'avons pas contacté, ce qui correspond bien aux aires de répartition connues. Nous ne l'avons pas contacté à Majorque (mais peut-être n'était-il pas arrivé début avril ?). Nous le retrouvons en juin à partir de Gredos.

Pouillot ibérique (*Phylloscopus ibericus*) : Cette espèce endémique de la péninsule est présent (il remplace alors le pouillot véloce) au nord-ouest du pays mais aussi localement dans les sierras humides d'Andalousie. 2 chanteurs le 13 mai à Jimena (Andalousie) le long du rio Hozgarganta, 1 à Castillo de Castellar le 14 mai. Nous retrouvons l'espèce dans sa principale zone de répartition à Domiedo (Asturies) : 1 chanteur au col de Farapona le 23 juin, 1 le 24 juin à Valle de Lago en bordure de ruisseau. Pas de contact en sierra de La Demanda.

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) : Présent dans le nord-est de pays (surtout en Catalogne), le Pouillot véloce se reproduit aussi localement dans des sierras du nord du pays, son statut y étant mal connu. 1 chanteur à Vic (Catalogne) le 2 avril. 1 chanteur à Ventosa, Alto Tajo (migrateur?) le 19 avril.

Puffin de Scopoli (*Calonectris diomedea*) : 10 le 11 avril observés du bateau Majorque-Barcelone.

Puffin des Baléares (*Puffinus mauretanicus*) : 1 le 11 avril observé du bateau Majorque-Barcelone.

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) : 4 à la réserve de S'Albuféra (Majorque) le 8 avril. Aucun sur le continent.

Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapilla*) : commun, y compris dans les sierras d'Andalousie. Absent d'Estrémadure. On retrouve l'espèce dans la sierra de Gredos, puis à Somiedo et La Demanda.

Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*) : L'espèce est surtout présente dans le sud-est du pays et l'Estrémadure. Nous l'avons observé dans les steppes de Caceres où il est commun sur un secteur équipé de nichoirs (il cohabite avec la Chevêche, le Faucon crécerellette et le Choucas).

Roussin philomèle (*Luscinia megarhynchos*) : Commun partout, voire abondant localement, sauf dans l'extrême nord-ouest du pays.

Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*) : Commun dans le Nord-Est, localement aussi dans les sierras du sud. Nous le retrouvons ensuite à Gredos, puis à Somiedo et La Demanda.

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) : Ssp « gibraltarensis » : observé à Vic, Sierra de Albaracin, steppes de Blancas et Ventosa (Alto Tajo) en avril. Ssp « aterrimus », à dos noir, aucune observation en Andalousie. Noté par contre en Estrémadure et à Gredos (commun sur les rio de steppes de Caceres et dans la Monfragüe). Présent aussi à Villafafila et commun à Somiedo.

Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*) : 3 chanteurs à la lagune de Rincon le 2 mai, 2 chanteurs à la lagune de Fuente de Piedra le 3 mai. 5 chanteurs dans le marais de Vejer le 22 mai. Abondante à Donana.

Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*) : Un premier chanteur (migrateur?) à Majorque dans la réserve de S'Albuféra le 8 avril. 1 chanteur le 4 mai à la lagune de Fuente de Piedra, abondante à Donana, 1 chanteur à Almadenejos (Sierra Canalizas) le 3 juin.

Sarcelle marbrée (*Marmaronetta angustirostris*) : Une, puis deux autres, à Valverde (Donana) le 26 mai.

Serin cini (*Serinus serinus*) : Commun, voire abondant, partout.

Sirli de Dupont (*Chersophilus duponti*) : 3 chanteurs à Blancas (dont un observé) le 13 avril.

Sittelle torchepot (*Sitta europaea*) : Ssp « hispaniensis » : un peu partout en petit nombre (Catalogne, Alto Tajo, sierras du sud, sierra Canalizas, Monfragüe, sierra de Gredos. Ssp « caesia » : sierra de La Demanda.

Spatule blanche (*Platalea leucorodia*) : une en vol au dessus de la mer à Bolonia le 17 mai. Commune à Valverde (Donana) le 26 mai.

Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*) : Une vingtaine à la lagune de Fuente de Piedra les 3 et 4 mai. 5 à Villafafila le 20 juin.

Sterne naine (*Sternula albifrons*) : 4 le 19 mai à la lagune de Barbate.

Talève sultane (*Porphyrio porphyrio*) : 6 à S'Albuféra (Majorque) les 7 et 8 avril, 2 à la lagune de Rincon le 2 mai, 2 à Rianzuella (Donana) le 24 mai, 2 à Valverde (Donana) le 26 mai.

Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*) : Commun partout.

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*) : Commun à Majorque entre le 4 et le 10 avril (Nicheurs locaux ou migrateurs ?). 1 chanteur à Ventosa (Alto Tajo) le 19 avril. 1 le 29 mai à Setefilla (Sierra Norte). C'est bien peu !

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : Première le 10 avril à Ses Salines (Majorque). Migrateur ou oiseau local de la ssp « arenicola » ? Pas de contacts ensuite dans le nord-est du pays entre le 12 et le 21 avril. Un seul oiseau à Almadenejos le 25 avril, alors que nous la trouvons commune lors de notre passage du 4 juin sur ce site. Ceci semble bien indiquer que le peu de contacts en avril s'explique par le fait que les oiseaux n'étaient pas encore revenus de migration. Nous ne la contactons pas non plus dans la sierra d'Andujar entre le 27 avril et le 1er mai, tandis que nous la trouvons commune sur le même site entre le 30 mai et le 2 juin. A partir de mai, nous la rencontrons régulièrement en Andalousie. 1 chanteur le 7 juin dans les oliveraies à Monroy (Estrémadure, steppes de Caceres) et absence de contact dans le nord-ouest du pays. L'espèce est donc finalement fort localisée.

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) : Commune partout.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) : Nous le rencontrons communément dans le nord-est du pays entre le 12 et le 21 avril (Steppes de Blancas, Albaracin, Gallocanta, Cuenca) sans qu'il soit facile de savoir s'il s'agit de migrateurs nordiques (ssp « oenanthe ») ou de nicheurs locaux (ssp « libanotica »). Puis, aucun contact dans le sud et l'ouest du pays (Andalousie et Estrémadure). Nous trouvons les nicheurs locaux à Gredos (où l'espèce est commune), Villafafila, Somiedo et La Demanda.

Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) : Commun dans les steppes de Blancas entre le 12 et le 16 avril, 1 le 7 mai en sierra de Los Merinos (Ronda), 1 le 28 mai en Sierra Norte (A l'est d'Alanis), 1 mâle « stapazin » dans les steppes de Caceres (Estrémadure) le 7 juin, 2 (mâle et juvénile) dans les steppes d'Hinojal (Caceres) le 11 juin, 3 chanteurs dans les oliveraies d'Ahigal le 15 juin.

Traquet rieur (*Oenanthe leucura*) : Un seul contact pour cette espèce plus commune dans la partie sud-est du pays où nous ne sommes pas allés. 1 mâle nourrissant à Montejaque le 7 mai.

Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) : Commun partout.

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) : 1 à la lagune de Fuente de Piedra le 4 mai. 1 à Valverde (Donana) le 26 mai. 3 à Villafafila le 20 juin.

Vautour fauve (*Gyps fulvus*) : Commun partout.

Vautour moine (*Aegypius monachus*) : 1 en sierra de Tramuntana (Majorque) le 9 avril ; observé régulièrement en Estrémadure et en

Castille avoisinante, régulièrement aussi en sierra d'Andujar (Andalousie).
1 à Montejaque le 9 mai, 1 à Setefilla le 29 mai.

Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*) : 2 à Ventosa les 18 et 19 avril, 1 à Lagunaseca (Serrania de Cuenca) le 20 avril, 1 à Casares (sierra de Crestellina) le 9 mai, 1 immature à Jimena le 13 mai, 1 près de Monroy sur le rio Almonte (steppes de Caceres, plan 18) le 6 juin, 1 sur le même cours d'eau plus près de Monroy le 9 juin, 1 à Serradilla le 10 juin, 1 au castillo de Monfragüe le 14 juin. 2 le 23 juin (1 ad et 1 imm) au col de Farapona (Somiedo).

Verdier d'Europe (*Chloris chloris*) : Un peu partout, plus abondant à Majorque et en Andalousie.

2) Oiseaux migrateurs

Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*) : deux individus le 8 avril dans la réserve de S'Albuféra à Majorque.

Bécasseau minute (*Calidris minuta*) : trois individus les 3 et 4 mai à la lagune de Fuente de Piedra.

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*) : un oiseau le 19 mai et trois le 22 mai sur la lagune de Barbate.

Bécasseau variable (*Calidris alpina*) : un individu les 3 et 4 mai à la lagune de Fuente de Piedra, un autre à la lagune de Barbate le 19 mai, trois sur ce site le 22 mai.

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) : deux le 7 avril dans la réserve de S'Albuféra à Majorque.

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) : *Ssp flava*. 5 individus le 6 avril sur les salines de Salobrar de Campos (Majorque).

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : Les premières (7 individus) observées le 29 avril à Jonquillo (Sierra de Andujar), 2 à El Burgo le 5 mai, 1 à Casares le 9 mai, 2 à Jimena le 13 mai, nombreux migrateurs en trois jours, du 15 au 17 mai à Bolonia (1000 oiseaux estimés), 2 à Barbate (forêt) le 19 mai.

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) : 2 à S'Albuféra (Majorque) le 8 avril, 1 à Fuente de Piedra le 3 mai.

Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*) : 3 à S'Albuféra (Majorque) le 8 avril.

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*) : 3 à S'Albuféra (Majorque) le 8 avril.

Chevalier gambette (*Tringa totanus*) : 1 à Fuente de Piedra le 3 mai.

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) : Quelques migrateurs isolés sur les zones humides ou les rivières (rio Jandular en sierra de Andujar, lagunes de Rincon et Fuente de Piedra, Marais de Vejer, embalse d'Almadenejos).

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) : 2 à S'Albuféra (Majorque) le 8 avril.

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*) : quelques hivernants attardés à Majorque, près de Ses Salines.

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) : un oiseau à Portocolom (Majorque) le 5 avril.

Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*) : 2 dans les steppes de Blancas le 13 avril.

Fauvette passerinette des Balkans (*Sylvia cantillans albistriata*) : Nous contactons un individu de ce taxon occasionnel en Espagne sur l'île de Cabrera le 10 avril.

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : 2 mâles à Cabrera (Majorque) le 10 avril, 1 mâle le 18 avril à Berrueco (Gallocanta), 1 mâle le 20 avril à Lagunaseca, 1 femelle le 2 mai à Rincon, 1 mâle le 19 mai en forêt de Barbate.

Gobemouche noir ibérique (*Ficedula hypoleuca iberiae*) : La population nicheuse ibérique (surtout espagnole) du Gobemouche noir est nettement différente (les mâles) du taxon du reste de l'Europe. Les oiseaux ont plus de blanc sur l'aile et une tache frontale plus grande. Ils ressemblent ainsi fortement au Gobemouche de l'Atlas (*Ficedula sperculigera*) qui est maintenant reconnu comme espèce propre. Nous avons vu un mâle de cette ssp le 8 mai à Montejaque.

Goéland brun (*Larus fuscus*) : Un oiseau ssp « graellsii » le 4 mai à la lagune Fuente de Piedra.

Grand cormoran (*Phalacrocorax carbo*) : trois observations d'hivernants attardés (2 à S'Albuféra, Majorque le 8 avril, 1 au barrage de Setefilla, Sierra Norte le 28 mai, 1 à Zarza de Granadilla, nord de Plasencia, le 14 juin).

Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*) : Une dizaine d'individus à Fuente de Piedra les 3 et 4 mai, une dizaine le 19 mai à la lagune de Barbate, 2 à Donana (Valverde) le 26 mai.

Grande Aigrette (*Ardea alba*) : 1 le 7 avril à S'Albuféra (Majorque).

Grive musicienne (*Turdus philomelos*) : Un hivernant attardé à Majorque (S'Albuféra) le 7 avril. Un oiseau en mer vu du ferry Majorque-Barcelone le 11 avril.

Milan noir (*Milvus migrans*) : De nombreux migrants à Bolonia les 16 et 17 mai.

Mouette pygmée (*Hydrocoloeus minutus*) : 7 oiseaux vus du ferry Majorque-Barcelone le 11 avril.

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : Bien peu d'observations ! Quelques oiseaux à la lagune de Salobar de Campos (Majorque) le 6 avril.

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) : Quelques oiseaux (y compris chanteurs) à Majorque début avril, 2 à Blancas le 16 avril, dernier le 4 mai à la lagune de Fuente de Piedra.

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) : 2 sur l'île de Cabrera (Majorque) le 10 avril, 1 chanteur au cap blanc (Majorque) le 4 avril.

Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*) : Très localisé comme nicheur dans les zones boisées des sierras et le Nord-Ouest. Nous avons observé uniquement des migrants. Une dizaine de mâles sur l'île de Cabrera (Majorque) le 10 avril, 1 mâle dans les steppes de Blancas le 16 avril, 1 femelle à Berrueco (Gallocanta) le 18 avril.

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) : 1 hivernant attardé le 8 avril à S'Albuféra (Majorque).

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) : Une dizaine à S'Albuféra (Majorque) les 7 et 8 avril. 1 en vol à ses Salines (Majorque) le 10 avril.

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : 1 le 22 avril à Avellanar (Cabaneros), 3 le 4 mai à la lagune de Fuente de Piedra.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) : 3 à Portocolom (Majorque) le 6 avril.