

CORSE

I) Herpétofaune :

A) 4 espèces de lézards :

1) lézard de Tiliguerta (ou thyrrhénien) (Podarcis tiliguerta)

endémique Corse et Sardaigne ; partout en Corse, très répandu
dérive du lézard des murailles, absent de Corse, avec qui il ressemble parfois
tâches foncées réticulées plus ou moins importantes, certains ind colorés de bleu et reflets verts (surtout mâles)
biotopes très variés, mais avec généralement présence de qq rochers, murailles...

2) lézard sicilien (ou des ruines) (Podarcis sicula)

introduit il y a quelques siècles
secteur de Bonifaccio et en Corse du nord (St Florent, Cap Corse)
terrains peu accidentés à végétation basse clairsemée (maquis, garrigue naturelle ou brûlée)
ruines, murets, profite des milieux anthropisés
toujours large bande vertébrale tachetée et bordée de noir
dos vert, jaune, brun, gris, marbré de jaune-vert, noir et bleu
sous-espèce cettii (moins colorée, moins typique) dans le secteur de Bonifaccio où il a évincé le lézard de Tiliguerta

3) lézard de Bedriaga (ou lézard des montagnes) (Lacerta bedriagae):

endémique de la Corse et Sardaigne
absent du cap Corse et de la côte est
falaises, éboulis, bords de torrents, commun sur les grands pans de rochers
vit parfois en véritables colonies
aspect massif, assez gros, large tête au niveau des tempes
surtout montagnard, mais présent jusqu'au niveau de la mer si des grands pans de rochers se présentent

4) algyroïde de Fitzinger (Algyroides fitzingeri)

endémique de Corse et Sardaigne
présent entre Bonifaccio et Porto-Vecchio ainsi qu'entre Ajaccio et Ile Rousse ; rencontre aléatoire, sauf sur les murets du plateau autour de Bonifaccio
recherche biotopes préservés de l'aridité : broussailles et pentes rocheuses, vieux murs envahis de végétation, sous-bois de Pinèdes, endroits semis-ombragés
discret et actif en début matinée et fin après-midi; craintif, vit en groupe de 10-12
plus petit des lézards corses, uniformément brun olivâtre à noirâtre, parfois ligne vertébrale noirâtre, ventre jaune orange

B) 3 espèces de gecko :

1) tarente (ou gecko) de Mauritanie (Tarentola mauritanica):

sur vieux murs, rochers, rarement sur troncs
pendant les premières heures de la matinée ou la nuit, altitude en général entre 0 et 100 m pour plus de la moitié de la population corse
10-16 cm, 1 seule rangée de bandelettes adhésives sous chq doigt, 1 petite griffe s/ doigt 3, 4
dos gris, crème, brun, jaunâtre, marbré de tâches sombres

2) hémidactyle verruqueux (ou gecko turc) (Hemidactylus turcicus):

sur vieux murs (même en « ville »), rochers, troncs
strictement nocturne
dans le désert des Agriates et la cap Corse, vers Bonifaccio
altitude de 0 à 400 m en Corse
10-16 cm, 2 rangées de bandelettes adhésives sous chaque doigt, 1 longue griffe sur chq doigt
tubercules blanchâtres, tâches sombres en anneau sur la queue, dos brun-rouge, gris, brun clair

3) phyllodactyle d'Europe (= Euleptes europaea anciennement appelé Phyllodactylus europaeus) :

sous les pierres, tuiles, très rarement écorces et souches
strictement nocturne, strictement inféodé aux fentes étroites des rochers, particulièrement les croûtes d'érosion granitiques dans les chaos granitiques ; densités parfois très élevées
besoin de chaleur → ne s'éloigne guère des granites ; absent si ombragé
sur la côte sud ouest principalement, de Porto à Bonifacio + Lavezzi et en remontant jusque Porto-Vecchio
principalement côtier mais trouvé jusque 1720 m
nettement plus petit : 6-8 cm, 2 gdes lamelles adhésives sur chq doigt, 1 griffe rétractile sur chq doigt
dos gris, bleu, brun, marbré de tâches claires et sombres

C) Batraciens Tortues et Serpents

1) peu d'espèces de batraciens :

Anoures :

discoglosse sarde (*Discoglossus sardus*) : Corse Sardaigne, îles d'Hières, archipel toscan
discoglosse corse (*Discoglossus montalentii*) : endémique Corse, décrit en 1984
crapaud vert (*Bufo viridis*): omniprésent, principalement sur les côtes, sauf côtes rocheuses genre Porto
rainette verte corse (*Hyla arborea sarda*) : en fait sans doute une nouvelle espèce (travaux en cours ! → *Hyla sarda*), très répandue et facile à voir de nuit au bord de tous les torrents, et points d'eau, en juillet en tout cas)
grenouille verte : longtemps considérée comme *Rana lessonae*, mais actuellement : *Rana* (pélophylax) *bergeri* = Grenouille de Berger, forme non hybridée du sud de l'Italie
Rana kl. esculenta : introduite, notamment près de certains lacs barrages

Discoglosse corse (Discoglossus montalentii) : (1) **taille adulte** : longueur museau-anus, mâles, de 49 à 63 mm; femelles, de 46 à 54 mm. (2) **aspect général** : moyennement élancé. (3) **tête** : plus large que longue. (4) **museau vu de dessus** : arrondi ou assez aigu, allongé. (5) **museau vu de profil** : arrondi ou assez proéminent, plutôt horizontal entre l'œil et la narine et plutôt arrondi à l'extrémité. (6) **canthus rostralis** : indistinct (à vérifier). (7) **narines** : plus proches de l'extrémité du museau que de l'œil. (8) **pupille** : ovale verticale. (9) **iris** : coloré différemment en haut et en bas de l'œil, doré dans sa partie supérieure. (10) **tympan** : bien distinct, ayant un diamètre horizontal égal à sa distance à l'œil ou à la moitié du diamètre horizontal de l'œil. (11) **glandes parotoïdes** : absentes ou indistinctes. (12) **peau céphalique** : libre. (13) **tache temporale** : absente. (14) **membre postérieur** : plutôt mince, long (à vérifier); la patte étant rabattue le long du corps vers l'avant de celui-ci, le talon arrive du niveau de l'œil à l'extrémité du museau. (15) **longueur relative des doigts** : $1 < 2 < 4 < 3$ (à vérifier). (16) **longueur relative des orteils** : $1 < 2 < 5 < 3 < 4$. (17) **extrémités des doigts et des orteils** : dilatées ou assez rectangulaires. (18) **tubercules sous-articulaires des doigts et des orteils** : absents ou indistincts. (19) **tubercules surnuméraires entre les articulations des doigts et des orteils** : absents ou indistincts. (20) **tubercule métacarpien (prepollex)** : très proéminent. (21) **tubercule métatarsien interne (prehallux)** : allongé, cylindrique (à vérifier), sa longueur égale à environ 1/4 ou 1/3 de celle de l'orteil I. (22) **tubercule métatarsien externe** : absent ou indistinct. (23) **pli tarsien** : présent (à vérifier). (23) **palmure** : moyenne (à vérifier). (24) **peau dorsale** : lisse ou plus ou moins pustuleuse. (25) **replis latéro-dorsaux** : présents (à vérifier). (26) **coloration de la face supérieure du corps** : tachetée ou marbrée. (28) **chevron entre les épaules** : absent. (29) **coloration de la face inférieure du corps** : blanc nacré, uniforme ou piqueté de brun. (30) **tache brune sur l'avant-bras** : absente. (31) **coloration supérieure des membres** : avec taches ou barres. (32) **callosités nuptiales chez les mâles reproducteurs** : (33) **sacs vocaux chez les mâles reproducteurs** : (34) **avant-bras des mâles reproducteurs** : élargis (à vérifier). (35) **palmure des orteils** : (36) **couleur des œufs** :

Urodèles :

euprocte de Corse (*Euproctus montanus*): endémique de Corse ; ruisseaux aux eaux pures et oxygénées (car pas de poumons) entre 700 et 1500 m, se cache sous les blocs de rochers à proximité des ruisseaux la journée en juin-juillet (chercher partout, vers Bavella par exemple) ; absent si présence de la truite ; estivation en juillet - août
salamandre corse (*Salamandra salamandra corsica*): sous-espèce de Corse qui va sans doute très prochainement passer au rang d'espèce endémique de Corse (*Salamandra corsica*)

Rq en Sardaigne : euprocte de Sardaigne (*Euproctus platycephallus*), endémique de Sardaigne

2) Tortues :

Tortue d'Hermann *Testudo hermanni* : sous-espèce des régions méditerranéennes de l'ouest européen
Cistude d'Europe (*Emys orbicularis*) : sous-espèce endémique lanzaï

3) serpents :

sous-espèce corse de la couleuvre à collier (*Natrix natrix corsa*) : pas de collier !
couleuvre verte et jaune (*Coluber viridiflavus*) (avec variations de couleur dont bleu)
couleuvre vipérine (*Natrix maura*) aurait fait son apparition dans l'île ?? (rq : commune en Sardaigne)

II) Oiseaux :

Dans le désordre :

- goélands d'Audouin : nicheur sur la réserve intégrale des îles Finocchiaiola (nord du cap Corse), *présent sur les îles Lavezzi, facile à voir au sud de Propriano le long de la réserve de*
- cormoran huppé : en déclin, *îles Lavezzi*
- puffin cendré : nicheur à réserve de Scandola
- puffin yelkouan : en déclin
- pie-grièche à tête rousse : commune et facile à voir
- sittelle corse : 2000 couples, inféodée aux vieilles forêts de pins laricio entre 800 et 1200 m d'altitude, niche dans arbres pourris, découverte en 1883, seul oiseau endémique d'Europe → *semble courante près du col de Salto pres du col de Verghio en forêt d'Aitone ; cris variés dont un « kschhh » caractéristique et souvent émis → cri d'alarme ? ?*
- fauvette sarde : *localement commune, semble apprécier un maquis partiellement ouvert avec des rochers → se nourrit souvent sur les rochers*
- moineaux soulcie, cisalpin et espagnol (ce dernier serait localisé vers Bonifaccio ?)
- étourneau unicolore : à Bonifaccio, effectifs en pleine expansion
- corneille mantelée : effectifs en expansion *répandue, remplace la corneille noire*
- martinet pâle : *facile à voir à Bonifaccio*
- guêpiers d'Europe : 1500 couples, *assez répandu et facile à voir*
- colin de Californie : introduit pour la chasse
- marouettes poussin et de Baillon : lieux humides côte est et vers Ajaccio
- aigle royal : 30 couples
- balbuzard pêcheur : 30 couples dont 10-13 à Scandola ; *nids faciles à voir au Capo Rossu au sud de Porto*
- gypaète barbu : 8-10 couples, plus que 5 couples + 1 ad et 1 imm. en 1999 ; localisé principalement en haute montagne, par exemple vallée d'Asco, monté Cinto, mais fait qq excursions dans toutes la Corse
- hibou petit-duc : *omniprésent en tout cas dans tous les campings visités !*
- pigeon biset : nicheur dans les falaises (ça change de ceux des villes ! !)
- qq. sous-espèces corses: geai des chênes, mésange noire et charbonnière, venturon montagnard corse, pic épeiche, troglodyte mignon, gobe-mouche gris et bec-croisé des sapins, traquet motteux cyno-sarde *tous communs et faciles à observer, sans même les chercher*

Espèces nicheuses disparues :

pygargue à queue blanche (encore présent côte est en 1959)

pic à dos blanc (disparu depuis plus d'un siècle, mais observé en forêt d'Aitone - vers 1979 ?)

sterne caspienne

érisimure à tête blanche (encore présente en 1966 côte est, éradiquée par chasse, devait/devait être réintroduit à l'étang/réserve de Biguglia ? ? *vu l'état de conservation de la réserve, j'en doute ! !*).

III) Divers

A) Arthropodes

Lépidoptères :

Anciennement considéré comme sous-espèce du machaon, machaon hospiton est considéré comme une espèce endémique de Corse : *Papilio hospiton*

Nymphale de l'arbousier (= jason) : *Charaxes jasius à chercher dans le maquis, par exemple au Cap Corse*

Nacré tyrrhénien (*Fabriciana elisa*) : endémique de Corse

Quelques papillons abondants et caractéristiques :

Fadet tyrrhénien : *Coenonympha corinna* endémique Corse et Sardaigne

Mercure tyrrhénien : *Hipparchia neomiris*, endémique de Corse aime butiner les fleurs de ronce

Sylvain azuré (*Azuritis reducta*) : beaux reflets bleus

Azuré de l'ajonc de Corse : *Plebejus argus corsicus*

(Souci : *Colias crocea*)

Caloptéryx vierge : *Calopteryx virgo meridionalis* : ailes du mâle entièrement teintées

Caloptéryx méridional (*Calopteryx hemoroidalis*) : *commun a Porto sur le Porto et dans l'Asco*

Criquet égyptien

Cigales : 4 espèces dont 3 endémiques de Corse

Mantes religieuses : beaucoup de petites mantes genre *Ameles*

Grand capricorne : *Cerambyx cerdo* ; *Lucane cerf volant*

Scarabé rhinoceros et le parasite de ses larves la Scolie des jardins (*Scolia flavifrons*)

Scarabé sacré, rouleur de boules scatophages

Rosalie alpine (*Rosalia alpina*) : rare

Mylabre (*Mylabris variabilis*) : commun partout ; parasite les oothèques de criquets

Scorpion à queue jaune : *Euscorpium flavicaudis* ; commun ; à chercher de nuit sur les murets, de jour sous les cailloux

Scorpion des Carpates (*Euscorpium carpathicus*) : plus localisé dans les châtaigneraies

Malmignatte de corse, veuve noire (*Latrodectus mactans tredecimguttatus*) : paraît-il commune en Corse ; toiles horizontales

B) Mammifères

dauphin commun (le plus loin des côtes)

dauphin bleu et blanc (ne va pas dans les criques mais assez côtier)

grand dauphin (pénètre dans les criques, côtier)

rorqual commun (souvent au large de Calvi et du Cap Corse)

cachalot visibles de Barcaggio (cap Corse).

Mouflon corse : 800 sur 2 sites principaux (Bavella et surtout Asco-Monte Cinto)

Chèvre sauvage : Scandola

Autres Mammifères présents :

Belette, renard roux, chat forestier, hérisson d'Europe, Lièvre, Lapin de garenne, sanglier, Loir, Lérot, Souris grise, Rat noir, Rat surmulot, Mulot sylvestre, Musaraigne des jardins et Musaraigne étrusque

Chauves-souris : voir La corse de Delachaux, p122-125

Remarques :

- martre des pins (non confirmé) → en forêt d'Aitone, gorges de la Spelunca

- Cerf élaphe (*Cervus elaphus*) : disparu en 1969 par la chasse ; avait été introduit par les romains en -400 av J-C d'après des individus de Sardaigne ; réintroduit en 1985 à partir de 4 individus de Sardaigne (1 mâle, 1 biche, 1 bichette et un faon) d'abord mis en enclos pour les multiplier, premiers lâchés en 1998 à Quenza ; en 2002, 150 cerfs dans l'Alta Rocca + région d'Aléria (en comptant ceux des enclos ?).

- phoque moine : disparu depuis 1970 ?

Remarques :

Lacs se portant bien du point de vue eutrophisation : lac Mélo, Capitello (vallée de la Restonica), Gorla, Nielluccio ; par contre, lac Nico et Créno : excès de matières organiques (*mais paysages superbes quand même*)

Bibliographie :

L'oiseau magazine 57, hiver 1999

Batraciens et reptiles de Corse (atlas de répartition), Delaugerre et Cheylan, février 1992, édité / parc nat. rég. de Corse

Vivre avec les oiseaux

Terre sauvage, sentiers sauvages sur la Corse (2 numéros : 64 et 75)

La Corse, Delachaux et Niestlé, Alain Gauthier, avril 2002

Express magazine spécial Corse, juillet 2002

Amphibiens de France, Belgique, Luxembourg, à paraître en oct 2002, édition Parthénope

Haute Corse (2B)

A) Cap Corse

1) à Barcaggio : migration des rapaces

dune de Barcaggio derrière la plage : intéressante du point de vue bot, mais accès interdit sur une grande partie

2) Itinéraire Macinaggio → Centuri

Si vent, ne pas prendre les tronçons Capandula/Agnello et Tollare/Centuri (risques incendies)

Zone humide de Macinaggio juste derrière la plage au départ du sentier

- *Sentier des douaniers au départ de Macinaggio : superbe (maquis bas et criques sauvages), passe devant les îles de Finochiarola (réserve naturelle), où nichent habituellement 90 couples de goéland d'Audouin (seulement 15 en 2000 avec 3 succès –trop de goelands leucophées-) et cormoran huppé (facile à voir à la longue vue)*

Pipit rousseline, pie-grièche écorcheur, bruant zizi (commun), fauvette mélando et pitchou, hibou petit-duc, crapaud vert, discoglosse sp.

- *Dans la plaine cultivée derrière Macinaggio : huppe, geai (abondant), fauvettes, bruant zizi*

Sur la côte :

alouette calandrelle, faucon pèlerin, pipit rousseline, fauvettes mélanocéphale, passerinette et sarde, venturon corse

B) St Florent

- *Accès vers le sentier littoral menant dans le désert des Agriates, superbes petites plages (anse de Fornali) et maquis intéressants (huppe, bruant zizi, lézard tiliguerta et sicilien, couleuvre verte et jaune, gobe-mouche gris, venturon corse, fauvette mélanocéphale, goéland leucophée et d'Audouin)*

- *Camping Kalliste (3 étoiles) :*

hibou petit-duc, engoulvent (au crépuscule, se perche sur les fils électriques du terrain vague entre le camping et la plage), pie-grièche à tête rousse, moineaux soulcie et cisalpin, gobe-mouche gris, merle noir, verdier, chardonneret, milan royal, crapaud vert (assez nombreux près des blocs sanitaires et dans les conduits d'évacuation d'eau), grenouille verte, discoglosse (sarde ?), rainette sarde (chercher sur les murs extérieurs des blocs sanitaires ; le soir), hémidactyle verruqueux, lézard tiliguerta et 1 mâle de lézard sicilien

- *Désert des Agriates : maquis impénétrable, accès vers les plages paradisiaques de Saleccio sur route carrossable en mauvais état (très beau maquis bas, vaut le déplacement ; milan royal omniprésent, épervier, faucon crècerelle, fauvette mélanocéphale, bruant zizi, pie-grièche à tête rousse)*

- *village de St Florent : soirs doux : geckos de Mauritanie et 2 hémidactyles verruqueux*

C) Corte

- De Corte, aller dans la vallée de la Restonica, tôt le matin (sinon plus de place pour se garer), aller à la bergerie et monter vers le lac de Melo (1h30 de marche) ou vers le lac Capitello (30 min supplémentaire). Attention, accès dans le fond la vallée interdit aux voitures après 14h30.

Accenteur alpin très peu farouche, chocard à bec jaune (ramener du pain pour les attirer, viennent manger dans la main avec de la patience → nombreux ind bagués couleur)

Venturons dans la montée, lézard de Bedriaga très commun entre Melo et Capitello

- 19 km au nord de Corté, proximité de la forêt de Pinetu, gisement de gabbro en très bon état (site B6 p63 du guide Delachaux) autour du pont sur la Casaluna (sur la CD 39, à 3 km env de la RN193) *chercher après le pont (couleuvre verte et jaune mangeant un lézard tiliguerta adulte mâle)*

- vallée d'Asco :

Haut Asco : 700 m de dénivelé vers le Monté Muffelato (2h de montée) :

Trop de monde pour l'obs (GR 20 oblige ! !) ; pas de mouflons, ni aigle, ni gypaète en vue, seulement des chocards à bec jaune (nombreux), grands corbeaux, venturons, troglodytes, rouge gorge, hirondelles de rochers ; dans la montée sitelle corse en compagnie de mesanges noires, roitelets ; assez nombreux lézards de bedriaga et bien sur tiliguerta

D) Etang du Biguglia (sud de Bastia)

- *faucons kobez en migration (jusque 100, mi-mai ; chercher sur les fils électriques)*

renseignements réserve avant 16h, points d'observations très mal indiqués, route à proximité → obs peu agréable)

aigrettes garzettes, limis, guepiers

- *étang de Chiurlinu : observatoire de Tombulu Biancu*

Corse du sud (2A)

A) Bonifaccio

- Bouches de Bonifaccio : migration rapaces
- *port de Bonifaccio* : moineaux cisalpins nombreux, et qq. moineaux espagnols réguliers vers le port notamment (info LPO)
- *le long des falaises* : martinets alpins et pâles : se placer en haut des falaises et regarder les martinets passer en contrebas pour pouvoir deviner les critères distinctifs du martinet pâle
- dans Bonifaccio : fauvelles sarde et passerinette
- dans le maquis, sur les plateaux est : bruant zizi, fauvelles mélando, pitchou, sarde et venturon corse, lézard sicilien assez commun
- en mer : puffins cendrés et cormorans huppés
- en ville : étourneau unicolore
- plage superbe du Petit Speron (sable le plus fin de Corse)

B) Iles de Lavezzi

- prendre le bateau le plus tôt possible le matin pour aller sur les îles Lavezzi, retour en visitant les grottes et falaises calcaires, prendre le billet un jour à l'avance pour négocier le prix (de 120 F → 60-70 F par personne en 1999) → en cherchant, puffins en mer
- Sur l'île : très nombreux lézards de Tiliguerta, fauvelles mélanocéphale et sarde, gobe-mouche gris, goéland d'Audouin, grand cormorant et cormorant huppé (longue vue conseillée car les cormorans sont loin), grand corbeau, merle bleu, mante religieuse, très beaux fonds marins avec herbiers à posidonies
- Parasol vivement conseillé (aucun arbre sur l'île)

C) Bergeries de Bitalza

- 700m de dénivelé, 2h30 aller (parcours cf guide IGN)
- belle promenade (montée constante) à travers un très beau maquis haut
- au niveau des bergeries : fauvelles sardes très communes et peu farouche (souvent posées sur les rochers), bruants zizis, gobe-mouche gris, grand corbeau, venturon corse

D) Col et aiguilles de Bavella (N-O de Sartène, entre Levie et Solenzara), 1h20 de Porto-Vecchio

- au col (1243m) hibou petit-duc, sittelle corse
- Aiguilles : mouflon corse, aigle royal, gypaète barbu et accenteur alpin
- A partir du col de Bavella, prendre la variante (à l'est du GR 20, 2 traits jaunes) en se dirigeant vers les aiguilles de Bavella, monter puis redescendre par le même chemin : très nombreux venturons corses entre le parking et le début de la montée, bruant zizi, becs-croisés des sapins, gobe-mouches gris, chocards, merles bleus

E) Ajaccio

- Golfe d' Ajaccio (Capitellu) : B pour migration limis
- étang Capitello, à l'ouest : migration, blongios nicheur, cormorans huppés, sarcelles d'été, goéland d'Audouin, guifette leucoptère (?), fauvelles mélanocéphale, alouette calandrelle, corneille mantelée, moineaux cisalpins et friquets dans les hameaux

F) Fango, Scandola, Galéria

- généralités :
- 50-270 couples de cormorans huppés
- 13 couples de balbuzards
- 10-15 couples de faucons pèlerins
- fauvette sarde
- vallée du Fango (Galéria et Manso) : intéressant !
- embouchure (réserve sympa : venturon, scarabé sacré, algyroïde de Fitzinger): engoulevants, balbuzard pêcheur, hibou petit-duc, venturon corse
- remonter la vallée : forêt de Pirio (UNESCO) une des plus belles forêts de chênes verts (décevant car pas de chemin de balade dans la forêt)
- affluent du Fango, 190 m, biotope excellent à discoglosse sarde, euprocte corse et discoglosse corse (décrit là-bas pour la première fois vers 1981 ?)
- Gîte d'étape de Tuarelli : à côté des piscines naturelles du Fango, baignade très sympa
- rainettes sardes peu nombreuses, gecko de Mauritanie signalé mais pas trouvé

G) Porto, col de Verghio et forêts d'Aitone

- à partir d'Evisa, prendre le sentier des «condamnés» puis chercher la sittelle corse le long de la futaie de pins laricio (le chemin mène au cœur de la forêt et revient au parking)
- à partir d'Evisa, se rendre vers Niolo par le col de Verghio (traverser la forêt d'Aitone) : sittelle corse bien représentée vers le Paesolu, discoglosse sarde à 1300 m en forêt d'Aitone
- après Evisa, aller se baigner dans les piscines naturelles d'Aitone
nombreuses larves de discoglosses, lézards de Tiliguerta et de Bedriaga
- partir de Porto vers le village de A Soccia (50 km, 1h30), monter au parking au-dessus du village : 1h30 de marche pour voir le superbe lac Creno
- prendre le bateau vers la réserve de Scandola, avec arrêt au golfe de Girolata (200 F par personne, la réserve est inaccessible et soit disant interdite d'accès)
- calanques de Piana : faire un coucher de soleil, les granites roses et rouges (d'âge cadomien) prennent encore plus de couleurs ; à faire absolument !
- aller en voiture vers le col de Verghio, rejoindre le GR20 et marcher vers le lac de Nino : à faire absolument superbes pozzines
variante : aller plus loin jusque la maison forestière de Popaja puis monter vers le lac Nino (chemin bien balisé par les traits jaunes et les kerns) : venturon corse facile à voir, présence de la sittelle corse, nombreux lézards de Bedriaga, pozzine superbe avec chevaux « sauvages », grands corbeaux, traquets moiteux ... paraît-il plein d'Euproctes corse dans le ruisseau (pas en juillet août !) ; 600 m de dénivelé, 2h30 aller, 2h retour, source d'eau potable au lac
- qq km avant le col de Verghio, départ du parking Peasolu d'Aitone : prendre au début le « chemin de la sittelle » et le quitter rapidement en direction du col de Salto (bocca di Saltu) : superbes forêts de Pins laricios (dont pas mal de pins morts) et pas mal de sittelles corses (avant et après le col) ; venturons, lézards de Bedriaga ; poursuivre vers le col de Cuccavera : aigle royal 3 imm localisés dans les pics rocheux au sud ouest du col

H) Porto Vecchio

- en ville : hémidactyle verruqueux dans le village (rue qui monte vers la vieille ville), étourneau unicolore (dortoir)
- plage de Rondinaria (parking 10F) : superbe cadre, TB pour plongée avec masque
- plage du golfe de Pinarellu : cadre moyen, assez nombreux lis de mer
- plage de Palombaggia : bien sur les bords pour la plongée, bordée de Pins parasols
- forêt de l'Ospedale : après le village de l'Ospedale, la route longe un ruisseau puis s'en écarte ; à ce niveau prendre le chemin forestier sur la gauche (accessible en voiture) afin de retrouver le ruisseau (pont) – si on rate le chemin forestier, on arrive à une bifurcation de 2 routes goudronnées à moins d'1 km) : fin juillet, nombreux juv rainettes sardes, discoglosses + 2 juv crapauds verts ; grenouille verte sp (esculenta ? ?)

Remarques :

Pour le Discoglosse et l'Euprocte: La forêt de l'Ospedale, corse du Sud.

Pour la sittelle: Forêt d'Aitone (au dessus de Porto), remonter vers les crêtes (par exemple col de Saltu),

Forêt d'Ascu (au dessus de Ponte Leccia) de belles ballades et avifaune toujours présente (gypaete, aigle...),

Vallée du Tavignano: au-dessus de Corte, soit remonter le ruisseau, soit monter en direction des forêts (rive gauche, départ au dos de la citadelle):

ballade de l'arche de Corte (mais difficile sans carte et indications précises)

Comme belle ballade dans le coin: traversée Restonica - Tavignano par le plateau d'Alzu; départ donc côté Restonica. Descente le long du Tavignano à faire assez car chaud. Possibilité de baignade dans le Tavignano (splendides vasques à débusquer...)

Du côté d'Ajaccio, petite zone humide près de l'aéroport (Capitello), mais on y accède plus par le Sud de la baie.