

# Voyage ornithologique en Indonésie du 26.07 au 1.09.2013

Les observations se sont déroulées à :

Bali : Gimbaran, presqu'île

Bali : région de Permuteran, parc national Bali Barat

Bali : région d'Amed, forêt humide sur les flancs du volcan

Bali : région d'Ubud : rizières et forêts galerie au nord de la ville

Lombok : Massif du Rinjani

Lombok : Gili Gede

Lombok : région de Kuta

	BG	BP	BA	BU	LR	LGG	LK
	Gimbaran	Permuteran	Amed	Ubud	Rinjani	Gili Gede	Kuta

Liste systématique :

*Phaethon lepturus* White-tailed Tropicbird Phaethon à queue blanche  
9 ind. obs. à LK

*Fregata sp.* Frigatebird Frégate sp.  
1 ind. entre Lombok et Bali

*Ardeola speciosa* Javan Pond-Heron  
En petit nombre dans les endroits favorables à Bali et Lombok

*Butorides striatus* Green heron

*Bulbulcus ibis* Cattle egret Héron garde-boeufs  
Uniquement observé à Ubud autour du dortoir de Petulu

*Ixobrychus cinnamomeus* Cinnamon Bittern  
Observé en vol uniquement dans les rizières à Bali

*Egretta alba* Great egret Grande aigrette  
Kuta Lombok : qq ind. dans des marais littoraux

*Egretta sacra* Pacific Reef-Egret Aigrette du pacifique  
Bali et Lombok : quelques ind. dans les rizières et les marais littoraux

*Ardea cinerea* Grey heron Héron cendré  
1 ind. à G.G.

<i>Ardea purpurea</i> 4 ind. à G.G.	Purple heron	Héron pourpré
<i>Haliastur indus</i> Ind. isolés observé à Bali et Lombok	Brahminy Kite	
<i>Ictinaetus malayensis</i> 1 ind. obs. à BP, posé et en vol.	Black eagle	
<i>Falco peregrinus</i> 1 ind. très sombre ssp "ernesti"? en vol à LK	Peregrine Falco	Faucon pèlerin
<i>Spotted Kestrel</i> 4 ind. obs. dans le massif du LR	Falco moluccensis	
<i>Gallus varius</i> Plusieurs f. et m. obs. à LP dans le PN	Green Junglefowl	
<i>Amaurornis phoenicurus</i> Bali : Obs. dans les endroits favorables.	White-breasted Waterhen	
<i>Gallinula chloropus</i> 1 ind.	Common Moorhen	
<i>Pluvialis squatarola</i> LGG : 2 ind.	Grey Plover	
<i>Charadrius ruficapillus</i> LK : au moins 2 m. en pl. nuptial	Red-capped Plover	
<i>Charadrius peronii</i> LK : incertain...	Malaysian Plover ?	
<i>Charadrius javanicus</i> LK : incertain...	Javan Plover ?	
<i>Charadrius mongolus</i> LGG et LK : au moins 2 ind. à chaque site	Mongolian Plover	Pluvier mongol
<i>Charadrius Leschenaultii</i> LGG et LK : nombreux...	Great Sand-Plover	Pluvier de Leschenault
<i>Numenius arquata ou madagascariensis?</i> LGG : au moins 4 ind.		Eurasian ou eastern Curlew?
<i>Numenius phaeopus</i> LK : 12 ind. dans un marais littoral	Whimbrel	Courlis corlieu
<i>Tringa brevipes</i> LGG : au moins 10 ind. obs. très rapprochées	Grey-tailed Tattler	Chevalier de Sibérie

<i>Arenia interpres</i> LGG : 2 ind. en plu. nuptial	Ruddy Turnstone	Tournepieuvre à collier
<i>Tringa hypoleucos</i> BP, LGG et LK. jusqu'à 4 ind. ensemble	Common sandpiper	Chevalier guignette
<i>Tringa totanus</i> LGG : 1 ind.	Redshank	Chevalier gambette
<i>Sterna bergii</i> BP, LGG et LK : qq. ind. en mer	Great Crested-tern	Sterne huppée
<i>Sterna bengalensis</i> LGG : qq. ind. en mer	Lesser Crested-tern	Sterne voyageuse
<i>Sterna albifrons</i> LGG : 4 ind. probablement nicheur	Little Tern	Sterne naine
<i>Treron vernans</i> BP et LGG : un petit groupe de m. et de f. mangent des baies dans les arbres. Ils sont très difficile à découvrir une fois posés.	Pink-necked Green-Pigeon	
<i>Macropygia emiliana</i> BP et BA : quelques ind. se nourrissant au sol	Ruddy Cuckoo-Dove	
<i>Geopelia striata</i> Très commune, souvent tenue en cage à Bali	Zebra dove	
<i>Chalcophaps indica</i> BU : 1 m. au jardin botanique	Emerald Dove	
<i>Phaenicophaeus curvirostris</i> BU : 1 ind. au jardin botanique	Chestnut-breasted Malkoha	
<i>Centropus bengalensis</i> LP, LA : 1 ind.	Lesser Coucal	
<i>Caprimulgus affinis</i> LGG : 2 ind. obs. en journée	Savanna Nightjar	
<i>Collocalia fuciphaga</i> Très courant, très semblable à l'espèce suivante mais il existe des différences entre les ind. taille, coloration...	Edible-nest Swiftlet	
<i>Collocalia maxima</i> Cf. au dessus	Black-nest Swiftlet	
<i>Collocalia esculenta</i> Très commun partout...	Glossy Swiftlet	
<i>Apus Pacificus</i> BP : 1 ind. parmi un grand rassemblement de martinet	Fork-tailed Swift	Martinet du Pacifique

Apus affinis BP, LK : pl. ind. obs.	Little Swift	Martinet des maisons
Cypsiurus balasiensis LR : qq. ind à Senaru à un seul endroit	Asian Palm-Swift	Martinet des palmiers
Hemiprocne longipennis LR : 1 ind. à Senaru.	Grey-rumped Treeswift	
Alcedo coerulescens LGG : 2 ind. en bord de mer dans la mangrove	Small Blue Kingfisher	
Halcyon cyanoventris LU : 1 ind. dans la forêt galerie.	Javan Kingfisher	
Todirhamphus chloris Vu partout à Bali et Lombok, jusqu'à 4 ind ensemble.	Collared Kingfisher	
Todirhamphus sanctus LGG : 2 ind. dans le marais littoral	Sacred Kingfisher	
Merops leschenaulti LP : pl. ind. PN de Bali Barat	Chestnut-headed Bee-Eater	
Merops philippinus BG : 1 ind.	Blue-tailed Bee-Eater	
Merops ornatus LK : 2 ind.	Rainbow Bee-Eater	
Megalaima lineata BA : 1 ind. dans la montagne sur le volcan	Lineated Barbet	
Picoides moluccensis BP : 1 ind. PN Bali BARAT et 1 ind BA dans la montagne	Sunda Woodpecker	
Hirundo tahitica Présente partout en petit nombre à Bali et Lombok	Pacific swallow	Hirondelle du Pacifique
Hirundo daurica BP : plusieurs ind. BU : plusieurs ind. à Ubud en ville	Red-rumped swallow	Hirondelle rousseline
Lalage sueurri BP : quelques ind. Lombok : commune sur la côte sud	White-shouldered Triller	
Pericrocotus flammeus BG, BP et LK	Scarlet minivet	
Aegithina tiphia BG, LK	Common lora	

<i>Pycnonotus aurigaster</i> Commun à Bali et Lombok	Sooty-headed bulbul	
<i>Pycnonotus goiaver</i> Très commun, souvent tenu en captivité à Bali	Yellow-vented bulbul	
<i>Dicrurus macrocercus</i> BP : 2 ind.	Black drongo	
<i>Oriolus chinensis</i> BG : 1 ind.	Black-naped oriole	
<i>Parus major</i> LR : commune (Grise et noire)	Great tit	Mésange Charbonnière
<i>Pomatorhinus montanus</i> LR : 2 à 3 ind. dans la forêt, massif du Rinjani.	Chestnut-backed scimitar babbler	
<i>Cinclidium diana</i> LR : 1 mâle dans la forêt, massif de Rinjani	Sunda blue robin	
<i>Saxicola caprata</i> LR : au moins 2 couples au alentour du lac	Pied bushchat	
<i>Phylloscopus trivirgatus</i> LR : 2 ind. dont un chanteur dans la forêt, massif du Rinjani	Mountain leaf-warbler	
<i>Acrocephalus orientalis</i> LK : 1 ind. explore les racines du palétuvier. Très bien obs. Taille de arundinaceus, bec bicolore, relativement court et fort. Sourcil clair dépassant peu l'oeil. Trait oculaire brun très marqué. Gorge blanche flancs et sous-caudales châtain, ventre châtain très clair. Pattes grises, courte projection primaire, les secondaires sont plus foncées que le dessus de l'aile...	Oriental reed-warbler	Rousserolle Orientale
<i>Cisticola juncidis</i> BU et LK : des oiseaux dans les cultures	Fan-tailed warbler	Cisticole des joncs
<i>Megalurus palustris</i> B : 1 ind. au bord du lac dans la végétation.	Striated grassbird	
<i>Orthotomus ruficeps</i> BP, LR, LK : 1 ind	Ashy tailorbird	
<i>Ficedula westermanni</i> LR : 1 mâle dans la forêt, massif de Rinjani	Little pied flycatcher	
<i>Culicicapa ceylonensis</i> BA : Plusieurs à un endroit dans la forêt sur les pentes du volcan	Grey headed flycatcher	
<i>Rhipidura perlata</i> <i>Artamus leucorhynchus</i>	Spotted Fantail White-breasted wood swallow	

<i>Lanius schach</i> Vu à Bali et Lombok dans tous types de milieux ouverts	Long-tailed shrike	Pie-grièche à longue queue
<i>Anthus novaeseelandiae</i> LR et LK : vu plusieurs ind. sur les pentes herbeuses du volcans et en bord de mer.	Richard's pipit	Pipit de Richard
<i>Aplonis minor</i>	Short-tailed starling	
<i>Sturnus sinensis</i>	White-shouldered starling	
<i>Sturnus melanopterus</i> LP : qq. oiseaux	Black-winged starling	
<i>Leucopsar rothschildi</i> LP : obs. au centre de reintroduction...	Bali myna	Etourneau de Bali
<i>Nectarinia jugularis</i> Obs. à Bali et Lombok, commun même en ville	Olive-backed sunbird	
<i>Lichmena limbata</i> Commun à Lombok	Indonésian honeyeater	Sucrier d'Indonésie
<i>Dicaeum maugei</i> LR : 1 ind .	Red-chested flowerpecker	
<i>Dicaeum trochileum</i> LK : plusieurs ind. dans la forêt galerie	Scarlet-headed flowerpeckers	
<i>Zosterops montanus</i> LR : commun dans le massif du Rinjani au dessus de la forêt.	Mountain white-eye	
<i>Zosterops palpebrosus</i> Commun en plaine à Bali et Lombok	Oriental white-eye	
<i>Amandava amandava</i> LK : massif du Rinjani au dessus de la limite des arbres	Red avadavat	
<i>Padda oryzivora</i>	Java sparrow	
<i>Lonchura leucogastroides</i> LR : 1 groupe en zone cultivée	Java munia	
<i>Lonchura punctulata</i> Bali et Lombok : commun partout	Scaly-breasted munia	
<i>Passer montanus</i> Bali et Lombok : très commun en ville et en culture	Eurasian tree sparrow	
<i>Taeniopygia guttata</i>	Zebra finch	

Marc PARENT - LYON - 10.2013. maparent@wanadoo.fr