

Liste commentée des oiseaux observés en Islande

Iceland Bird Checklist

Nicolas MACAIRE - LPO

Voyage du 4 au 17 juillet 2004

LEGENDE :

* = 9 coches faites en Islande

** = sous-espèces endémiques d'Islande.

Nom français (Nom anglais)	Nom latin	Sous- espèce	Commentaire / Site d'observation
Plongeon catmarin (Red-throated Diver)	<i>Gavia stellata</i>		Noté nicheur à Jokulsarlon.
Plongeon imbrin (Great Northern Diver)	<i>Gavia immer</i>		Couples nicheurs + pulli au Lac Myvatn.
Grèbe esclavon (Slavonian Grebe)	<i>Podiceps auritus</i>		Couples nicheurs au Lac Myvatn.
Fulmar boréal (Fulmar)	<i>Fulmarus glacialis</i>	<i>glacialis</i>	Très commun partout, quasiment omniprésent sur les côtes. Niche sur les falaises, quelquefois assez loin de la mer. (îles Vestmann ; port de Dalvik ...)
Fou de Bassan (Gannet)	<i>Morus bassanus</i>		Rares observations en mer
Grand cormoran (Cormorant)	<i>Phalacrocorax carbo</i>		Peu abondant. Quelquefois présent par groupes de deux ou trois sur la côte
Cormoran huppé (Shag)	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>		Peu abondant. Noté aux îles Vestmann.
Cygne chanteur (Whooper Swan)	<i>Cygnus cygnus</i>		Assez commun.
Oie à bec court (Pink-footed Goose)	<i>Anser brachyrhynchus</i>		Nombreuses familles avant d'arrivé à Akureyri, partie Nord-Est du désert central.
Oie cendrée (Greylag Goose)	<i>Anser anser</i>		Commune.
Canard colvert (Mallard)	<i>Anas platyrhynchos</i>	<i>platyrhynchos</i>	Observé au lac Myvatn.
Canard chipeau (Gadwall)	<i>Anas strepera</i>		Observé au lac Myvatn.
Canard pilet (Pintail)	<i>Anas acuta</i>	<i>acuta</i>	Observé au lac Myvatn.
Canard souchet (Shoveler)	<i>Anas clypeata</i>		Observé au lac Myvatn.
Canard siffleur (Wigeon)	<i>Anas penelope</i>		Observé au lac Myvatn.
Sarcelle d'hiver (Teal)	<i>Anas crecca</i>	<i>crecca</i>	Observée au lac Myvatn.

Fuligule milouinan (Scaup)	<i>Aythya marila</i>	<i>marila</i>	Observé au lac Myvatn.
Fuligule morillon (Tufted Duck)	<i>Aythya fuligula</i>		Observé au lac Myvatn.
Eider à duvet (Common Eider)	<i>Somateria mollissima</i>	<i>borealis</i>	Assez commun sur le littoral durant notre séjour. Les mâles forment des grands groupes pour muer (plumage d'éclipse).
Harelde boréale (Long-tailed Duck)	<i>Clangula hyemalis</i>		Peu abondante. Noté au Lac Myvatn et en mer en allant aux Iles Vestmann.
Arlequin plongeur * (Harlequin Duck)	<i>Histrionicus histrionicus</i>		Groupe d'une cinquantaine d'individus le 11/07 à Hagasnvik près de Siglufjörður.
Garrot d'Islande * (Barrow's Goldeneye)	<i>Bucephala islandica</i>		Mâles assez nombreux sur la rivière Laxà (Lac Myvatn).
Harle huppé (Red-breasted Merganser)	<i>Mergus serrator</i>		1 observation au Lac Myvatn, peu abondant.
Pygargue à queue blanche (White-tailed Eagle)	<i>Haliaeetus albicilla</i>		1 adulte + 1 jeune au nid vers Låtrabjarg.
Faucon gerfaut * (Gyrfalcon)	<i>Falco rusticolus</i>	<i>islandus**</i>	3 individus observés de la forme claire issue du Groenland (lors de la réintroduction, les individus clairs furent privilégiés). Solfatares de Namaskard.
Faucon émerillon (Merlin)	<i>Falco columbarius</i>		1 mâle chassant 1 faucon gerfaut dans les Fjords de l'Ouest.
Lagopède alpin * (Ptarmigan)	<i>Lagopus mutus</i>	<i>islandorum**</i>	Assez commun.
Huitrier pie (Oystercatcher)	<i>Haematopus ostralegus</i>		Assez commun partout. Nicheur côtier presque omniprésent, surtout sur les îles !
Grand gravelot (Ringed Plover)	<i>Charadrius hiaticula</i>	<i>hiaticula</i>	Assez commun. Adultes et jeunes.
Tournepière à collier (Turnstone)	<i>Arenaria interpres</i>		D'observation rare pendant notre séjour (1 seul individu numtial sur l'île de Flatey) ; ne niche pas en Islande mais y fait uniquement escale pour le Groenland.
Pluvier doré (Golden Plover)	<i>Pluvialis apricaria</i>		Nicheur commun dans la toundra.
Bécasseau violet (Purple Sandpiper)	<i>Calidris maritima</i>		Peu abondant. Noté en petits groupes par exemple dans la colonie de phoque Veau-marin <i>Phocina phocina</i> .
Bécasseau maubèche (Knot)	<i>Calidris canutus</i>		Noté sur l'île de Flatey.
Bécasseau variable (Dunlin)	<i>Calidris alpina</i>		Commun.
Chevalier gambette (Common Redshank)	<i>Tringa totanus</i>	<i>robusta**</i>	Très commun partout.
Barge à queue noire (Black-tailed Godwit)	<i>Limosa limosa</i>	<i>islandica**</i>	Assez commune.
Courlis corlieu (Whimbrel)	<i>Numenius phaeopus</i>	<i>phaeopus</i>	Commun dans les marais côtiers.

Bécassine des marais (Common Snipe)	<i>Gallinago gallinago</i>	<i>faeroensis**</i>	Commune partout.
Phalarope à bec étroit * (Red-necked Phalarope)	<i>Phalaropus lobatus</i>		Noté au Lac Myvatn et sur les îles du Breidafjördur.
Grand labbe (Great Skua)	<i>Stercorarius skua</i>	<i>skua</i>	Noté notamment au Glacier Jokulsarlon sur la rivière Jokula.
Labbe parasite (Arctic Skua)	<i>Stercorarius parasiticus</i>		Formes claires et foncées notées à Latrabjard (assez commun sur ce site) et Glacier Jokulsarlon.
Mouette rieuse (Black-headed Gull)	<i>Larus ridibundus</i>		Très peu notée. Quelques adultes de part et d'autre.
Goéland cendré (Common Gull)	<i>Larus canus</i>	<i>canus</i>	Un fort passage d'adultes noté aux falaises de Latrabjard le 13/07.
Goéland argenté (Herring Gull)	<i>Larus argentatus</i>	<i>argenteus</i>	Commun.
Goéland bourgmestre (Glaucus Gull)	<i>Larus hyperboreus</i>	<i>hyperboreus</i>	Adultes notés dans les Fjords du Nord-Ouest qui se trouvent à environ 300 km des côtes Groenlandaises.
Goéland brun (Lesser Black-headed Gull)	<i>Larus fuscus</i>	<i>graellsii</i>	Assez commun.
Goéland marin (Great Black-backed Gull)	<i>Larus marinus</i>		Peu abondant.
Mouette tridactyle (Kittiwake)	<i>Rissa tridactyla</i>	<i>tridactyla</i>	Nicheuse sur les falaises. Par exemple aux îles Vestmann et surtout à Latrabjard.
Sterne arctique (Arctic Tern)	<i>Sterna paradisaea</i>		Commune partout, parfois en grandes colonies. (Hunafjörður ; Haganesvik ; Dalvik ; rivière Jokula ...).
Macareux moine * (Puffin)	<i>Fratercula arctica</i>	<i>arctica</i>	Noté essentiellement sur les falaises de Latrabjard mais également aux îles Vestmann.
Guillemot à miroir * (Black Guillemot)	<i>Cepphus grylle</i>	<i>islandicus**</i>	Niche proche de l'eau, parfois sur des récifs rocheux minuscules, se tient dans le bas des falaises. Noté par exemple aux îles Vestmann, et à Flatey.
Guillemot de Troïl (Guillemot)	<i>Uria aalge</i>	<i>aalge</i>	Noté aux îles Vestmann et à sur le site de Latrabjard où ils nichent en grandes colonies.
Guillemot de Brünnich * (Brünnich's Guillemot)	<i>Uria lomvia</i>	<i>lomvia</i>	Uniquement noté sur les grandes falaises de Latrabjard où il se tient à mi-hauteur proche des Gmots de Troïl.
Pingouin torda (Razorbill)	<i>Alca torda</i>	<i>islandica</i>	Noté aux îles Vestmann et sur les falaises de Latrabjard.
Hibou des marais (Short-eared Owl)	<i>Asio flammeus</i>	<i>flammeus</i>	1 famille observée.
Pipit farlouse (Meadow Pipit)	<i>Anthus pratensis</i>	<i>pratensis</i>	Assez commun partout.
Bergeronnette grise (Pied Wagtail)	<i>Motacilla alba</i>	<i>alba</i>	Commune dans les ports et à proximité des habitations.
Troglodyte mignon (Wren)	<i>Troglodytes troglodytes</i>	<i>islandicus**</i>	Rare. Noté une seule fois le 05/07 sur la route n°1 menant vers Vik.
Traquet motteux (Northern Wheatear)	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>leucorhoa</i>	Assez commun.

Grive mauvis (Redwing)	<i>Turdus iliacus</i>	<i>coburni</i> **	Turdidé très commun là bas. Niche au sol dans un endroit abrité.
Roitelet huppé (Goldcrest)	<i>Regulus regulus</i>		Rare. Noté 1 seule fois dans la forêt de bouleaux de l'Est.
Grand corbeau (Raven)	<i>Corvus corax</i>	<i>varius</i> **	Noté de temps à autre (Lac Myvatn). Semble commun dans les grands Fjords du Nord-Ouest.
Etourneau sansonnet (Starling)	<i>Sturnus vulgaris</i>	<i>vulgaris</i>	Noté uniquement à Reykjavik, la capitale où il fut introduit (accidentellement ?) par des bateaux.
Sizerin flammé (Redpoll)	<i>Carduelis flammea</i>	<i>islandica</i> **	Contacté une seule fois dans la forêt de bouleaux de l'Est.
Bruant des neiges * (Snow Bunting)	<i>Plectrophenax nivalis</i>	<i>insulae</i> **	Assez commun. Familles notées aux îles Vestmann et à Flatey par exemple mais également à l'intérieur des terres.
Total = 65 espèces observées			