

Voyage Ornithologique en ISRAËL du 31 octobre au 08 novembre 2009

Compte rendu des observations



Hugues DUFOURNY (texte) (hdufournyornitho@yahoo.fr) & Véronique BUCHET (photos) – BELGIQUE

Itinéraire

31-10-2009 : Vols Bruxelles-Vienne (décollage à 07h20) et Vienne-Tel Aviv avec Austrian Airlines. Arrivée à Tel Aviv dans les 15h00, contrôle et récupération des bagages, change des euros en shekels à la banque et prise en charge du véhicule (Hyundai Getz). Lorsque nous quittons finalement l'aéroport, il est presque 17h30 et il fait presque nuit. Trajet de Tel Aviv à Ein Gedi de 17h25 à 19h25. Nous arrivons juste à temps pour le repas du soir à l'Auberge de Jeunesse. Installation en chambre où, déjà, il fait très chaud !

01-11-2009 : Un Pouillot à grands sourcils nous accueille au lever à l'A.J. ! Après le petit-déjeuner, visite de la très belle réserve naturelle de Nahal David & Nahal Arugot à Ein Gedi une bonne partie de la matinée puis petit coup d'œil à la Mer Morte avant de prendre la route pour notre but final : la vallée de l'Arava, extrémité nord de la faille du Rift africain ! Nous atteignons le kibboutz de Qetura lorsqu'il fait déjà nuit mais celle-ci tombe tôt ici à cette saison (+/- 17h00). Logement à Qetura.

02-11-2009 : Visite matinale (05h45-07h20) des champs circulaires de Yotvata et des environs mais ceux-ci sont secs (comme lu sur internet avant le départ ...). Bassins de Qetura puis retour au kibboutz pour le petit-déjeuner. Ensuite, trajet jusqu'à Eilat et visite des sites de la région : salines du km. 20, plage, canal, bassin des Gangas de Lichtenstein au soir (16h45-17h20). Une Alouette gulgule repérée 5 kilomètres au nord d'Elot est la « sensation forte » du jour. Retour à Qetura pour la nuit.

03-11-2009 : Bassins et acacias de Yotvata au matin, ensuite des sites du côté d'Eilat : Amram's Pillars (site géologique superbe mais sans oiseaux), palmeraie d'Elot et prospection jusqu'à la plage en passant par le canal et le Bird Sanctuary (ringing station). Un Pipit à dos olive apporte une nouvelle émotion à la journée. Au soir, transfert au kibboutz de Lotan pour le reste du séjour. Un refroidissement probablement contracté hier provoque chez moi une toux accompagnée de fièvre !

04-11-2009 : Désert au km. 66 au nord d'Eilat (où j'avais observé le Ganga couronné en avril 2008). Une Pie-grièche méridionale *pallidirostris* y sera la rareté du jour. Ensuite, route vers Mizpe Ramon jusqu'à Ne'ot Smadar que nous prospectons de façon assez approfondie puis divers bassins entre Lotan et la palmeraie de Samar. Toux et fièvre le soir toujours au programme pour moi !

05-11-2009 : Deuxième visite matinale aux champs de Yotvata mais ils sont encore plus pauvres qu'il y a trois jours. Reste de la matinée en région d'Eilat : Wadi Shlomo (très pauvre), wadi « du pont suspendu » (celui-ci a disparu ...), Holland Park et une seconde visite aux Gangas de Lichtenstein. La Fauvette de Chypre était le but de la journée mais elle garde son secret. Quant à moi, situation sanitaire inchangée !

06-11-2009 : Deuxième visite à Ne'ot Smadar puis buissons et acacias au début de la route vers Mizpe Ramon. Yotvata au soir (bassins, acacias, buissons en face de la zone archéologique en bordure de la route 90). Enfin ma santé s'améliore grâce à des antibiotiques ...

07-11-2009 : Retour au km. 66 au petit matin. Après le petit-déjeuner du « shabbat », de nouveaux sites sont prospectés aujourd'hui à la recherche d'espèces encore manquantes, en particulier la Bergeronnette citrine, le Pipit farlousane et la Dromoïque du désert. Manquantes, elles resteront ! Les sites visités sont un wadi au début de la route vers Mizpe Ramon, l'ancienne « pumping station » d'Eilat (site pour les Gangas de Lichtenstein dans les années 1980 et 1990) et les « turf fields » de Samar qui nous apportent la seconde Alouette gulgule du voyage. Au soir, plage et canal d'Eilat et fin des observations au Bird Sanctuary. Deux Pies-grièches méridionales *pallidirostris* et plus de 50 Tariers pâtres *maurus* et *variegatus* rendent finalement la journée peu banale. Retour à Lotan pour une courte nuit ; nous quittons le kibboutz à 23h47.

08-11-2009 : Fin du trajet : arrivée à Tel Aviv vers 03h40. Contrôle, enregistrement des bagages, le tout se fait sereinement et beaucoup plus rapidement que prévu ! Vols Tel Aviv-Vienne (décollage à 06h45) et Vienne-Bruxelles où nous nous posons vers 15h30.

Liste commentée des observations

1. **Perdrix de Hey *Ammoperdix heyi*** : seulement deux observations de cette perdrix le 01-11 à Ein Gedi : 1 femelle juste à côté de l'Auberge de Jeunesse et encore 1 femelle un peu au sud de la réserve naturelle de Nahal David & Nahal Arugot. Les deux oiseaux furent vus de près mais il manqua incontestablement un mâle !
2. **Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*** : 4 ex. aux salines du km. 20 le 02-11.
3. **Canard siffleur *Anas penelope*** : vu seulement au bassin des Gangas de Lichtenstein (abrégié bassin GdL dans le reste du rapport).
4. **Canard souchet *Anas clypeata*** : vu seulement au bassin GdL où il était nombreux.
5. **Canard pilet *Anas acuta*** : des dizaines au bassin GdL. Ailleurs, 10 ex. le 03-11 et 11 ex. le 06-11 aux bassins de Yotvata.

6. **Sarcelle d'été *Anas querquedula*** : 1 ex. le 04-11 aux bassins de Samar et 1 ex. le 06-11 au bassin de Yotvata.
7. **Sarcelle d'hiver *Anas crecca*** : notée au bassin GdL, aux bassins de Yotvata (7 ex. les 03 et 06-11) et aux salines à côté du Bird Sanctuary (1 ex. le 07-11).
8. **Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*** : 1 ex. au bassin GdL le 02-11, 3 ex. le 03-11 et 4 ex. le 06-11 aux bassins de Yotvata, 3 ex. le 03-11 et 6 ex. le 07-11 au Bird Sanctuary, soit un total d'au moins 11 ex.
9. **Flamant rose *Phoenicopterus ruber*** : uniquement aux salines du km. 20 où quelques centaines d'oiseaux (non dénombrés) étaient présents le 02-11.
10. **Cigogne noire *Ciconia nigra*** : 2 isolées peut-être prêtes pour l'hivernage : 1 adulte au bassin GdL les 02 et 05-11 et 1 juvénile aux bassins de Samar les 04 et 06-11, ce dernier peu farouche.
11. **Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*** : deux observations qui concernent peut-être un seul oiseau : 1 ex. au bassin GdL le 02-11 et 1 ex. aux salines à côté du Bird Sanctuary le 07-11.
12. **Spatule blanche *Platalea leucorodia*** : 1 très bel adulte au bassin GdL le 05-11.
13. **Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*** : au moins 6 ex. différents : 4 (1 adulte et 3 juvéniles) au bassin GdL le 02-11 (2 juv. revus le 05-11), 1 immature au canal d'Eilat le 03-11 et 1 juvénile à Ne'ot Smadar le 04-11.
14. **Crabier chevelu *Ardeola ralloides*** : 1-2 ex à chaque passage aux bassins de Qetura, 1 ex. au bassin GdL le 05-11 et 1 ex. au Bird Sanctuary le 07-11.
15. **Héron gardeboeufs *Bubulcus ibis*** : espèce classiquement peu nombreuse en région d'Eilat ; 1 ex. parmi les ânes dans la palmeraie sud le 05-11.

16. **Héron cendré *Ardea cinerea*** : le plus nombreux des ardéidés, avec un maximum de c.75 ex. le 02-11, la plupart au bassin GdL. Leur nombre avait diminué à la seconde visite le 05-11. Il fut observé à peu près partout près des points d'eau mais c'est surtout sur ce site et au long du canal d'Eilat qu'il était nombreux.
17. **Héron pourpré *Ardea purpurea*** : 1 superbe juvénile au canal d'Eilat les 03 et 05-11.
18. **Grande Aigrette *Ardea alba*** : commune seulement au bassin GdL et au canal d'Eilat avec des totaux de 5 à 10 ex. répartis sur ces deux sites du 02 au 05-11.
19. **Aigrette garzette *Egretta garzetta*** : de 5 à 30 ex. par jour, la plupart au bassin GdL et au canal d'Eilat.
20. **Aigrette des récifs *Egretta alularis*** : 4 oiseaux différents du taxon *schistacea* furent observés à Eilat : 1 adulte blanc au « lagon » et 3 juvéniles variablement grisés, dont un au moins à 60% était fidèle à la sortie du canal et à la North Beach toute proche. Les deux autres étaient gris à +/- 40 et 10 %. Ces oiseaux furent vus dans d'excellentes conditions, parfois de très près, et donc aisément comparés aux Aigrettes garzettes.
21. **Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus*** : observation surprenante d'un immature survolant à très basse altitude le bassin GdL au soir du 05-11, avant de s'éloigner vers le nord.
22. **Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*** : uniquement au bassin GdL avec c.35 ex. le 02-11 mais 94 ex. le 05-11.
23. **Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*** : étonnamment peu nombreux ; 1-5 ex. par jour.
24. **Faucon hobereau *Falco subbuteo*** : 1 ex. tardif en vol à l'ancienne « pumping station » d'Eilat le 07-11.
25. **Faucon de Barbarie *Falco pelegrinoides*** : trois observations d'adultes en vol : 1 à Ein Gedi (Nahal David) le 01-11, 1 aux bassins de Qetura (poursuivant sans succès une Tourterelle turque) le 02-11 et 1 vers les montagnes entre Yotvata et Eilat le 05-11.
26. **Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*** : 1 ex. en brève halte au-dessus du lac de Ne'ot Smadar le 04-11.

27. **Milan noir *Milvus migrans*** : 1 ex. en vol cerclé au-dessus des bassins de Samar le 04-11.
28. **Busard des roseaux *Circus aeruginosus*** : seulement trois isolés : 1 femelle aux bassins de Yotvata le 03-11, 1 femelle 5 km. Au nord d'Elot le 05-11 et 1 juvénile à Eilat non loin du Bird Sanctuary le 07-11.
29. **Epervier d'Europe *Accipiter nisus*** : 2-5 ex. par jour la plupart des jours. Pas noté les 01 et 05-11.
30. **Buse variable *Buteo buteo*** : la sous-espèce « des steppes » *vulpinus* ne totalise que 7 ex. dont 3 encore en migration active aux Samar « turf fields » le 07-11. D'autres furent vues posées de près p. ex. à Ne'ot Smadar le 04-11 et aux bassins de Yotvata le 06-11.
31. **Buse féroce *Buteo rufinus*** : 4 adultes : 1 sombre entre Qetura et Yotvata le 05-11, 1 clair à Yotvata le 06-11 et 2 en migration active aux Samar « turf fields » le 07-11. Toujours assez distants, ces oiseaux ne laisseront pas un souvenir impérissable ...
32. **Aigle criard *Aquila clanga*** : 1 adulte en vol cerclé déjà assez haut aux bassins de Qetura le 02-11 fut le seul du voyage.
33. **Aigle des steppes *Aquila nipalensis*** : trois isolés en vol : 1 adulte au km. 66 au nord d'Eilat le 04-11, 1 juvénile à Eilat (wadi anciennement appelé « du pont suspendu ») le 05-11 et 1 adulte un peu au sud de Yotvata le 07-11. Ce dernier individu était peut-être l'aigle indéterminé vu deux fois au crépuscule posé sur un pylône au sud de Yotvata les 03 et 07-11.
34. **Aigle impérial *Aquila heliaca*** : 1 immature dont l'âge pouvait être estimé à cinq ans fut observé à trois reprises dans le secteur de Yotvata : d'abord en vol à la réserve de gazelles puis posé sur un pylône le 04-11, et revu de l'autre côté de la route le 06-11 lorsqu'il décolla au sol non loin des bassins à notre grande surprise ! Sans doute s'agit-il d'un hivernant.
35. **Aigle de Bonelli *Aquila fasciata*** : 1 beau juvénile assez longuement vu en vol au km. 66 au nord d'Eilat le 04-11.
36. **Aigle botté *Aquila pennata*** : belle observation d'un individu clair à la réserve naturelle d'Ein Gedi (Nahal David & Nahal Arugot) le 01-11, fréquemment houspillé par les Corbeaux à queue courte parfois accompagnés d'un couple de Corbeaux bruns. Les 02 et 03-11, 2 isolés sombres traînaient au-dessus du kibboutz de Qetura et des palmeraies et bassins de l'autre côté de la route.
37. **Râle d'eau *Rallus aquaticus*** : 2 adultes aux bassins de Yotvata le 06-11 et 1 adulte au Bird Sanctuary le 07-11.

38. **Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*** : 1 juvénile les 03 et 06-11 aux bassins de Yotvata et 2 ex. au lac de Ne'ot Smadar le 04-11.
39. **Foulque macroule *Fulica atra*** : deux isolées : 1 aux bassins de Yotvata les 03 et 06-11 et 1 au Bird Sanctuary les 03 et 07-11.
40. **Oedicnème criard *Burhinus oedicnelus*** : des cris d'un individu furent entendus au soir les 06 et 07-11 à Lotan.
41. **Echasse blanche *himantopus himantopus*** : présente en petit nombre dans la plupart des bassins visités mais par dizaines aux salines du km. 20.
42. **Vanneau huppé *Vanellus vanellus*** : trois observations d'isolés qui peuvent concerner un seul et même individu : 1 ex. au bassin GdL le 02-11, 1 ex. aux bassins de Samar le 04-11, 1 ex. aux bassins de Qetura le 06-11.
43. **Vanneau éperonné *Vanellus spinosus*** : un des oiseaux les plus visibles de la région, observé quotidiennement souvent de très près. Le maximum en un jour fut de c.70 ex. le 02-11 dont un groupe de 37 ex. au bassin GdL. Ce même jour, aussi c.20 ex. aux bassins de Qetura. Présent et très peu farouche dans les kibboutz de Qetura (max. un groupe de 9 ex. le 02-11) et de Lotan. Absent à Ein Gedi le 01-11.
44. **Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*** : 1-2 ex. sur certains bassins mais plusieurs dizaines aux salines du km. 20 le 02-11.
45. **Petit Gravelot *Charadrius dubius*** : une seule observation de 3 migrateurs en brève halte aux bassins de Qetura le 04-11.
46. **Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*** : une dizaine d'oiseaux aux salines du km. 20 le 02-11.
47. **Gravelot de Leschenault *Charadrius leschenaultii*** : 1 ex. aux salines du km. 20 le 02-11 put être comparé directement au Grand Gravelot et au Gravelot à collier interrompu. La différence de taille était particulièrement frappante.
48. **Bécassine des marais *Gallinago gallinago*** : observée sur deux zones de bassins : 2 ex. le 04-11 et 1 ex. le 06-11 à Qetura et 2 ex. le 04-11 à Samar.

49. **Chevalier arlequin *Tringa erythropus*** : vu en petit nombre à quelques endroits : 4-5 ex. aux salines du km. 20 le 02-11, 3 ex. le 03-11 et 1 ex. le 06-11 aux bassins de Yotvata, c.10 ex. aux salines à côté du Bird Sanctuary le 07-11.
50. **Chevalier gambette *Tringa totanus*** : des dizaines aux salines du km. 20 le 02-11 mais peu vu ailleurs.
51. **Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis*** : 1 ex. en plumage hivernal complet aux salines à côté du Bird Sanctuary le 03-11.
52. **Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*** : peu vu : 4 ex. aux salines du km. 20 le 02-11, 1 ex. au Bird Sanctuary le 03-11 et 1 ex. aux salines à côté de ce site le 07-11.
53. **Chevalier culblanc *Tringa ochropus*** : outre 4 isolés sur divers bassins, des groupes de 7 et 5 ex. furent notés respectivement le 03-11 aux bassins de Yotvata et à ceux de Ne 'ot Smadar le 04-11.
54. **Chevalier sylvain *Tringa glareola*** : 6 ex. au total : 1 ex. aux bassins de Qetura les 02 et 03-11, 1 ex. au bassin GdL le 02-11 et un groupe de 4 ex. aux bassins de Yotvata le 06-11.
55. **Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*** : 2 ex. le 02-11 et 3 ex. le lendemain.
56. **Bécasseau minute *Calidris minuta*** : un des limicoles les plus communs, présent en petit nombre (1-5 ex.) sur la plupart des bassins mais par dizaines aux salines du km. 20 le 02-11.
57. **Bécasseau variable *Calidris alpina*** : c.20 ex. aux salines du km. 20 le 02-11 mais seulement 1 ex. dans les salines à côté du Bird Sanctuary les 03 et 07-11.
58. **Combattant varié *Philomachus pugnax*** : une dizaine d'individus répartis sur trois sites : 2 ex. aux salines du km. 20 le 02-11, 1 ex. le 03-11 et 6 ex. le 07-11 aux salines à côté du Bird Sanctuary, 1 ex. aux bassins de la palmeraie de Samar le 04-11.
59. **Goéland à iris blanc *Larus leucophthalmus*** : avec le retrait des cages d'aquaculture qui procuraient de très nombreux perchoirs aux oiseaux de mer, l'observation de ce groupe d'espèces à partir de la North Beach d'Eilat s'est grandement appauvrie (comm. or. N.

Weiss). Quelques Goélands à iris blanc étaient cependant encore présents du côté jordanien où il reste des éléments flottants : nous avons vu ici 5 individus le 02-11 et jusqu'à 13 le lendemain, hélas toujours à distance importante.

60. **Goéland brun *Larus fuscus*** : 3 ex. en vol au-dessus du « lagon » d'Eilat le 07-11.
61. **Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus*** : abondante aux salines du km. 20 le 02-11, mais seulement quelques individus ailleurs.
62. **Goéland railleur *Chroicocephalus genei*** : noté mais pas dénombré parmi les Mouettes rieuses aux salines du km. 20 le 02-11.
63. **Sterne caspienne *Hydroprogne caspia*** : cette impressionnante sterne fut observée à deux dates, chaque fois pour un total de 9 ex. : le 02-11, 5 ex. aux salines du km. 20, 3 ex. à la North Beach d'Eilat et 1 ex. au bassin GdL ; le 05-11, 9 ex. au bassin GdL dont 1 ex. en plumage nuptial complet. Il se peut que les oiseaux dispersés du 02 étaient les mêmes rassemblés au bassin GdL le 05-11. L'observation du 05-11 était très esthétique, les sternes évoluant élégamment devant un public diversifié d'anatidés et d'ardéidés.
64. **Guifette moustac *Chlidonias hybrida*** : 1 ex. en plumage d'hiver aux salines du km. 20 le 02-11.
65. **Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*** : 1 juvénile aux salines du km. 20 le 02-11.
66. **Ganga de Lichtenstein *Pterocles lichtensteinii*** : très belles observations d'un couple venu se désaltérer au bassin GdL les 02 et 05-11. Très ponctuels, les oiseaux sont chaque fois arrivés quelques minutes après 17h00 pour ne rester que quelques minutes sur place. Si le mâle s'octroie quelques gorgées d'eau, la femelle ne se contente, elle, que d'une ou deux.
67. **Pigeon biset *Columba livia*** : une colonie d'oiseaux purs niche dans les falaises au début de la route vers Mizpe Ramon. Nous y avons dénombré plus de 130 ex. le 06-11. Ailleurs, abondant mais apparemment toujours des oiseaux domestiques, sauf peut-être un groupe de 8 ex. près du parking de la réserve naturelle d'Ein Gedi le 01-11.
68. **Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*** : 1 juvénile tardif parmi des Tourterelles turques 5 km. Au nord d'Elot le 05-11.

- 69. Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*** : l'abondance de l'espèce a de quoi surprendre l'observateur. C'est littéralement par milliers qu'elle est présente, en particulier dans les secteurs de Yotvata et du bassin GdL. Sans doute y a-t-il pour l'observateur très minutieux l'une ou l'autre Tourterelle rieuse *Streptopelia roseogrisea* à découvrir ...
- 70. Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*** : moins nombreuses que la précédente mais très commune partout quand même.
- 71. Tourterelle masquée *Oena capensis*** : belle observation de 3 ex. (1 femelle et 2 juvéniles) de cette espèce peu commune le 04-11 aux bassins de Ne'ot Smadar, puis encore 1 ex. en vol 5 km. Au nord d'Elot le 05-11.
- 72. Perruche à collier *Psittacula krameri*** : 3 ex. le 03-11 et 1 ex. le 07-11 au Bird Sanctuary.
- 73. Chouette de Butler *Strix butleri*** : l'observation de cette chouette rare était un des objectifs du voyage. Celui-ci fut pleinement atteint sous la guidance de Noam Weiss le soir du 06-11 ! Seul guide autorisé à montrer l'espèce aux visiteurs, Noam nous emmena dans un très beau wadi non loin de Be'er Ora. Un appel (repasse) et immédiatement, un oiseau répond dans le territoire ! Noam localise très vite l'individu, une femelle âgée qu'il connaît bien. Pendant une dizaine de minutes, nous pourrions ainsi nous délecter de cette magnifique chouette très active sur « sa » falaise. Elle chante à quelques reprises et, souvent, se dresse comme si elle avait entendu une proie, s'envole ensuite sur quelques mètres et se repose. Pour ne pas la déranger, nous n'avons pas prolongé exagérément notre présence sur le site, la laissant à la quiétude de son habitat.
- 74. Martin-chasseur de Smyrne *Halcyon smyrnensis*** : 1 ex. dans la palmeraie d'Elot le 03-11 est le seul du voyage.
- 75. Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*** : 1 ex. était fidèle à l'extrémité du canal d'Eilat. Nous l'avons vu ici les 03, 05 et 07-11. Le 05, il s'est aussi aventuré en Mer Rouge.
- 76. Alcyon pie *Ceryle rudis*** : au même titre que les deux précédents membres de la famille, celui-ci n'est représenté que par un seul individu : 1 ex. au bassin GdL le 02-11.
- 77. Guêpier d'Orient *Merops orientalis*** : avec un total compris entre 40 et 50 individus, nous avons fréquemment observé le taxon *cyanophrys* si distinctif ! Souvent présent par groupes de 3-5 ex. (p. ex. à Lotan), il y avait jusqu'à 15 ex. visibles à une distance de trois mètres depuis le véhicule posés sur la clôture du Lot Reservoir (Mer Morte) le 01-11.

- 78. Huppe fasciée *Upupa epops*** : peu nombreuse à cette époque : 2 ex. à Yotvata le 03-11 et 2 ex. à Lotan le 06-11.
- 79. Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*** : 8 individus différents au total observés du 02 au 06-11, tous des femelles et juvéniles à l'exception d'un mâle près des salines du km. 20 le 02-11.
- 80. Pie-grièche à poitrine rose *Lanius minor*** : observation étonnante par sa date très tardive d'un adulte 5 km. Au nord d'Elot le 05-11. Après une longue station fixe, l'oiseau s'envola et nous découvrièmes alors qu'il n'avait pas de queue. Ceci explique sans doute cela ...
- 81. Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis*** : nous avons observé 5 individus de cette espèce. Le côté remarquable des observations est que le nombre de *pallidirostris* dépasse celui des *aucheri* ! En effet, la sous-espèce locale ne fut vue que deux fois (adultes) : 1 ex. à Ein Gedi (kibboutz) le 01-11 et 1 ex. à Ne'ot Smadar (bassins) le 04-11. La sous-espèce migratrice (rare) *pallidirostris* totalise trois oiseaux de premier hiver : 1 ex. au km. 66 au nord d'Eilat le 04-11 et 2 ex. ensemble, très peu farouches, non loin du Bird Sanctuary le 07-11.
- 82. Pie-grièche masquée *Lanius nubicus*** : encore 1 juvénile tardif près des salines du km. 20 le 02-11. Il était posé sur les arceaux métalliques des serres qui jouxtent les plans d'eau.
- 83. Corbeau familial *Corvus splendens*** : cette espèce invasive était très commune aux alentours de la North Beach, du canal et du « lagon » d'Eilat. Un maximum de 220+ ex. y fut dénombré le 03-11.
- 84. Corbeau brun *Corvus ruficollis*** : observé régulièrement dans l'Arava lors des déplacements mais toujours en petit nombre (2-5 ex.). Ailleurs, un beau groupe séjournait à Ne'ot Smadar (32 ex. le 04-11 et c.50 ex. le 06-11), un couple fut noté à Ein Gedi (houspillant un Aigle botté avec des Corbeaux à queue courte) et un autre au sud de la Mer Morte le 01-11. Très belles observations à Ne'ot Smadar.
- 85. Corbeau à queue courte *Corvus rhipidurus*** : LA spécialité d'Ein Gedi ! Ce corbeau à la silhouette cocasse rappelant une chauve-souris est très facile à observer dans la réserve naturelle de Nahal David & Nahal Arugot où des groupes virevoltent acrobatiquement au long des falaises. Ici, nous avons vu jusqu'à 27 et 32 ex. ensemble. Sans doute le total réel d'oiseaux se situe-t-il entre 32 et 59 individus.
- 86. Hirondelle de rivage *Riparia riparia*** : 3-15 ex. les 02, 04 et 05-11.

87. **Hirondelle rustique *Hirundo rustica*** : 10-15 ex. par jour du 02 au 07-11.
88. **Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris*** : c.5 ex. à Ein Gedi le 01-11, les seules du voyage.
89. **Hirondelle isabelline *Ptyonoprogne fuligula*** : c.30 ex. au total. Typiquement présente en très petit nombre (1-3 ex.) un peu partout (surtout près des bassins), à l'exception de c.15 ex. à Ein Gedi le 01-01. Ses parties supérieures grises et sa gorge pâle l'identifient aisément.
90. **Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*** : encore trois isolées : 1 ex. non loin du Bird Sanctuary et 1 ex. au bassin GdL le 06-11, 1 ex. à Ne'ot Smadar (champs) le 07-11.
91. **Alouette monticole *Melanocorypha bimaculata*** : deux observations furtives d'1 ex. en vol (le même ?) à Ne'ot Smadar les 04 et 06-11 auraient pu laisser un goût très frustrant si un troisième individu ne s'était montré beaucoup plus coopératif le 05-11 à Wadi Shlomo. Celui-ci put en effet être longuement observé sur le sol caillouteux dénudé d'une pente qui domine le wadi.
92. **Ammomane isabelline *Ammomanes deserti*** : seulement 3 ex. observés : 1 ex. dans un wadi au sud de la Mer Morte le 01-11, 1 ex. au bord de la route 90 près du km. 66 au nord d'Eilat le 04-11 et 1 ex. près de Ne'ot Smadar le même jour.
93. **Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla*** : 2 ex. dans le désert au km. 66 au nord d'Eilat sont les seules Calandrelles du voyage.
94. **Cochevis huppé *Galerida cristata*** : l'alaudidé le plus commun à cette période mais les maxima quotidiens ne dépassaient quand même pas la vingtaine d'individus.
95. **Alouette des champs *Alauda arvensis*** : 1 ex. entendu le 04-11 et 1 ex. vu (le même ?) le 06-11 à Ne'ot Smadar, 2 ex. au km. 66 au nord d'Eilat le 07-11.
96. **Alouette gulgule *Alauda gulgula*** : but avoué du voyage, l'Alouette gulgule a rempli sa mission ! En l'absence d'observateur local pour repérer le terrain, il faut trouver soi-même son objectif et c'est ce que nous avons fait ! Le 02-11 à 5 km. au nord d'Elot, après notre unique visite des salines du km. 20, une alouette décolle au bord de la route entre des cactus plantés, et se repose aussitôt. Coup de

frein et coup d'œil aux jumelles : une « micro » Alouette des champs, évoquant plus une *Calandrella*, et en plus arborant une zone rousse évidente sur le bord de l'aile. Coup de chance incroyable, c'est bien une Alouette gulgule ... levée par hasard alors que la situation semblait très difficile en raison de la pauvreté du site habituel pour l'espèce, les champs circulaires de Yotvata, totalement secs et dépourvus de vie cet automne ! Passé le « choc » de la découverte, nous avons pu observer longuement l'oiseau qui se nourrissait, pas farouche du tout, parfois à seulement trois mètres depuis la voiture et Véronique put même en prendre un bon cliché ! Malgré d'autres passages ici les jours suivants, cet individu ne fut pas revu mais un second oiseau, plus gris, fut découvert et très bien observé aussi aux « turf fields » dénudés de Samar le 07-11. L'espèce n'est vraiment pas facile à voir dans le Paléarctique Occidental ; la « success story » du voyage m'ôte ainsi une épine du pied !

Description :

- Plus petite et plus fine que l'Alouette des champs, pouvant même évoquer une *Calandrella*.
- Couleur générale différente sur les deux individus observés : plutôt beige près d'Elot et plutôt grise à Samar.
- Huppe plus courte que chez l'Alouette des champs, en fait à peine marquée.
- Stries pectorales plus fines (« traits de crayon ») que chez l'Alouette des champs.
- Zone rousse nette (même à l'œil nu) sur le bord de l'aile fermée sur l'oiseau d'Elot, beaucoup moins nette chez celui de Samar.
- Absence de stries sur les flancs.
- Projection primaire très courte, juste un petit bout sombre dépassant des tertiaires visibles.
- Bec plus fin que celui de l'Alouette des champs.
- Bord de fuite des ailes brun, pas blanc. Ceci est visible seulement en vol.
- Rectrices externes brunes, pas blanches.
- Queue notoirement courte.

97. Prinia gracile *Prinia gracilis* : vue de près à quelques occasions, p. ex. à l'Auberge de Jeunesse d'Ein Gedi, aux bassins de Qetura, au Bird Sanctuary, et bien sûr fréquemment entendue.

98. Bulbul d'Arabie *Pycnonotus xanthopygos* : son abondance généralisée se passe de commentaires.

99. Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : 1 ex. dans les roseaux en face d'un des affûts du Bird Sanctuary le 03-11.

100. **Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus*** : 1 ex. dans les roseaux en face d'un des affûts du Bird Sanctuary le 03-11 et 2 ex. aux bassins de la palmeraie de Samar le 04-11. Un de ces deux oiseaux, vu brièvement, devait appartenir au taxon oriental *fuscus* car il était de teinte grise dessus et blanchâtre dessous. Les deux autres oiseaux étaient de classiques *scirpaceus* rousses.
101. **Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*** : 1 ex. aux bassins de Yotvata le 03-11.
102. **Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*** : un des passereaux les plus communs un peu partout dans les buissons et acacias. Il fut noté tous les jours avec un maximum estimé à 25 ex. le 03-11. Les taxons *abietinus* et *collybita* furent identifiés.
103. **Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*** : une des surprises du voyage ! A notre sortie de la chambre de l'Auberge de Jeunesse d'Ein Gedi au matin du 01-11, j'entends le cri bisyllabique caractéristique d'un Pouillot à grands sourcils ! Et c'en est bien un, évoluant dans un petit bouquet d'arbres et buissons en face de la réception, totalement coincé entre les bâtiments. L'oiseau est observé quelques dizaines de secondes mais il sera fréquemment réentendu tout au long de la matinée.
104. **Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*** : 3-4 ex. à Ein Gedi le 01-11 mais seulement 4 ex. pour toute la période passée entre Lotan et Eilat du 02 au 07-11.
105. **Fauvette babillarde *Sylvia curruca*** : 3 ex. à Ne'ot Smadar et 1 ex. près de Yotvata le 04-11, 4 ex. à Holland Park (Eilat) le 05-11.
106. **Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala*** : la seule fauvette commune, mais comme toujours elle est plus souvent entendue qu'observée. Nos données concernent 2 à 10 individus par jour. Elle est présente partout.
107. **Cratérope écaillé *Turdoides squamiceps*** : espèce toujours attachante par ses comportements et son allure comique. A part 2 ex. à la réserve naturelle de Nahal David et Nahal Arugot à Ein Gedi le 01-11, toutes les observations furent réalisées à Yotvata : 9+3 ex. le 02-11, 1+2+10 ex. le 03-11, 1+6 ex. le 06-11. Bien sûr, certaines observations à des dates différentes peuvent concerner en partie les mêmes oiseaux. A noter qu'il y avait encore du nourrissage de jeunes fraîchement envolés le 06-11. L'espèce est peu farouche et facilement attirée par le « pishing ».
108. **Rufipenne de Tristram *Onychognathus tristramii*** : autre spécialité d'Ein Gedi avec le Corbeau à queue courte, le Rufipenne de Tristram y est remarquablement commun et peu farouche au parking de la réserve naturelle de Nahal David & Nahal Arugot. Ici, plus de

100 ex. furent vus le 01-11 et certains purent être photographiés à 2-3 mètres se désaltérant à quelque tuyauterie. Ailleurs, seulement un groupe de 17 ex. posés sur le centre commercial de Yotvata le 03-11 et une audition en pleine ville d'Eilat le 07-11.

109. **Merle noir *Turdus merula*** : une femelle non loin du parking de la réserve naturelle de Nahal David & Nahal Arugot à Ein Gedi le 01-11, peut-être en dehors de sa répartition normale ?
110. **Rougegorge familier *Erithacus rubecula*** : 1 ex. au Bird Sanctuary le 07-11 était probablement fraîchement arrivé.
111. **Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*** : discrète en Europe dehors de la période de chant, l'espèce ne peut recevoir ce qualificatif ici tant elle est facile à observer un peu partout dans les zones de bassins. Nous avons vu 3-10 ex. par jour du 02 au 07-11 dans des sites tels que Qetura, Ne'ot Smadar, Yotvata ...
112. **Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*** : seulement 3 ex. observés : 1 femelle aux bassins de Ne'ot Smadar le 06-11, 1 mâle au km. 66 au nord d'Eilat et 1 femelle dans un wadi au début de la route vers Mizpe Ramon le 07-11.
113. **Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*** : encore bien présent avec un total supérieur à 20 individus à raison de 2 à 8 ex. par jour, ce maximum étant obtenu le 07-11, jour d'arrivée manifeste de passereaux insectivores. Pas vu à Ein Gedi.
114. **Tarier des prés *Saxicola rubetra*** : deux ou trois isolés : 1 ex. près de Grofit le 02-11 puis 1 ex. les 04 et 06-11 à Ne'ot Smadar.
115. **Tarier pâtre *Saxicola torquatus*** : l'euro péen *torquatus* était évidemment commun partout durant tout le voyage. En ce qui concerne les deux taxons asiatiques *maurus* et *variegatus*, leur nombre était minime jusqu'au 07-11 : 3 ex. les 02 et 04-11, 5 ex. le 06-11 répartis sur les bassins de Qetura et de Ne'ot Smadar, les champs de Grofit, Yotvata et le désert au km. 66 au nord d'Eilat, ces observations totalisant moins de 10 individus. Le 07-11, un important passage se révéla dans le secteur d'Eilat puisque pas moins de **46** ex. furent dénombrés entre la plage et 5 km. au nord d'Elot, dont 13 ex. dans le Bird Sanctuary. La grosse majorité de ces oiseaux étaient du taxon transcaucasien *variegatus*. Ailleurs ce même jour, aussi 4 ex. au km. 66 au nord d'Eilat et 1 ex. entre Yotvata et Eilat. Jamais auparavant il ne m'avait été donné d'assister à un arrivage aussi important de Tariers « orientaux » dans un pays du Paléarctique Occidental !

116. **Traquet isabelle *Oenanthe isabellinus*** : 4 isolés furent vus : 1 ex. au km. 66 au nord d'Eilat et 1 ex. à Ne'ot Smadar le 04-11, 1 ex. aux champs circulaires de Yotvata le 05-11 et 1 ex. dans le secteur de Samar le 07-11. Hivernage réduit, donc, pour ce grand traquet.
117. **Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*** : nous obtenons un total de 15 ex. différents dont un groupe de 6 ex. près de la North Beach d'Eilat le 07-11. Noté les 02, 04, 06 et 07-11.
118. **Traquet oreillard *Oenanthe hispanica*** : deux isolés lors de la journée d'arrivage d'insectivores du 07-11 : 1 ex. au bord de la route 90 entre Yotvata et Eilat et 1 ex. près de la North Beach d'Eilat
119. **Traquet du désert *Oenanthe deserti*** : le second plus fréquent des *Oenanthe* après le Motteux, avec un total compris entre 10 et 13 ex. différents. Les maxima sont de 3 ex. le 04-11 et 6 ex. le 07-11. A ces deux dates, il y avait un mâle et une femelle au km. 66 au nord d'Eilat. Un mâle en plumage nuptial complet, donc superbe, était présent près des « turf fields » de Samar le 07-11.
120. **Traquet deuil *Oenanthe lugens*** : au moins 6 ex. différents dont 5 ex. pour la seule journée du 04-11. L'espèce fut notée çà et là au bord de la route 90 surtout autour de Lotan, à Ne'ot Smadar et au km. 66 au nord d'Eilat, mais à proximité d'Eilat.
121. **Traquet de Finsch *Oenanthe finschii*** : une des dernières espèces ajoutées à la liste du voyage avec cette femelle bien vue dans le secteur de Samar le 07-11.
122. **Traquet à tête blanche *Oenanthe leucopyga*** : 3 ex. à Ein Gedi le 01-11, 2 ex. non loin d'Amram's Pillars le 03-11 et 3 ex. dans la zone de la réserve de gazelles au sud de Yotvata le 04-11. C'est tout !
123. **Traquet à queue noire *Cercomela melanura*** : de loin le plus commun des traquets, si tant est que l'on peut le nommer ainsi sans gêne. Il fut observé tous les jours, souvent par couple, à raison de 2 à 12 ex. par jour (maximum le 04-11) pour un total compris entre 40 et 50 ex.
124. **Souimanga de Palestine *Cinnyris osea*** : c'est à Ein Gedi que ce souimanga était le plus commun (c.15 ex. le 01-11). Dans le sud de l'Arava entre Lotan et Eilat, de 5 à 7 ex. par jour. Terme à l'ombre, le mâle est resplendissant dès qu'il a le bon vouloir de se placer au soleil !

125. **Moineau domestique *Passer domesticus*** : très commun mais moins que l'espèce suivante. Des dizaines par jour.
126. **Moineau espagnol *Passer hispaniolensis*** : un des passereaux les plus communs, souvent vu par groupes compacts de plus de 100 ex., le plus important comptant plus de 200 individus à Yotvata. Des centaines par jour dans le sud de l'Arava mais un seul (mâle) à Ein Gedi le 01-11.
127. **Moineau de la Mer Morte *Passer moabiticus*** : ce ne fut pas sans mal, mais finalement ce joli petit moineau daigna se montrer : un couple et 2 femelles furent bien vus au soir du 05-11 non loin du Bird Sanctuary. Nous ne les avons pas revus le 07.
128. **Capucin bec-de-plomb *Lonchura malabarica*** : à l'exception du 06-11, l'espèce fut notée tous les jours dans le sud de l'Arava. Le total est de 28 ex. : 11 ex. à la palmeraie près du canal d'Eilat le 02-11, 7 ex. à la palmeraie d'Eilat le 03-11, 5 ex. en plein désert au km. 66 au nord d'Eilat le 04-11 (attaqués par la Pie-grièche méridionale *pallidirostris*), 2 ex. près du Bird Sanctuary le 05 et 3 ex. dans ce site le 07-11. A noter, encore des jeunes fraîchement envolés le 05-11.
129. **Bergeronnette printanière *Motacilla flava*** : c.5 ex. pour la journée du 02-11 puis encore 2 mâles isolés le 06-11 (Ne'ot Smadar et Qetura) et une audition au km. 66 au nord d'Eilat le 07-11.
130. **Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*** : 2 ou 3 ex. dans la réserve naturelle de Nahal David & Nahal Arugot à Ein Gedi le 01-11 et 1 ex. à la palmeraie d'Elot le 03-11 furent les seules du voyage.
131. **Bergeronnette grise *Motacilla alba*** : un des passereaux les plus abondants. L'espèce est présente par dizaines dans chaque zone de bassins.
132. **Pipit des arbres *Anthus trivialis*** : trois isolés, migrateurs tardifs : 1 ex. à côté de la palmeraie d'Elot le 02-11, 1 ex. aux bassins de Qetura le 03-11 et 1 ex. à Lotan le 06-11.
133. **Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni*** : après le Pouillot à grands sourcils d'Ein Gedi le 01 et l'Alouette gulgule au nord d'Elot le 02, une nouvelle belle surprise nous attendait à la palmeraie d'Elot dans l'après-midi du 03-11. A chaque jour sa satisfaction ! Nous avons décidé de visiter ce site en raison de l'observation d'une Bondrée orientale rapportée quelques jours plus tôt, en fait l'oiseau qui a déjà hiverné ici antérieurement. Au moment de quitter le site, un pipit décolle près de nous et se pose dans une haie sèche bordant le site.

Son dessus olivâtre fait immédiatement tinter l'alarme : un Pipit à dos olive !! Après une longue « traque » dans la palmeraie durant laquelle il se tenait constamment haut dans les arbres, l'oiseau put être superbement observé se nourrissant au sol au pied des palmiers puis se séchant le plumage après un bain, de retour dans la haie du début de l'observation. Il présentait toutes les caractéristiques de l'espèce : taille un peu inférieure au Pipit des arbres, queue plus courte, dessus et bord des rémiges nettement vert olivâtre, sourcil de deux couleurs (roussâtre devant l'œil, blanc derrière) surmonté d'une fine ligne noire, double petite tache noir-blanc derrière les parotiques, abondante striure noire sur la poitrine, cri comme celui du Pipit des arbres mais plus doux, moins audible, hochement de queue incessant.

134. **Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*** : un des passereaux les plus abondants, extrêmement visible dans toutes les zones de bassins ou de champs et d'herbe, voire même en plein désert (au km. 66 au nord d'Eilat). Des dizaines chaque jour avec un maximum de plus de 120 ex. le 02-11 dont un groupe de c.100 ex. dans un champ d'oignons près des champs circulaires de Yotvata. Certains oiseaux arboraient encore beaucoup de roux à la gorge tandis que les plus ternes restaient bien reconnaissables grâce à leurs abondantes rayures.
135. **Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*** : noté dans la plupart des zones de bassins à partir du 03-11, ainsi que sur des zones herbeuses comme Lotan et les « turf fields » de Samar. Au total, total un peu supérieur à 15 ex. Son cousin asiatique, le Pipit farlousane *Anthus rubescens*, manque à l'appel. Il constituera une bonne raison de retourner dans le sud d'Israël un de ces automnes ...
136. **Pinson des arbres *Fringilla coelebs*** : trois contacts furent obtenus avec cette espèce qui doit se trouver ici à sa limite méridionale d'hivernage : des auditions le 03-11 à la palmeraie d'Elot et le 06-11 à Lotan et 1 femelle en plein désert (dans de jeunes palmiers) au km. 66 au nord d'Eilat le 07-11.
137. **Verdier d'Europe *Carduelis chloris*** : un mâle à Ne'ot Smadar le 06-11 est le seul *Carduelis* du voyage !
138. **Bruant proyer *Emberiza calandra*** : 2 ex. aux bassins de Samar le 04-11 et 1 ex. à Ne'ot Smadar le 06-11.

~ ~ ~ ~ ~