

# Israël

## Liste commentée des observations ornithologiques du 1<sup>er</sup> au 8 avril 2000

### 1. Glossaire

Lieux:

AP = Amrams Pilars  
 BGA = Ben Gourion Airport, aéroport de Tel Aviv  
 E = Eilat  
 EG = Ein Gedi  
 K?? = indique le repère kilométrique sur la route 90 au nord d'Eilat  
 MR = Mizpe Ramon  
 Mt = Mont Yoash, mont près d'Eilat où passe la migration des rapaces  
 N = Nizzana  
 Neot = bassins au sud de la Mer Morte  
 S = Shizzafon  
 Y = Yotvata

Condition d'observation optimale de l'espèce:

(-2) = oiseau trop loin ou vu trop peu de temps pour être identifiable  
 (-1) = oiseau vu juste assez près ou juste assez de temps pour être identifiable  
 (0) = oiseau vu dans des conditions moyennes (temps et distance)  
 (1) = oiseau vu dans de bonnes conditions (distance) mais généralement peu de temps (rapace en migration ou oiseau furtif)  
 (2) = oiseau très bien vu

Divers:

ad = adulte  
 cht = chanteur  
 com = commun  
 migr = migrateur  
 m = mâle  
 f = femelle  
 nb = nombreux  
 YK = espèce identifiée avec Yves Kayser  
 \* = espèce nouvelle (coche)

### 2 Liste commentée par espèce

	Espèce	Sous-espèce ou nom scientifique si ambiguïté	Remarques et lieux	Condition d'observation optimum	Nota
1	Grèbe castagneux		N	(2)	
2	Grand Cormoran	<i>sinensis</i>	E : quelques uns à North Beach	(2)	
3	Blongios nain		N : 1 m en vol	(0)	
4	Bihoreau gris		1 ad au bord de la route 40	(2)	
5	Héron strié		E : 1 au loin à North Beach	(-1)	
6	Héron garde-boeuf		E : 1 seul et quelques uns en vol à BGA	(2)	
7	Crabier chevelu		E, K20 et Neot	(2)	
8	Héron cendré		E : com	(2)	
9	Héron pourpré		E : quelques uns en vol migratoire	(1)	
10	Cigogne blanche		K20: quelques unes en vol et posées	(2)	
11	Cigogne noire		K20 : quelques unes en vol et posées	(1)	

12	Ibis falcinelle		K20: 3 posés, BGA: 1 en vol	(2)	
14	Flamant rose		K20	(2)	
15	Tadorne de Belon		K20	(2)	
16	Canard pilet		K20	(2)	
17	Canard souchet		K20	(2)	
18	Sarcelle d'été		E : North Beach, 1 groupe en migr	(-1)	
19	Vautour fauve		MR et EG	(0)	
20	Vautour percnoptère		Mt et AP en migr.	(1)	
21	Balbusard pêcheur		E, Mt et K20	(2)	
22	Aigle impérial		Mt : 1 immature identifié avec YK le 04/04	(0)	1
23	*Aigle pomarin		Mt : 1 ind identifié avec YK le 04/04	(1)	2
24	Aigle criard		K20: 1 ad identifié avec Pierre Crouzier et d'autres le 06/04	(1)	3
25	* Aigle des steppes	<i>orientalis</i>	N et Mt : YK	(1)	4
26	Circaète Jean-le-Blanc		Route 40	(2)	
27	Aigle botté		K40: 1 phase sombre et qqs phase claire au Mt	(1)	
28	Milan noir		Com	(2)	
29	Busard des roseaux		E, K20 et K40	(2)	
30	*Busard pâle		N: 1 m ad vu le 01/04	(2)	5
31	Buse féroce	<i>rufinus</i>	Route 40 et Mt avec YK	(1)	6
32	Buse des steppes	<i>Buteo buteo vulpinus</i>	Com	(2)	
33	Epervier d'Europe		E et Mt : quelques uns	(2)	
34	*Epervier à pieds courts		Mt, E, AP et Y	(1)	7
35	Faucon crécerelle		Quelques uns	(2)	
36	Faucon crécerellette		1 f le 04/04 à S avec YK	(1)	8
37	Faucon hobereau		BGA: les 07 et 08/04	(2)	
38	*Faucon de Barbarie		K33 : 1 ad le 07/04 mangeant, au sol, 1 Moineau espagnol	(2)	
39	*Perdrix choukar	<i>sinaica</i>	N et Route 40 le 01/04	(2)	
40	*Perdrix de Hey	<i>heyi</i>	E	(2)	
41	Caille des blés		K20 et K40, individus posés	(2)	
42	*Marouette poussin		Neot : 2 m et 1 f le 07/04	(2)	
43	Gallinule poule-d'eau		E et Neot	(2)	
44	Foulque macroule		Neot	(2)	
45	Grue cendrée		N : 4 ind le 01/04	(2)	
46	Echasse blanche		K20	(2)	
47	*Courvite isabelle		N (plusieurs le 01/04) et 1 au K20 le 04/04	(2)	
48	Glaréole à collier		K20 : 10 le 06/04	(1)	
49	Petit Gravelot	<i>curonicus</i>	K20: com	(2)	
50	Grand Gravelot	<i>tundrae</i>	K20: com	(2)	
51	Gravelot à collier interrompu		K20: com	(2)	
52	Gravelot de Leschenault	<i>columbinus</i>	K20 : 1 le 03/04 et 1 le 06/04	(2)	9
53	Pluvier argenté		K20 : 1 le 06/04	(1)	
54	*Pluvier asiatique		S : 1 m le 04/04 K20 : 2 le 06/04	(2)	
55	*Vanneau éperonné		Com	(2)	
56	Bécasseau variable		K20 : com	(2)	
57	Bécasseau falcinelle		K20 : 1 le 03/04, 1 le 06/04	(2)	
58	Bécasseau de Temminck		E : 1 le 02/04	(2)	
59	Bécasseau minute		K20 : com	(2)	
60	Chevalier sylvain		K20 : au moins 1 le 01/04	(2)	
61	Chevalier culblanc		K20, E et Neot: qqs uns	(2)	
62	Chevalier gambette		K20	(2)	

63	Chevalier aboyeur		K20	(2)	
64	Chevalier stagnatile		K20	(2)	
65	Barge à queue noire		K20 : 1 le 01/04	(2)	
66	Courlis cendré		K20 : 1 le 04/04	(2)	
67	Bécassine des marais		E : 1 à la station de baguage le 02/04	(2)	
68	Phalarope à bec étroit		K20 : 1 le 01/04, 1 le 03/04 et 2 le 06/04	(2)	
69	Combattant varié		K20 : com	(2)	
70	Labbe parasite		E : 1 ad phase claire le 04/04	(1)	
71	Mouette rieuse		E et K20 : peu commune	(2)	
72	Goéland railleur		E et K20 : commun	(2)	
73	Goéland pontique	<i>Larus (cachinnans) cachinnans</i>	E : 2 ad le 04:04 avec YK	(1)	
74	Goéland brun	<i>Ssp fuscus mais qqs uns avec manteau plus clair?</i>	E : qqs uns	(1)	
75	*Goéland de Sibérie	<i>Larus (fuscus) heuglini heuglini</i>	E : 2 ad le 04:04 avec YK	(1)	10
76	*Goéland ichthyète		E : 1 premier hiver/été le 05/04	(1)	11
77	*Goéland à iris blanc		E : qqs uns à North Beach	(2)	
78	Sterne caugék		E : qqs unes le 02/04 à North Beach	(-1)	
79	Sterne hansel		E (North Beach) et K20	(1)	
80	Sterne pierregarin		E : qqs uns à North Beach le 05/04	(1)	
81	Sterne caspienne		E : régulière à North Beach	(2)	
	Sterne bridée		Posée sur un ponton flottant très loin le 05/04	(-2)	12
82	Guifette leucoptère		1 ad nuptial en migration le 05/04 à E	(-1)	
83	Ganga unibande		1 en vol le 01/04 à N	(-1)	
84	Ganga cata		Plusieurs posées et en vol le 01/04 à N	(2)	
85	*Ganga de Lihtenstein		2 m et 2 f le 04/04, au crépuscule, à la station de pompage d'Eilat	(2)	
86	Pigeon biset	<i>palestinae</i>	Sauvages à MR et au Mt	(2)	
87	Tourterelle turque		Com	(2)	
88	*Tourterelle maillée		Com	(2)	
89	*Tourterelle masquée		1 f le 01/04 au K20 et 1 couple à E (palmeraie) le 05/04	(2)	
90	Martinet noir		Qqs uns	(2)	
91	Martinet pâle		Qqs uns	(2)	
92	Martinet à ventre blanc	<i>melba, tuneti?</i>	1 le 01/04 à S	(2)	
93	Huppe fasciée		Qqs unes	(2)	
94	Martin-chasseur de Smyrne		1 le 07/04 à E (palmeraie) et 1 le 07/04 0 Neot	(1)	
95	Alcyon pie		Uniquement à E (North Beach)	(1)	
96	Guêpier d'Europe		Com en migr	(2)	
97	*Guêpier de Perse		1 ind à E du 03 au 05/04	(2)	
98	*Guêpier d'Orient	<i>cyanophrys</i>	Qqs uns à E, K20 et K33	(2)	
99	Perruche à collier	<i>borealis</i>	Qqs unes en vol à E (North Beach) et 1 le 08/04 à BGA	(1)	
100	*Pic syriaque		1 f et 1 m le 08/04 à BGA	(2)	
101	Cochevis huppé		Commun	(2)	
102	Alouette calandrelle		Commune en migr.	(2)	
103	*Ammomane isabelline		Commune dans les milieux favorables	(2)	
104	*Alouette monticole		1 le 04/04 au K20	(2)	
105	*Alouette bilophe		1 le 03/04 au K20	(2)	
106	*Sirli du désert		K33 : 1 chanteur le 02/04 et le 03/04	(2)	
107	Hirondelle de rivage	<i>riparia, diluta, eilata?</i>	Commune au K20	(2)	

108	*Hirondelle isabelline		Commune	(2)	
109	Hirondelle rustique		Commune	(2)	
110	Hirondelle rousseline	<i>rufula</i>	Commune	(2)	
111	Hirondelle de fenêtre		Commune	(2)	
112	Pipit rousseline		Qqs uns: K40 essentiellement	(2)	
113	Pipit spioncelle	<i>coutelli</i>	Qqs uns : K20 essentiellement	(2)	
114	Pipit des arbres		1 à N le 01/04 et 1 au K20 le 02/04	(2)	
115	Pipit à gorge rousse		Commun : essentiellement au K20	(2)	
116	Bergeronnette grise		Commune	(2)	
117	Bergeronnette printanière	<i>flava, dombrowski, superciliaris, thunbergi, beema, feldegg</i>	Commune	(2)	
118	*Bergeronnette citrine		1 f les 03 et 04/04 à E (station de baguage)	(2)	
119	*Bulbul d'Arabie		Commun	(2)	
120	*Agrobate roux	<i>syriacus?</i>	1 ind sans queue du 01 au 06/04 au K20	(2)	
121	Gorgebleue à miroir	<i>volgae, pallidogularis, cyanecula?</i>	Assez commun	(2)	
122	*Iranie à gorge blanche		1 f le 03/04 au K20	(1)	
123	Rougequeue à front blanc	<i>1 m samamisticus et 1 m phoenicurus</i>	3 mâles	(2)	
124	Traquet motteux		Commun	(2)	
125	*Traquet isabelle		Assez commun surtout N et K20	(2)	13
126	*Traquet à queue noire		Commun	(2)	
127	Traquet oreillard	<i>melanoleuca</i>	Assez commun	(2)	
128	*Traquet pie		1 f le 01/04 dans un oasis après N	(1)	14
129	*Traquet deuil	<i>lugens</i>	1 sur la route avant MR le 01/04 et 1 le 04/04 à S	(2)	

130	*Traquet à capuchon		1 f le 05/04 à E (Coral Beach)	(1)	15
131	*Traquet à tête blanche	<i>ernesti</i>	Assez commun	(2)	
132	Merle noir		2 à BGA le 08/04	(2)	
133	Monticole de roche		1 m le 04/04 à S et 1 f le 05/04 au Mt	(2)	
134	Fauvette à tête noire		Assez commune	(2)	
135	Fauvette orphée	<i>crassirostris</i>	1 (f certainement) dans un oasis après N	(2)	
136	*Fauvette d'Arabie	<i>negevensis</i>	1 le 07/04 à Y	(2)	16
137	Fauvette babillarde		Très commune	(2)	
138	Fauvette mélanocéphale	<i>momus</i>	Qqs unes à E	(2)	
139	*Fauvette de Rüppell		1 m le 01/04 à N et 1 f le 03/04 au K33	(2)	
140	Fauvette grisette	<i>icterops?</i>	Qqs unes à E et 1 cht à BGA	(2)	
141	*Dromoïque du désert		2 le 03/04 aux AP	(1)	
142	*Prinia gracile	<i>deltae, palestinae?</i>	Commune	(2)	
143	Lusciniolle à moustaches	<i>mimicus</i>	1 le 07/04 à Neot	(0)	
144	*Rousserolle stentor		1 chanteur le 07/04 à Neot	(2)	17
145	*Hypolaïs pâle	<i>elaeica?</i>	Assez commun	(2)	18
146	*Pouillot oriental	<i>Phylloscopus (bonelli) orientalis</i>	Assez commun	(2)	
147	Pouillot véloce		Qqs uns	(2)	
148	Gobemouche à demi-collier		1 m le 04/04 à Y	(2)	
149	Mésange charbonnière	<i>terraesanctae</i>	Qqs unes le 08/04 à BGA	(2)	
150	Pie-grièche à tête rousse	<i>niloticus</i>	Qqs unes	(2)	
151	*Pie-grièche masquée		Qqs unes (m et f)	(2)	
152	Pie-grièche méridionale	<i>aucheri</i>	1 à N le 01/04	(2)	
153	*Souimanga de Palestine		Assez commun	(2)	
154	*Cratéope écaillé		Vu à N, E et Y	(2)	
155	Geai des chênes	<i>atricapillus</i>	Qqs uns les 07 et 08/04 0 BGA	(2)	
156	Corneille mantelée	<i>Corvus corone cornix</i>	Vu à Y et BGA	(2)	
157	*Corbeau brun		Assez commun	(2)	
158	*Corbeau à queue courte		Qqs uns à EG le 07/04	(2)	
159	*Corbeau familier		Commun à E	(2)	
160	Choucas des tours	<i>soemeringhii</i>	1 le 08/04 à BGA	(1)	
161	*Rufipenne de Tristram		Commun	(2)	
162	Moineau domestique		Commun	(2)	
163	*Moineau espagnol		Commun autour d'E	(2)	
164	*Moineau pâle		K40 : 1 le 02/04 et 3 le 06/04	(2)	
165	Verdier d'Europe		1 le 01/04 dans un oasis après N	(2)	
166	Chardonneret d'Europe		Qqs uns le 08/04 à BGA	(2)	
167	*Roselin githagine		Commun au K40. Vu aussi à E	(2)	
168	Bruant ortolan		Qqs uns en migration	(2)	
169	*Bruant cendrillard		1 f le 02/04 au K20, 1 m les 04 et 05/04 à E	(2)	
170	*Bruant cendré		1 f le 02/04 au K40	(2)	19
171	*Bruant striolé	<i>striolata</i>	1 m le 05/04 à E	(2)	

Conclusion : 171 espèces observées dont 55 nouvelles (coches).

Mammifères observés:

- Bouquetin de Nubie

- Gazelle dorca
- Daman du Cap

### 3 Notas

1. Aigle impérial  
Le 4 avril, vers midi, nous (avec Yves Kayser) descendons du Mt et nous nous arrêtons un peu avant d'arriver à Eilat car nous constatons un fort passage. Nous observons un aigle (Aquila) avec les ailes moins cassées que l'Aigle des steppes et des fenêtres intérieures pâles et très visibles sous les ailes. Il s'agissait donc d'un Aigle impérial immature. Observation moyenne qualifiée de (0).
2. Aigle pomarin  
Le 4 avril (matin), Yves Kayser m'a montré au Mt un Aigle pomarin.  
La taille était supérieure à la Buse des steppes mais inférieure à l'Aigle des steppes. La silhouette était différente de l'Aigle des steppes (pas de longues ailes cassées) mais du type Aigle criard/pomarin. Un contraste était apparent (dessus et dessous les ailes) entre le brun (mais pas beige, excluant ainsi l'Aigle criard *fulvescens*) du devant de l'aile et le sombre de l'arrière. Une virgule blanche était apparente sous l'aile. Très belle observation qualifiée de (1).
3. Aigle criard  
Le 6 avril après-midi, au K20, un ornithologue crie "an eagle". Nous observons tous un aigle du type criard ou pomarin d'après la silhouette. Le contraste, bien que peu marqué entre avant et arrière de l'aile est visible, ce qui nous (Pierre Crouzier et moi) fait penser à un Aigle pomarin. Cependant, il n'y avait pas de virgule blanche dessous l'aile et pas de taches blanches très visibles dessus l'aile. Ultérieurement et en accord avec les autres ornithologues (anglais et hollandais), nous déduisons que c'était un Aigle criard. Belle observation qualifiée de (1).
4. Aigle des steppes  
Aigle observé le 01/04 à N (seul) et le 04/04 au Mt (avec YK). Le plus facile à identifier des aigles avec ses longues ailes cassées. De plus, les subadultes avec la bande blanche sous-ailaire sont caractéristiques. Très belles observations qualifiées de (1).
5. Busard pâle  
Le 1<sup>er</sup> avril à N, un busard gris mâle survole le désert. Tout de suite, je reconnais un Busard pâle mâle à ses coins noirs au bout des ailes et à sa poitrine claire. Très belle observation qualifiée de (2).
6. Buse féroce  
Facile à identifier quand elle est avec des Buses des steppes par sa plus grande taille et sa façon de planer avec les ailes plus relevées. Les caractères de plumage qui confortent l'identification sont la tête claire, le carré carpal noir et la queue claire de dessus. Observée le 01/04 sur la route 40 (0), le 04/04 en migration au Mt (0) et le 06/04 en migration au Mt (1).
7. Epervier à pieds courts  
Pas facile à identifier, les caractères sont le vol un peu différent de l'Epervier d'Europe et surtout le bout des ailes sombre et plus étroit.
  - le 04/04 après le Mt: individu présentant le bout des ailes noir avec le dessous des ailes clair, dessus du corps bicolore (marron et gris), dessous du corps légèrement roux donc certainement mâle de 2<sup>ème</sup> année. Observé avec Yves Kayser (1).
  - le 05/04 à la station de pompage d'Eilat, observation d'1 femelle certainement. Bout des ailes noires contrastant avec le dessous des ailes clair, dessous rayé légèrement teinté de roux. Identification confirmée par des ornithologues britanniques (1).
  - le 05/04 aux AP, 1 mâle avec dessous des ailes blanc et bouts des ailes noirs (1).
  - le 07/04 à Y: 1 femelle avec dessous roux rayé, bouts des ailes noirs et surtout trait sombre à la gorge (1).
8. Faucon crécerellette  
1 femelle vue posée le 04/04 à S avec YK. Corps plus svelte, moustaches noires peu marquées et les rectrices centrales de la queue plus longues (1).
9. Gravelot de Leschenault  
Vu le 03 et 06/04 au K20. Pour moi, le caractère le plus sûr est la couleur des pattes surtout qu'il s'agit ici de *columbinus* (2).
10. Goéland de Sibérie *heuglini*

Grande taille, nettement supérieure au *cachinnans* présents à côté. La couleur du manteau était légèrement plus claire que celle des *fuscus* présents sur le site. Observation de 2 adultes à E (station de baguage) avec YK (1).

11. Goéland ichthyaète  
Très difficile à identifier si ce n'est pas un adulte et si il n'est pas vu de profil comme cela a été le cas pour moi. Ce sont des ornithologues anglais qui l'ont repéré grâce au masque sombre de la tête. Le profil de la tête et du bec est caractéristique quand l'oiseau est bien de profil (et non pas de 3/4 face). La zone pâle centrale sur l'aile en vol est bien visible. Observé 1 individu, entre le 1<sup>er</sup> hiver et le 1<sup>er</sup> été, le 05/04 à la station de baguage d'Eilat (1).
12. Sterne bridée  
1 individu vu le 05/04 posé sur un ponton flottant mais très loin était soi-disant de cette espèce. Identification positivement impossible (-2).
13. Traquet isabelle  
Pas facile à identifier. Le critère le plus sûr que j'ai constaté à N est le dessous de l'aile clair visible à l'envol. Vu à N seul et au K20 et à S avec YK (2).
14. Traquet pie  
Le 01/04, dans un oasis juste après Nizzana en allant vers Eilat, j'ai vu un oiseau que j'ai d'abord pris pour une femelle de Rougequeue noir (très sombre dessus et au cou et à la poitrine) mais avec une queue type motteux. Bien que Hadoram Shirihai dans son livre "The Birds of Israël" spécifie qu'il existe une population de Traquet oreillard en Turquie avec des femelles identiques à celles du Traquet pie, je considère que cet individu était un Traquet pie étant donné la couleur sombre uniforme de l'oiseau sans contraste apparent (1).
15. Traquet à capuchon  
Le 05/04 de bonne heure le matin, je cherche le Traquet à capuchon dans un wadi près de Coral Beach (spot classique pour cette espèce). J'observe rapidement un oiseau de couleur pâle (sable) avec en léger sourcil clair, un bec fort et le dessous de la queue roussâtre sur les bords. Il s'agissait donc d'un individu femelle de cette espèce. A noter que le dessin du "Guide de l'ornitho" me semble trop sombre, l'oiseau correspondait exactement au dessin du "MacMillan" (1).
16. Fauvette d'Arabie  
Facile à identifier avec sa tête de couleur brun noir, sa queue entièrement noire qu'elle agite souvent vers le bas. Vue au spot classique de Yotvata le 07/04 (2).
17. Rousserolle stentor  
Facile à identifier: petite projection primaire, long bec légèrement courbé, pas de sourcil blanc derrière l'œil et brun sale sous le corps. Observée le 07/04 à Neot (2).
18. Hypolaïs pâle  
Facile à identifier de part son insignifiance, sa couleur pâle, sa manière d'abaisser la queue et son cri. Vu durant tout le séjour (2).
19. Bruant cendré  
Observation d'1 femelle le 02/04 au K40 avec d'autres ornithologues français. Le critère le plus fiable est le bec gris (2).

#### **4.Regrets**

- Faucon lanier
- Outarde houbara: loupée à Nizzana pourtant je ne devais pas en être loin (ma plus grande déception)
- Vanneau à queue blanche: 1 individu était présent à E la semaine précédant mon séjour
- Sterne bridée: j'aurais bien aimé qu'elle se rapproche de la plage
- Ganga tachetée: il en reste encore à Nizzana mais je ne les ai pas vues alors que la Ganga couronnée n'existe plus dans le secteur (fide YK)
- Ammomane élégante, je suis allé pourtant sur des sites favorables (N et K33)
- Pipit farlousane: 1 individu était présent à E la semaine précédant mon séjour
- Agrobate roux: 1 individu avec une queue!
- Moineau de la Mer Morte: très farouche
- Capucin bec-de-plomb
- Serin syriaque: 2 individus étaient présents à E la semaine précédant mon séjour

- Roselin de Lichtenstein
- Roselin du Sinai: 2 individus étaient présents aux AP la semaine précédant mon séjour