

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

AU

MAROC

du 03 au 17 Avril 1999.

Aude ARTRU
Marc BRIGNON
Estelle GRUNENWALD
Fabrice SCHMITT

Le 03 Avril, arrivée à Marrakech vers 23h.

Le 04 Avril, observations dans les parcs de Marrakech : quelques couples nicheurs de Cicognes blanches sur les remparts de la ville, 1 Aigle bottée phase clair, 2-3 Faucon crécerelle/crécerellette, (dans le souk, il y a quelques Faucons pèlerins en captivité), environs 10 Guêpiers d'Europe, Tourterelle turque, Pigeon ramier, nombreux Martinets pâles (nichent dans le mur d'enceinte du palais royal), assez réguliers Martinets des maisons, Merle noir, 1 Hypolaïs pâle, quelques Fauvettes mélanocéphales, nombreux Bulbuls des jardins, Etourneaux sp., Moineau domestique, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier, Chardonnerets, quelques Bruants striolés (viennent se nourrir dans les épiceries).

Première partie : Randonnée dans le Haut-Atlas.

Pour cela, on prend un taxi collectif de Marrakech à Asni (environs 60 km, 10-15 dirhams). On arrive à Asni le 05 Avril en soirée, et on plante la tente à 2 km d'Asni.

La tente n'est vraiment pas nécessaire, puisque tout le long du trajet, il est possible de dormir et de manger chez l'habitant. Il faut juste avoir de quoi casse croûter à midi (on trouve du pain dans presque tous les villages, et les petites épiceries sont assez régulières).

La saison est idéale pour la marche et pour l'ornitho. En effet, il ne fait pas encore trop chaud (même si certaine montée sous le soleil nous ont fait suer), on trouve de l'eau très régulièrement et les paysages verdoyants sont magnifiques. Et pour les piafs, ils sont tous en période de nidification, c'est à dire entrain de chanter, de parader, de délimiter du territoire et donc facilement observables.

Le 06 Avril (de ASNI à IKIS) :

1 Cicogne blanche, 4 Aigrettes garzettes, 1 couple d'Epervier (parade nuptiale près d'une aire), 1 couple de Buse féroce, 1 Faucon crécerelle, 2 fois 2 Perdrix gabra, Pigeon ramier, Pigeon biset semi-domestique, 1 Chouette chevêche, quelques Guêpiers d'Europe au niveau d'Asni, , 2 Pic de Levillant, 1 Cochevis de Théckla, nombreuses Hirondelles de rocher, une dizaine d'Hirondelle rousseline, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, 1 couple de Bergeronnette des ruisseaux, 1 chanteur de Troglodyte, chant du Rougegorge, chant du Rossignol, nombreux Rougequeue de Moussier, 2-3 couples de Traquet oreillard, 1 couple de Traquet rieur, Merle noir, 2 couples de Fauvette passerinnette, Fauvette à tête noire, Fauvette mélanocéphale, 1 Pouillot de Bonelli, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Bulbuls des jardins (nombreux à Asni, aucun à plus haute altitude), Geai, 2 Chocards, Moineau domestique, Pinson des arbres, 1 Grosbec, Serin cini, 2 Linottes mélodieuses, assez nombreux Bruants fou, Bruant striolé.

Le 07 Avril (de IKIS à TACHEDIRT, et environs de TACHEDIRT) :

Il faut a peu près 1 heure de marche pour rejoindre Tachedirt depuis Ikis. Arrivé à Tachedirt, une passe la journée à se balader dans les environs (vers le col de IMLIL).

1 Aigle royal adulte, 2 Aigles bottés phase clair, Faucon crécerelle, 2-3 chanteurs de Pic de Levillant, Hirondelle de rochers, Troglodyte, Rougequeue noir, Rougequeue de Moussier, 1 couple de Merle de roche, Merle noir, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange noire, un groupe d'une cinquantaine de Crave ou de Chocard, Moineau domestique, Pinson des arbres, Bruant fou, Bruant striolé.

Le 08 Avril (de TACHEDIRT à IABASEN) :

Il vaut mieux partir le plus tôt possible (pour nous c'est 7h30) pour éviter de monter au col sous le cagnard.

A cette date il restait sur le versant nord du col, environ 1 mètres de neige sur une centaine de mètres. Le reste du parcours était complètement dégagé.

Faucon crécerelle, 2 + 1 Perdrix gabra, 2-3 couples d'Alouette haussecol sur le col, Hirondelle de rocher, 1 Accenteur alpin, Troglodyte, Rougequeue noir, Rougequeue de Moussier, au moins 4 couples de Traquet motteux, Traquet rieur, Merle noir, Mésange bleue, une quarantaine de Crave à bec rouge (se nourrissent au bord d'un névé, juste sous le col), Moineau domestique, Pinson des arbres, 5 Roselins à ailes roses ensemble (se nourrissent sur une pelouse gorgée d'eau, au bord d'un petit cours d'eau entre Tachedirt et le col), Bruant fou.

Le 09 Avril (de IABASEN à SETTI-FATMA) :

Il faut faire attention de ne pas arriver trop tard à Setti-Fatma sous peine de ne plus trouver de taxi ou de bus pour partir (il faut alors dormir à Setti-Fatma, village aménagé pour le tourisme).

Faucon crécerelle, 1 couple d'Aigles royaux, 2-3 Buses féroces, 1 Epervier d'Europe, très nombreux Martinets noirs en migration, une vingtaine de Guêpiers en migration, cri du Pic de Levillant, Hirondelle de rocher, Hirondelle rustique (nombreuses en migration), Hirondelle de fenêtre (migration), 1 Hirondelle de rivage en migration, 2-3 Hirondelles rousselines, Bergeronnette des ruisseaux, 1 couple de Cincle plongeur, Troglodyte, Rougequeue de Moussier, 1 Tarier des prés (migration), Merle noir, 1 couple de Fauvette de l'Atlas, Mésange charbonnière, Mésange bleue, quelques Bulbuls des jardins près de Setti-Fatma, Moineau domestique, Pinson des arbres, Bruant fou, Bruant striolé.

Deuxième partie du voyage : Visites des gorges à l'est de Ouarzazate.

Le 10 Avril (de MARRAKECH à TINEHIRT) :

Il faut compter 10 heures de trajet en bus pour arriver à Tinehirt (avec une escale pour manger à Ouarzazate).

En trajet : 1 Aigle botté phase clair, 1 Faucon pèlerin/de Barbarie (voir page 6), 2 Perdrix gambras, 2 Rolliers, 2 Cochevis de Thékla (lors d'une pause), Traquet oreillard, 2 Traquets rieurs, 1 Pie bavarde, une dizaine de Crave à bec rouge.

Un dortoir d'une vingtaine de Héron garde-bœuf sur la place centrale de Tinehirt.

Le 11 Avril (GORGES DU TODRA) :

Il est possible de faire plusieurs dizaines de kilomètres de balade dans les gorges et environs, mais en pleine journée, ça cogne ! (prévoir une cargaison de bouteille d'eau). On peut aussi faire une partie des gorges en stop, puisque quelques camions passent par là pour rejoindre un village à une vingtaine de kilomètre de l'entrée des gorges.

1 couple d'Aigle de Bonelli parade au-dessus des gorges (à l'entrée) : pique à environs trente mètres d'une maison, et à une centaine de mètres de nous), 2 Perdrix gabra, 1 Tourterelle des bois, une vingtaine de Guêpiers, 3-4 Ammomane isabelline, nombreuses Hirondelles de rochers, nombreuses Hirondelles de fenêtres, quelques Hirondelles rustiques, Martinet noir ou pâle, Bergeronnettes des ruisseaux, très nombreux Rossignols, 2 mâles et 1 femelle de Rougequeue à front blanc, Rougequeue noir, Traquet oreillard, 1 Traquet rieur, nombreux Merle bleus (+ 10 couples), Merle noir, 2-3 Bouscarles de Cetti, 1 Hypolaïs pâle, 1 Fauvette passerinette, 1 mâle de Fauvette à lunette, 1 Fauvette des jardins, 1 mâle de Fauvette grisette, 2 couples de Fauvettes de l'Atlas, plus de 10 Pouillot de Bonelli, nombreux Pouillot fitis, 1 Gobemouche noir, Mésange bleue, nombreux Bulbuls des jardins, Moineaux domestiques, nombreux Serin cini, 1 couple de Roselin githagine, Bruant fou, Bruant striolé.

1 Ecureuil de Barbarie.

Le 12 Avril (TINEHIRT) :

On rejoint le village de Tinehirt à pied, depuis notre camping (camping "Au soleil", situé à 6-7 km avant les gorges) à travers la palmeraie. La balade est sympa, et la palmeraie est remplie d'oiseaux en halte migratoire.

1 Buse féroce, quelques Tourterelles des bois chantent dans la palmeraie, Guêpier d'Europe, 2 couples d'Ammomane isabelline à une centaine de mètres du camping (partie aride en amont des vergers), Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, 3 Hirondelles rouselines, Hirondelle de rocher, Bergeronnette des ruisseaux, Rossignol, 1 mâle de Traquet motteux au camping, nombreux Merles noirs, nombreuses Bouscarles de Cetti, Hypolaïs pâle, 2 couples de Fauvettes passerinettes au camping, 1 mâle de Fauvette grisette au camping, 1 Pouillot de Bonelli au camping, Pouillot fitis, 10-15 Pie-grièches à tête rousse, 1 Pie-grièche grise, Mésange bleue, Bulbul des jardins, Moineau domestique, nombreux Serins cinis, 30-40 Roselins githagines au niveau du camping, Bruant striolé, 1 Tarier des prés.

Le 13 Avril (Gorges du DADES) :

Depuis Boumalne, il faut prendre un taxis qui vous emmènera aux gorges du Dadès (elles se trouvent à 27 km de Boumalne). Nous nous sommes arrêter au bout de 15 km, pour visiter une première série de gorges, moins touristiques que celles du Dadès. Par contre, lors de la descente des gorges, il faut marcher dans la rivière pendant près d'une heure (parfois jusqu'à la taille).

2 Cicognes dans les cultures plus 1 nid avec un couveur sur une mosquée, 1 adulte Faucon pèlerin/de Barbarie (voir page 6), 1 Faucon crécerelle, 2 Chevaliers culblancs, 2-3 Chevaliers guignettes, 15 Guêpiers d'Europe, plus de 10 Huppés fasciées, 1 Pic épeiche, Hirondelle rustique, Hirondelle de rocher, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle de rivage, Martinet noir ou pâle, 2 couples de Bergeronnette grise, Bergeronnette des ruisseaux, très nombreux Rossignol, 1 Tarier des prés, Merle noir, 1 couple plus 1 femelle Merle bleu, plusieurs dizaines de Bouscarles de Cetti, Hyppolais pâle, Pouillot fitis, 1 Pie-grièche à tête rouse, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Bulbul des jardins, Moineau domestique, Moineau friquet, Serin cini, Chardonneret, Bruant striolé.

5 + 2 Emydes lépreuses, *Mauremys leprosa*

Le 14 Avril (chemin de TAGDILT) :

Pour faire ce circuit, il vaut mieux être motorisé afin de ne pas trop subir la chaleur. Mais il est tout à fait possible de ce balader dans cette superbe zone désertique à pied (on l'a fait), en emportant suffisamment d'eau avec soit. Pour une description détaillé de la zone, voir le fascicule de Dave Gosney.

1 adulte phase clair de Buse féroce, 1 Aigle botté (phase sombre), Courvite isabelle (1 individu posé, 4 + 6 en vol), Martinet noir, 3 Guêpiers de Perse, plus de 10 Cochevis sp., 30 + 20 + 5 Alouettes calandrelles, 1 + 1 + 2 Alouettes bilophes, 2 Alouettes de Clotbey, 1 couple + 1 individu Ammomanes isabellines, 2 couples d'Ammomane élégante, 4 Sirlis du désert (chantent et paradent activement), Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, 2 Pipits rousselines, nombreux Traquets du désert, 2 couples plus 1 femelle Traquets à tête grise, 3 Traquets motteux, 3 Pouillots fitis (dans un verger), 1 mâle de Fauvette passerinnette (dans le verger), 1 Tarier des prés (dans le verger), 1 Pie-grièche grise (ssp *algeriensis*), une troupe de 10 Roselins githagines, Moineau domestique.

A l'hôtel Soleil Bleu de Boumalne :

1 Chouette chevêche, 1 couple de Pipit rousseline, quelques Cochevis sp., 1 femelle et 1 mâle immature de Traquet du désert, 1 Tourterelle des bois.

2 Mériones de Shaw (nombreux terriers non loin de l'hôtel).

Le 15 Avril (Vallée des Roses) :

1 Héron cendré, Faucon crécerelle, nombreuses Bergeronnettes grises, Bergeronnettes des ruisseaux, 2 Bergeronnettes printanières, Hirondelle de rocher, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre, Bouscarle de Cetti, Pouillot fitis, Moineau domestique, Chardonneret, Serin cini, Mésange bleue, Merle bleu, Merle noir.

1 Ecureuil de Barbarie.

Le 16 Avril (trajet retour : à 15 km avant Ouarzazate) :

1 Traquet à tête blanche.

Le 17 Avril (changement d'avion à Casablanca) :

Quelques Martinets des maisons nichent dans l'aéroport (en tout cas au niveau de la salle d'attente n° 1).

Précisions sur les observations de Faucon pèlerin ou Faucon de Barbarie :

Observation du 10 Avril :

1 Faucon est observé depuis le bus qui assure la liaison Marrakech – Ouarzazate à travers l'Atlas (environ 1 heure après le col). L'oiseau n'est donc observé qu'une 15aine de secondes et n'a pas été détaillé correctement. La silhouette en vol est par contre sans équivoque, il ne peut s'agir que d'un Faucon pèlerin ou d'un Faucon de Barbarie. Selon la répartition, il s'agirait plutôt d'un Faucon de Barbarie, mais rien ne permet d'éliminer un Faucon pèlerin erratique...

Observation du 13 Avril :

1 Faucon est observé en vol alors que nous traversons une zone de culture. L'oiseau est observé au plus près à une distance de 70 mètres environ. A aucun moment il n'a été possible de voir la coloration du dessus de l'oiseau (entre autre la calotte). L'observation a duré 5 minutes.

De nouveau il s'agit d'un Faucon pèlerin/de Barbarie sans aucun doute (silhouette en vol, taille). Il s'agissait visiblement d'un adulte (pas de stries longitudinales sur le ventre). Les seuls critères observés correctement (puisque l'oiseau a été vu de dessous) sont les fines stries sur le ventre et sur le dessous des ailes (nettement plus fines que chez la ssp *pelegrinus* que nous connaissons bien en Alsace) et une moustache assez grosse très bien marquée. Ce dernier critère nous fait plutôt penser à un Faucon pèlerin (le seul bouquin d'identification que nous possédons à ce moment est le *Macmillan birder's Guide to european and middle eastern Birds.*). Toutefois, au vu du nouveau *Guide encyclopédique des oiseaux*, notre observation pourrait tout à fait correspondre à un Faucon de Barbarie adulte.

Cette observation restera donc sp. à jamais...

Bibliographie ornitho :

Pour l'identification des espèces, les guides classiques tels le "Lars Johnson" ou "le guide ornitho de DN" suffisent largement.

Pour avoir une description détaillée des sites majeur pour chercher les oiseaux, le "Finding Birds in southern Morocco, Dave Gosney" est vraiment utile (un fascicule pour le nord du Maroc existe également; à commander en angleterre).

Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Buse féroce	<i>Buteo rufinus cirtensis</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>
Aigle de Bonelli	<i>Hieraaetus fasciatus</i>
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Faucon pèlerin / de Barbarie	<i>Falco peregrinus / pelegrinoides</i>
Perdrix gabra	<i>Alectoris barbara</i>
Courvite isabelle	<i>Cursorius cursor</i>
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>
Martinet des maisons	<i>Apus affinis</i>
Guêpier de Perse	<i>Merops persicus</i>
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Pic de Levailant	<i>Picus vaillantii</i>
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Ammomane élégante	<i>Ammomanes cincturus</i>
Ammomane isabelline	<i>Ammomanes deserti</i>
Sirli du désert	<i>Alaemon alaudipes</i>
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Cochevis de Thékla	<i>Galerida theklae</i>
Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris atlas</i>
Alouette bilophe	<i>Eremophila bilopha</i>
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba subpersonata</i>
Bulbul des jardins	<i>Pycnonotus barbatus</i>
Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>

Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Rougequeue de Moussier	<i>Phoenicurus moussieri</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe seeboehmi</i>
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica hispanica</i>
Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>
Traquet à tête grise	<i>Oenanthe moesta</i>
Traquet à tête blanche	<i>Oenanthe leucopyga</i>
Traquet rieur	<i>Oenanthe leucura</i>
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Hypolaïs pâle	<i>Hippolais pallida opaca</i>
Fauvette de l'Atlas	<i>Sylvia deserticola</i>
Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Mésange noire	<i>Parus ater</i>
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus ultramarinus</i>
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis algeriensis</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Pie bavarde	<i>Pica pica mauritanica</i>
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhonorax graculus</i>
Crave à bec rouge	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs africana</i>
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Roselin à ailes roses	<i>Rhodopechys sanguinea</i>
Roselin githagine	<i>Rhodopechys githaginea</i>
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant striolé	<i>Emberiza striolata</i>

