

# **Belize et Yucatan (Sud du Mexique)**

## **17.07-18.08.2002**

### *Synthèse de 5 semaines d'observations ornithologiques*

**Observateurs :** Yohan Charbonnier (YC), Vincent Palomares (VP) et Julien Bottinelli (JB), souvent accompagnés par nos amis suisses : Annick Morgenthaler, Romain Béguélin et Jacques Laesser.

**Rédaction du rapport** assurée par Julien Bottinelli et Vincent Palomares. De précieuses corrections et des précisions ont été apportées par Jacques Laesser.

**Remerciements :** Nous remercions toute l'équipe de Shipstern Nature Reserve, pour son accueil et notamment Jacques Laesser, un ami suisse effectuant un inventaire avifaunistique de cette réserve entre Mai et Décembre 2002, et nous ayant invité à découvrir le Belize en sa compagnie.

#### **Déroulement du séjour et sites visités :**

17-18/07 : **Célestùn** (bord de mer) (Yucatan, Mex.)

19/07 : **Chichen Itza** (temples mayas et forêt sèche) (Yucatan, Mex.)

20/07 : passage de la frontière bélizéenne à Chetumal, petit arrêt à Orange Walk (rivière : New River) puis arrivée à la réserve de Shipstern (Belize)

21/07 : **Shipstern Nature Reserve** : quartier général (QG) et Robin's land (RL) (lagon et mangrove, hors réserve)

22/07 : **Orange Walk** (New River) et **Shipstern Nature Reserve** : QG et Thompson Trail (TT) (forêt tropicale sèche, savane et lagon bordé de mangroves)

23/07 : **Shipstern Nature Reserve** : QG, RL et Survey Line traversant la forêt tropicale sèche

24/07 : **Chunox** (village), **Fresh Water Creek** (forêt et savane humide) et passage à **Little Belize** (marais) (LB)

25/07 : **Crooked Tree** (zones humides, village, brousse et pinèdes) entre Orange Walk et Belize City et arrêt au marais de Little Belize

26-27/07 : **Shipstern Nature Reserve** : Xo-Pol (forêt tropicale avec un plan d'eau et savane humide)

27/07 (en soirée) : QG et RL

28/07 : **Shipstern Nature Reserve** : QG, TT et RL

29/07 : trajet en bus jusqu'à Belize City puis en bateau pour l'île de Caye Caulker

30/07 au 2/08 : **Caye Caulker** (île en bordure de la barrière de corail)

2/08 : Belize City, puis trajet en bus jusqu'à Dangriga

3/08 : Dangriga (D) (bord de mer), **Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary**

4-5/08 : **Cockscomb** (forêt tropicale humide et vallonnée, entrecoupée de rivières)

5/08 : remontée vers le nord, en bus (et en stop) jusqu'à Shipstern

6/08 : Orange Walk (New River), Chunox (cultures) et QG

7/08 : **Shipstern Nature Reserve** : QG, RL et Main Trail (forêt tropicale sèche et savane)

8&13/08 : **Shipstern Nature Reserve** : QG et RL

9-12/08 : **Shipstern Nature Reserve** : Shipstern landing (terrains au sud du lagon de Shipstern : forêt tropicale plutôt humide, savanes et lagon).

14/08 : visite des ruines du temple maya de **Lamanai** et trajet en bateau A/R Orange Walk-Lamanai, sur New River.

15/08 : **Shipstern Nature Reserve** : QG, RL et TT

16-18/08 : **Tulùm** (bord de mer et temples mayas) (Quintana Roo, Mex.)

#### **Considérations générales**

##### **Introduction :**

Voyager au Mexique et au Belize est une très belle expérience pour le naturaliste peu pressé et ne s'attendant pas à passer ses vacances dans le luxe et le confort. Le climat est chaud et humide et il est vraiment agréable (et rentable) d'observer le matin (jusque vers 10h) et en fin d'après-midi.

**Langue :**

La plupart des personnes rencontrées au Mexique ne parlaient qu'espagnol. Au Belize, la langue officielle nationale est l'anglais (ancienne colonie britannique) ; dans la pratique, il est parlé partout mais aux frontières avec le Mexique et le Guatemala, les autochtones s'expriment souvent plus facilement et volontier en espagnol...

**Argent :**

Il est conseillé d'emporter des \$US (liquide et travellers), car ces derniers sont acceptés aussi bien au Mexique qu'au Belize (la monnaie étant rendue dans celle du pays).

Change : 1 US \$ = 2960 pesos ; 1 US \$ = 2 Bel. \$.

Les guichets automatiques pour carte de crédit sont rares et très localisés au Belize (les seuls en fonctionnement que nous ayons trouvés étaient à Belize city). Le retrait d'argent liquide se fait au guichet, en présentant sa carte de crédit et son passeport.

Les bureaux de change sont fréquents et il est assez facile d'échanger pesos et Bel. \$ à la frontière mexicaine avec le Belize.

**Précautions :**

Il est recommandé de consulter un médecin avant le départ afin d'obtenir les vaccinations nécessaires (aucune obligatoire mais hépatite A, B, typhoïde, DTPolio vivement conseillés) ainsi qu'un traitement préventif contre le paludisme (le sud et l'ouest (Cockscomb par exemple) étant plus impaludés que le nord-est). Il est également vivement conseillé d'emporter antidiarhéiques et antipyrétiques.

En ce qui concerne les moustiques, emporter une moustiquaire (de taille assez grande, car la plupart des logements sont adaptés aux hamacs...) et des produits répulsifs efficaces ; une moustiquaire à tête peut parfois s'avérer très utile dans certains secteurs de forêt.

Pour les nuits passées dans des logements « précaires » (une majorité de bungalows en tous cas) : chaque matin, bien retourner ses chaussures afin de vérifier l'absence de scorpion à l'intérieur. Si vous dormez au sol (ou sous tente), comme ce fut le cas pour nous, vérifier que vous ne dormez pas avec une mygale ou un scorpion (et passer la moustiquaire sous le matelas) ...

**Ouvrages sur la faune du Belize et du Yucatan (Mexique) (soulignés : utilisés) :**

*Mexican Birds*, 1973, Peterson Field Guides, de Roger Tory Peterson and Edward L. Chalif.

*Neotropical Rainforest Mammals*, de L.H. Emmons. 1990- University of Chicago Press

*Guide d'identification des oiseaux de l'Amérique du Nord*, de National Geographic Society. 1990.

*A Guide to the Birds of Mexico and Northern Central America* by Steve Howell and Sophie Webb. 1995 by Oxford Press

*Annotated checklist of the Birds of Belize* by H. Lee Jones and A. C. Vallely, Lynx Edicions, 2001

*A Guide to the Birds of Belize* by H. Lee Jones, à paraître chez Christopher Helm

**Autres ouvrages sur le Belize et Yucatan (Mexique) :**

*Belize* (en anglais), de Lonely Planet. 2002.

*Mexique : le sud*, de Lonely Planet. 2001.

**Principaux sites visités / conditions d'accès et d'hébergement / principaux intérêts****Célestùn (Yucatan, Mex.) (C)**

**Rapide descriptif** : Village yucatèque de pêcheurs ; plage et estuaire, en partie en réserve pour son importante attractivité auprès des oiseaux d'eau (colonies de grands échassiers, flamants, etc.) ; mangroves, mines de sels... Possibilité d'excursion en bateau pour accéder dans l'estuaire (et notamment pour voir les flamants roses).

**Conditions d'accès** : Il est aisé de rejoindre Celestún depuis Mérida par la compagnie Autobuses de Occidente qui offre un service continu. Le bus dépose les voyageurs soit sur la place centrale à deux rues de la plage, soit à l'entrée de la réserve.

**Hébergement** : Hôtel San Julio Tél : (011) 52/988/916-20-62 Calle 12 Celestún, Yucatán

### **Chichen Itza (Yucatan, Mex.) (CI)**

**Rapide descriptif** : site archéologique, ancien centre cérémoniel de 300 hectares, dominé par la pyramide de Kukulcan (certainement le site maya du Mexique le mieux conservé).

**Conditions d'accès** : à 120 km de Merida, sur la route de Cancun (accès facile en bus).

**Hébergement** : dans le village à proximité

**Quelques conseils** : s'y rendre impérativement le matin, dès l'ouverture du site, pour éviter la foule de touristes (Ce site étant le seul que les Américains visitent lors de leur séjour à Cancun, de nombreux cars déversent les touristes en début d'après-midi...)

### **Shipstern Nature Reserve (Corozal District, Bel.) et environs (S)**

#### **Rapide descriptif** :

Réserve naturelle de 9000 ha, appartenant à l'International Tropical Conservation Foundation, basée en Suisse, et gérée par le Belize Audubon Society. Différents milieux se rencontrent dans cette réserve : forêt sèche (assez jeune, suite au passage de l'ouragan Janet), lagunes salées, savanes, mangroves...

#### **Conditions d'accès** :

Prendre un bus reliant Orange Walk à Sarteneja (64 km au nord-est d'Orange Walk, piste carrossable, durée : 1h30 aller) et se faire déposer à l'entrée de la réserve (5 km au sud de Sarteneja). Ce bus part de la Zeta factory à Orange Walk (voir Orange Walk, ci-dessous). Un bateau à liaison quotidienne reliant Corozal à Ambergris Caye s'arrête sur demande à Sarteneja.


Sur place, possibilités de visite.

#### **Hébergement** :

On peut loger à Sarteneja chez Fernando, hôtel très bien tenu et relativement bon marché. Personnellement, nous étions invités par J.Laesser, et dormions au QG de la réserve, qui n'offre normalement pas de possibilités d'hébergement...

#### **Quelques conseils** :

Ne pas oublier d'emporter lotions anti-moustiques efficaces et moustiquaire !



**Principaux sites**  
(carte ci-dessus)

**d'observation de la réserve**  
provenant du site

[www.belizeexplorer.com](http://www.belizeexplorer.com)) :

- QG (Quartier général, Headquarters, campement de base, entrée de la réserve)
- Robinsland (RL)
- Thompson Trail (TT)
- Survey Line
- Xo-Pol
- Main Trail
- Shipstern (terrains au sud du lagon de Shipstern)

**Principaux sites d'observation à proximité de la réserve :** (...)

- Little Belize
- Fresh Water Creek
- Chunox (village)

## **Orange Walk (Orange Walk District, Bel.) (OW)**

### ***Rapide descriptif :***

Petite ville du nord du Belize (94 km au nord de Belize City) ; région occupée essentiellement par des agriculteurs (notamment des communautés de mennonites). L'intérêt naturaliste est moindre ; des observations ont été réalisées le long de la rivière New River (depuis Riverside Street), en attendant une correspondance (bus) pour la réserve de Shipstern...

remarque : une très bonne fabrique de glaces artisanales est à recommander au nord de Main Street (la Zeta factory).

### ***Conditions d'accès :***

Bus réguliers depuis Belize City et Corozal notamment...

## **Crooked Tree Wildlife Sanctuary (Belize District, Bel.) (CT)**

### ***Rapide descriptif :***

Zone humide présentant un grand intérêt pour les oiseaux d'eau (migrateurs et nicheurs), notamment au cours de la saison sèche (de Décembre à Mai). Le Jaribu est une des espèces emblématiques de ce site. Les meilleurs endroits ne sont toutefois accessibles qu'en bateau (visite guidée payante, voir ci-dessous). Bon site pour les oiseaux de savanes également.

### ***Conditions d'accès :***

Partir le matin, en bus, de Corozal, Belize City ou Orange walk, et s'arrêter à Crooked Tree Junction. De là, regagner le village (Crooked tree) à pied (1h). L'hébergement est possible au village. Des excursions en bateau sont organisées (70\$US pour 1-4 personnes ; à priori moins cher pour de plus grands groupes...), mais nous nous sommes contentés d'une petite marche autour du village et à l'est du lagon.

## **Caye Caulker (Belize District, Bel.) (CC)**

### ***Rapide descriptif :***

Petite île sur la barrière de corail, à 24 km au NE de Belize City ; appréciée des touristes recherchant des conditions de séjour alliant qualité et bon marché. Les principaux intérêts résident dans la découverte de la splendide faune des récifs coralliens (langoustes, murènes, raies, requins, poissons multicolores, etc.) et la recherche des lamantins... L'île se prête également à l'observation de l'avifaune, notamment de quelques limicoles de passage, entre autre dans le secteur de l'aérodrome (si possible, ne pas y pénétrer...). Autres spécialités : Moqueur noir, Viréo du Yucatan, Pigeon à couronne blanche, Râle à cou roux, Elenie siffleuse, ssp antillaise du Sucrier, etc.

### ***Conditions d'accès :***

Par bateau, du Belize City's Marine Terminal, AR réguliers (13\$US) entre Belize City et Caye Caulker (traversée de 45 minutes environ).

### ***Hébergement :***

Nous avons trouvé un logement tout à fait correct et bon marché au sud du cimetière (dernières petites maisons sur pilotis en bord de mer ; on ne se souvient plus du nom...).

### **Restauration :**

-Caye Cauker Bakery : excellente boulangerie au centre, dans une rue un peu en retrait, parallèle à la rue principale qui suit le front de mer.

-Happy Lobster : restaurant de fruits de mer servant notamment des crevettes et de la langouste, pêchée non loin de là, ... et pourtant plus chère qu'on aurait pu l'espérer... (dans la rue principale).

-Rasta Pasta : servant de très bons burritos (« huge burritos »), dans la rue principale.

-I & I bar : un bar très sympa et original, dans une tourelle aérée de 3 étages, proche du cimetière.

### **Quelques conseils et informations diverses :**

-Les excursions d'une journée alliant snorkeling sur la barrière de corail (masque et tuba) et observations des lamantins sont tout à fait valables (autour de 30\$US). Nous avons notamment apprécié celle incluant Goff's Caye dans le parcours, ainsi que la demi-journée sur la barrière de corail proche (lamantins, snorkeling avec les raies et les requins nourrices, murène, langouste, une multitude de poissons multicolores, etc.).

-La pointe nord de l'île, « The Split », présente une zone propice au snorkeling et au farniente, juste à deux pas du bar « The lazy Iguana », servant entre autres des rafraîchissements.

## **Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary (Stann Creek District, Bel.) (CB)**

### **Rapide descriptif :**

Réserve de 39000 ha d'une très belle forêt tropicale vallonnée. Très belle diversité d'espèces végétales et animales ; rivières et chutes ; site notamment réputé pour ses belles densités de jaguars (traces assez facilement visibles à défaut de voir l'animal).

### **Conditions d'accès :**

Nous avons pris un bus de Dangriga pour Maya Center (sur la Southern Hwy). De là, il est possible de prendre un taxi (pick-up) pour emprunter les 10 km de piste dans la jungle amenant à l'entrée de la réserve (Visitor's center) (environ 25\$US AR/taxi).

### **Hébergement :**

Nous étions partis avec nos propres tentes, en camping (au Campground de la réserve) (environ 3\$US la nuit). Un local était à disposition pour cuisiner (matériel sur place).

Autres possibilités :

### **Quelques conseils :**

Penser à prendre sa propre nourriture au préalable, lotions anti-moustiques et éventuellement des pastilles pour rendre l'eau potable (à défaut de faire bouillir l'eau ; bouteilles d'eau en vente et réserves d'eau de pluie...). Différents sentiers sillonnent les abords du campement ; le plus long d'entre eux (7 km), l'antelope Loop (via Gibnut Loop et Wari Loop) est particulièrement recommandable car il permet de traverser différents types de milieux (et donc de rencontrer une bonne diversité d'espèces). Observer le matin et le soir de préférence (comme partout d'ailleurs)...

## **Lamanäi (Orange Walk District, Bel.) (L)**

**Rapide descriptif :** Réserve archéologique (ruines, temples) dont l'accès se fait en bateau (3 h AR), en remontant la rivière New River. L'intérêt naturaliste est surtout concentré sur le trajet en bateau (recherche de crocodiles et d'oiseaux de la forêt riveraine). Sur le site archéologique (visite guidée), possibilité de bien observer des singes hurleurs...

**Conditions d'accès :** nous avons suivi une visite guidée de la compagnie Jungle River Tours, au départ d'Orange Walk ( ; 20 Lovers' Lane, Orange Walk (près de Central Park)). Tarif : 40 \$US pour la journée (9h-16h), incluant le repas de midi, la balade en bateau et la visite des ruines. Réservation très recommandée.

## **Tulùm (Quintana Roo, Mex.)**

**Rapide descriptif** : rare site maya construit au bord de la mer ; superbe côte rocheuse, sable blanc et mer turquoise... Ce site possède des ruines peu spectaculaires mais il est cerné de murailles et juché sur une falaise de 12 m qui surplombe la mer des Caraïbes.

**Conditions d'accès** : Situé à 1h30 en bus, au sud de Playa del Carmen (5h de bus depuis Chetumal, à la frontière du Belize). Le bord de mer se trouve environ à 4/5 km du village principal. Pour s'y rendre, il faut prendre un taxi mais il est possible qu'il y ait une navette de temps en temps...

**Hébergement** : Pour le logement soit sur la partie gauche de la plage (plutôt sommaire mais sympa ; nous y avons campé en arrière de la plage) soit à la droite avec des guesthouse plus confortables (les cabanas don Armando)

**Quelques conseils** : visiter les ruines et le bord de mer avant 10h ou après 16h pour échapper à la foule...

## **Espèces d'oiseaux rencontrées (liste détaillée et commentée)**

Au total, 255 espèces d'oiseaux ont été contactées durant le séjour.

Remarques : Sont marquées d'un astérisque\*, les 8 espèces uniquement entendues.

### **Ordre systématique suivi et noms scientifiques, anglais et français :**

Ordre systématique suivi : celui suivi par R.T.Peterson & E.L.Chalif dans *Mexican Birds*, 1973, Peterson Field Guides (suivant généralement l'ordre systématique de E.Eisenmann dans *The species of Middle American Birds*, Linnaean Society of New York, Vol.7)

Noms français : d'après *Noms français des oiseaux du Monde* par la Commission internationale des noms français des oiseaux (CINFO) ; Éd. MultiMondes Inc., Sainte-Foy, Québec & Éd. Chabaud, Bayonne, France, 1993, 1<sup>re</sup> édition.

Noms anglais : d'après *Distribution and Taxonomy of Birds of the World* par C. G. SIBLEY & B. L. MONROE Yale University Press, New Haven and London, 1990.

**Nom vernaculaire anglais, français** *Nom scientifique* : initiales des lieux d'observation (cf ci-dessus)

## Tinamidae

### **Great Tinamou, Grand Tinamou** *Tinamus major* : S-CB

Entendu les 3 et 4/08 ; 3 ind. bien observés (dont un couple cherchant sa nourriture sur un chemin) le 4/08 dans la forêt à Cockscomb ; 1 ind. entendu le 10/08 en soirée dans la forêt à Shipstern.

### **Little Tinamou, Tinamou soui** *Crypturellus soui* : CB

Entendu les 3, 4 et 5/08 et 1 ind. observé les 3 et 5 (YC, VP) dans la forêt à Cockscomb.

### **\*Thicket Tinamou, Tinamou cannelle** *Crypturellus cinnamomeus* : S

Entendu à plusieurs reprises à proximité du QG à Shipstern (le 20/07, par ex.) ; 1 entendu le 24/07 à Fresh Water Creek; qq-uns entendus les 26 et 27/07 à Xo-Pol ; 1 ind. entendu le 9/08 dans la forêt à Shipstern.

## Podicipedidae

### **Least Grebe, Grèbe minime** *Tachybaptus dominicus* : S

Trois adultes les 26 et 27/07 sur un petit étang au milieu de la forêt à Xo-Pol.

## Pelecanidae

### **Brown Pelican, Pélican brun** *Pelecanus occidentalis* : C-S-CT-CC-D-T

Régulièrement rencontré sur les côtes : qq. centaines les 17 et 18/07 à Célestùn (Mex.); qq. ind. notés à chaque sortie (max. d'une dizaine le 8/08) sur le lagon de Chetumal depuis Robin's land à Shipstern; 3 ind. en vol le 25/07 à Crooked Tree; pls le 29/07 à Belize City; qq-uns les 29, 30 et 31/07 à Caye Caulker (max. d'une vingtaine d'ind.); pls le 3/08 à Dangriga; et qq-uns les 16, 17 et 18/08 à Tulùm (Mex.).

## Sulidae

### **Red-footed Bobby, Fou à pieds rouges** *Sula sula* : T

Un juvénile, observé à plusieurs reprises, en vol puis posé en mer non loin de la côte le 17/08 à Tulùm (Mex.).

## Phalacrocoracidae

### **Double-crested Cormorant, Cormoran à aigrettes** *Phalacrocorax auritus* : C-S-CC-D-T

Rencontré fréquemment sur les côtes : qq. centaines les 17 et qq. dizaines le 18/07 à Célestùn (Mex.); qq. ind. notés à chaque sortie (max. d'une dizaine le 8/08) sur le lagon de Chetumal depuis Robin's land à Shipstern; pls les 29, 30 et 31/07 à Caye Caulker; pls le 3/08 à Dangriga; et, enfin, 2 ind. le 18/08 en vol au-dessus de la mer à Tulùm (Mex.).

### **Neotropic Cormorant, Cormoran vigua** *Phalacrocorax olivaceus (brasilianus)* : C-S-OW-CT-L

Moins côtier que l'espèce précédente, ce cormoran affectionne les zones humides de l'intérieur : qq-uns (dont juv.) le 17/07 à Célestun (Mex.); qq. imm. (max. d'une vingtaine le 6/08) observés à chaque fois sur New River à Orange Walk; pls centaines le 25/07 à Crooked Tree; 1 le 28/07 lagon de Shipstern; 1 les 8, 13 et 15/08 mangrove du Robin's land à Shipstern, assez nbx ind. le 14/08 sur New River entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

## Anhingidae

### **Anhinga, Anhinga d'Amérique** *Anhinga anhinga* : CT-OW

1 ind. se séchant les ailes en bordure d'un petit étang, au niveau du croisement pour Progresso les 23 (VP) et 24/07; 2 ind. en vol le 25/07 à Crooked Tree et 1 m. le 14/08, posé en bordure de New River, entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

## Fregatidae

### **Magnificent Frigatebird, Frégate superbe** *Fregata magnificens* : C-S-CC-D-T

Régulièrement rencontrée sur les côtes (parfois un peu dans les terres) : qq. centaines les 17 et 18/07 à Célestùn (Mex.); 1 sur le lagon le 20/07 à Sarteneja; une dizaine notée à chaque sortie, en vol au-dessus du lagon de Chetumal depuis Robin's land à Shipstern; pls le 29/07 à Bélize City; notée les 29, 30 et 31/07 à Caye Caulker (max. d'une soixantaine le 29); pls le 3/08 à Dangriga; une survole le QG le 7/08; et qq-unes les 16, 17 et 18/08 à Tulùm (Mex.).

## Ardeidae

### **Reddish Egret, Aigrette roussâtre** *Egretta rufescens* : S

Contactée uniquement à Shipstern : 1 ad. (forme rousse) les 27/07 et 13/08 mangrove du Robin's land à Shipstern, 4 ind. le 28/07 au lagon de Shipstern; et 1 ind. le 9/08 en vol au-dessus du lagon de Shipstern landing.

### **Tricolored Heron, Aigrette tricolore** *Egretta tricolor* : S-CC

Assez peu notée : une dizaine le 17/07 à Célestùn (Mex.); 2 en vol le 21, 1 ad. les 23, 28/07 et 7/08 et 3 ad. le 13/08 mangrove du Robin's land à Shipstern; une (en vol) le 29 et 2-3 ind. le 30/07 à Caye Caulker.

### **Little Blue Heron, Aigrette bleue** *Egretta caerulea* : C-S-CT-CC-D

Rencontrée assez régulièrement, en petit nombre : 3 (1 ad. et 2 imm.) le 17/07 à Célestùn (Mex.); 2 imm. le 24/07 Fresh Water Creek; 1 ad. en vol le 25/07 à Crooked Tree; 1 imm. le 25/07 dans un marais à Little Bélize; 2 imm. le 26/07 dans une savane inondée à Xo-Pol; 1 ad. les 27/07, 8 et 13/08 mangrove du Robin's land; 1 imm. le 28/07 lagon de Shipstern; 1 ad. le 29, qq-unes le 30 et 1 imm. le 31/07 à Caye Caulker; 1 imm. le 3/08 sur la plage à Dangriga.

### **Snowy Egret, Aigrette neigeuse** *Egretta thula* : C-S-CT-CC-OW

Notée çà et là, mais jamais en grand nombre : pls le 17/07 à Célestùn (Mex.); 1 ind. les 23, 27 et 28/07, 4 ind. les 8 et 13/08 mangrove du Robin's land à Shipstern; 2 le 25/07 à Crooked Tree; une le

25/07 dans un marais à Little Belize; qq-unes le 30/07 à Caye Caulker, qq-unes en bordure de route le 2/08 entre Belize City et Belmopan; 2 les 6 et 14/08 en bordure de New River à Orange Walk; et qq-unes le 9/08 lagon de Shipstern.

**Great Blue Heron, Grand Héron** *Ardea herodias* : C-S-D

Qq. obs. : 2 le 17/07 à Célestun (Mex.); 1 juv. le 3/08 sur la plage à Dangriga et 1 ind. en vol le 9/08 au-dessus du lagon de Shipstern.

**Great Egret, Grande Aigrette** *Casmerodius alba* : C-S-CT-CC-L

Notée çà et là, mais jamais en grand nombre : qq. dizaines le 17/07 à Célestun (Mex.); qq-unes notées à chaque sortie dans la mangrove du Robin's land à Shipstern; 1 le 22/07 lagon du Thompson Trail; 1 le 24/07 Little Belize; qq-unes le 25/07 à Crooked Tree; qq-unes les 30 et 31/07 à Caye Caulker; qq-unes en bordure de route les 2 et 5/08 entre Belize City et Belmopan; qq-unes les 9 et 12/08 lagon de Shipstern; et 2 le 14/08 sur New River entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

**Cattle Egret, Héron gardeboeuf** *Bubulcus ibis* : LB-CT-OW

Rencontré régulièrement dans les cultures ou en compagnie du bétail dans les environs de Chunox et de Little Belize. A part çà, à noter : qq. ind. le 17/07 à Célestun (Mex.); qq-uns les 20/07 et 14/08 en vol à Orange Walk et qq-uns en vol le 25/07 à Crooked Tree.

**Green Heron, Héron vert** *Butorides virescens* : C-S-OW-CT-CC-L

Noté en petit nombre, ce héron fréquente les mangroves et les abords des rivières : qq. ad. le 17/07 à Célestun (Mex.); 2 ad. le 20 et 1 le 22/07, 5 (dt 1 juv.) le 6/08 en bordure de New River à Orange Walk; qq. ind. (max. de 2 ad. + 1 juv., fin-07) notés à chaque sortie dans la mangrove du Robin's land à Shipstern; qq-uns en vol le 25/07 à Crooked Tree; 2-3 les 30 et 31/07 à Caye Caulker; 1 le 1/08 sur Swallow Caye et 3 ind. le 14/08 sur New River entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

**Yellow-crowned Night-Heron, Bihoreau violacé** *Nycticorax violaceus* : C-CC-D-T

Qq. observations côtières : 3 ad. le 17/07 à Célestun (Mex.), 1 ad. le 29/07 à Caye Caulker, 1 imm. de nuit le 2 et 1 ad. le 3/08 au matin sur la plage à Dangriga, 1 ad. et 1 juv. le 18/08 au matin sur la plage à Tulum (Mex.).

**Bare-throated Tiger-Heron, Onoré du Mexique** *Tigrisoma mexicanum* : S-C-L

1 imm. le 21/07 décollant en criant de la mangrove du Robin's land à Shipstern (YC, JB); 1 ad. et 1 juv. bien observés le 4/08 posés dans des arbres en bordure d'une rivière dans la forêt à Cockscomb; 1 le 10/08 dans une savane humide à Shipstern; et 1 ad. le 14/08 posé en bordure de New River entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

**Least Bittern, Petit Blongios** *Ixobrychus exilis* : LB

Un seul contact : 2 m. assez bien observés le 25/07 dans un marais à Little Belize.

## Ciconiidae

**Wood Stork, Tantale d'Amérique** *Mycteria americana* : C-S-L

Peu noté : 1 ad. le 17/07 à Célestun (Mex.); 1 ind. survole le QG le 23/07 (YC, JB) ; et 1 ind. en vol le 14/08 au-dessus de New River entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

**Jabiru, Jabiru d'Amérique** *Jabiru mycteria* : vers CT

Un individu en vol le 22/07, observé depuis la route entre Orange Walk et Belize City (VP).

## Threskiornithidae

**White Ibis, Ibis blanc** *Eudocimus albus* : C-S-OW-CC-T

Assez commun : une trentaine (ad. et juv.) le 17/07 à Célestun (Mex.) ; 5 en vol les 20 et 22/07 à Orange Walk; qq-uns régulièrement observés dans la mangrove du Robin's land à Shipstern ; 5 le 22 et 3 le 28/07 lagon de Shipstern; qq-uns le 24/07 à Fresh Water Creek; qq-uns le 30/07 sur Caye Caulker; qq-uns (jusqu'à 5 ind.) les 9, 10 et 12/08 lagon de Shipstern; et, pour finir, 14 ind. (13 + 1) en migration le 17/08 longeant la côte à Tulum (Mex.).

**Glossy Ibis, Ibis falcinelle** *Plegadis falcinellus* : LB

Un adulte internuptial les 24 et 25/07 dans un marais à Little Belize (rare pour le Belize).

**Roseate Spoonbill, Spatule rosée** *Platalea ajaja* : C-S-CT

Qq. observations : 1 ad. le 17/07 à Célestun (Mex.) ; 3 ind. le 22/07 observés depuis la route entre Orange Walk et Belize City (VP) ; 1 ad. dans un arbre le 25/07 à Crooked Tree ; et 1 ad. survole la mangrove du Robin's land le 13/08 en soirée à Shipstern.

## Anatidae

### **Black-bellied Tree-Duck, Dendrocygne à ventre noir** *Dendrocygna autumnalis* : S-CT-LB

Une dizaine d'ind. (en vol ou posés dans des arbres) le 25/07 à Crooked Tree; 4 le 25/07 en vol au-dessus d'un marais à Little Belize; 2 ad. le 27/07 survolant un petit étang au milieu de la forêt à Xo-Pol; 1 en vol le 6/08 au-dessus des cultures à Chunox.

## Cathartidae

### **Black Vulture, Urubu noir** *Coragyps atratus* : C-CI-S-OW-CB-T

Le plus commun des trois urubus, noté souvent en nombre (jusqu'à qq. centaines d'ind. regroupés) dans les mêmes milieux que l'Urubu à tête rouge (abords des routes, savanes, bordures des zones humides...). L'espèce s'accommode très bien de la présence humaine et se laisse facilement approcher. Ainsi, on la retrouve dans les villages et même dans les villes (par ex. : 2 ind. le 17/07 sur le toit d'une église à Mérida (Mex.)). Contacté notamment à Cancùn (Mex.), Célestùn (Mex.), Chichen Itza (Mex.), Orange Walk, Shipstern (TT et Shipstern landing), Chunox, Cockscomb, Tulùm (Mex.)...

### **Turkey Vulture, Urubu à tête rouge** *Cathartes aura* : C-S-OW-CT-D-CB-T

Commun, noté un peu partout en compagnie d'urubus noirs et souvent en groupes en bordure de route, en savane et à proximité des forêts et des zones humides : contacté par ex., au Mexique à Célestùn et à Tulùm; présent à Shipstern (RL, TT, Shipstern landing et Xo-Pol) ; noté aussi à Chunox, Orange Walk, Crooked Tree, Dangriga, et Cockscomb.

### **Lesser Yellow-headed Vulture, Urubu à tête jaune** *Cathartes burrovianus* : S-LB-CT

Moins commun que les deux autres, cet urubu a été contacté en petit nombre, souvent à proximité de zones humides : 1 ad. le 24/07 posé sur une carcasse sur la route entre Little Belize et San Estevan (il sera revu le lendemain au même endroit) ; 3 ad. le 25/07 à Crooked Tree ; 1 ad. en vol le 28/07 lagon du Thompson Trail à Shipstern; et 2 ind. (1 ad. et 1 imm.) le 10/08 en vol avec des urubus à tête rouge, au-dessus d'une savane humide à Shipstern.

### **King Vulture, Sarcoramphus roi** *Sarcoramphus papa* : CB

Un seul contact le 5/08 à Cockscomb avec 6 ind. (4 ad., 1 imm. et 1 juv.) : un ad. posé dans un arbre sec au bord de la rivière, 1 ad. + 1 imm. posé dans un arbre avec des Urubus noirs puis en vol au niveau du campement et 2 ad. + 1 juv. en vol parmi une cinquantaine d'urubus au-dessus de la forêt au niveau de Maya Centre (belles obs.).

## Pandionidae

### **Osprey, Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus* : S-CT-CC-D-T

Qq. observations (côtières notamment) : 2-3 ad. le 25/07 à Crooked Tree; 1 ad. en vol le 28/07 lagon de Shipstern; 2 ad. (ssp « ridgwayi ») bien observés le 29, 1 ad. dans un cocotier les 30 et 31/07 et 2 en mer le 1/08 à Caye Caulker; 1 ad. le 3/08 posé sur un ponton à Dangriga; 1 les 16 et 17/08 en vol au-dessus de la plage à Tulùm (Mex.).

## Accipitridae

### **Gray-headed Kite, Milan de Cayenne** *Leptodon cayanensis* : S

Un juvénile (forme sombre) bien observé à 2 reprises le 11/08 dans des arbres en bordure d'un sentier (noté avec un lézard dans les serres) dans la forêt à Shipstern (également entendu au même endroit le lendemain).

### **Swallow-tailed Kite, Milan à queue fourchue** *Elanoides forficatus* : S-CB

Deux contacts : 3 ind. en vol le 24/07 Fresh Water Creek et 1 ind. en vol à haute altitude le 3/08 au-dessus du campement à Cockscomb.

### **White-tailed Kite, Elanion à queue blanche** *Elanus leucurus* : S-OW-LB

Rencontré en savane, dans les zones cultivées et à proximité des agglomérations : 1 ad. en vol les 20/07 et 14/08 à Orange Walk; 1 ad. en chasse les 21 et 22, 1 cple le 28/07 savane du Thompson Trail à Shipstern ; 1 ad. le 25/07 cerclant au-dessus des cultures à Little Belize ; et 1 ad. en chasse les 2 et 5/08 au-dessus de la ville à Belize City.

### **Snail Kite, Milan des marais** *Rostrhamus sociabilis* : CT-L

Qq. contacts : 1 ind. le 25/07 en vol au-dessus des marais de Crooked Tree ; 1 en vol en bordure de route le 2/08 entre Belize City et Belmopan ; et min. de 6 ind. (f. et juv.) assez bien observés en vol ou posés le 14/08 entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau sur New River).

**Double-toothed Kite, Milan bidenté** *Harpagus bidentatus* : S

Une seule observation : 1 ad. observé le 12/08 dans la forêt à Shipstern landing (VP). A noter, 2 probables ind. le 27/07 en vol au-dessus de la forêt à Xo-Pol.

**Common Black Hawk, Buse noire** *Buteogallus anthracinus* : vers CT

Un individu observé en vol le 22/07 depuis la route entre Orange Walk et Belize City (VP).

**Great Black Hawk, Buse urubu** *Buteogallus urubitinga* : S-CT-L

Notée à 3 reprises, toujours à proximité de zones humides : 1 ind. le 21/07 en vol au-dessus de la mangrove du Robin's land à Shipstern; 1 ind. en vol le 25/07 à Crooked Tree et 1 ind. en vol battu le 14/08 au-dessus de New River entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau). A noter, enfin, l'observation d'une buse « noire » non identifiée (*B. anthracinus* ou *B. urubitinga*) le 27/07 en vol au-dessus de la forêt à Xo-Pol.

**Black-collared Hawk, Buse à tête blanche** *Busarellus nigricollis* : OW-CT

Deux contacts : 1 ad. assez bien observé en vol le 20/07 au-dessus de New River à Orange Walk et 1 ind. en vol le 25/07 à Crooked Tree (VP).

**Roadside Hawk, Buse à gros bec** *Buteo magnirostris* : S-CT

Assez commune en bordure des routes (notamment à Shipstern, où on la rencontre parfois en savane) : 1 ad. le 20/07 en bord de route à Chetumal (Mex.) ; notée quotidiennement sur les fils électriques bordant la piste à Shipstern (par ex., 2-3 ind. le 27/07 et 1 ad. + 1 juv. le 7/08) ; 5 ind. le 24/07 en bordure de route sur la portion entre le QG et Chunox; 1 ad. en savane le 23/07 sur le TT; 1 ad. le 24/07 Fresh Water Creek; pls (dont des juv. bien observés dans une pinède) le 25/07 à Crooked Tree; et, enfin, 1 ad. le 10/08 dans une savane à Shipstern.

**Gray Hawk, Buse grise** *Buteo nitidus* : CB

Un adulte en vol le 5/08 au-dessus de la forêt et des habitations à Cockscomb, au niveau de Maya Centre.

**Short-tailed Hawk, Buse à queue courte** *Buteo brachyurus* : S-CT-CB

Assez peu notée : 1-2 ind. (forme claire) en vol le 25/07 à Crooked Tree, 1 ind. (forme claire) en vol le 28/07 savane du Thompson Trail à Shipstern, 1 ind. (forme sombre) le 3 et 1 ind. (forme claire) le 5/08 en vol au-dessus de la forêt à Cockscomb.

**White-tailed Hawk, Buse à queue blanche** *Buteo albicaudatus* : L

Un adulte en vol le 14/08, cerclant au-dessus de New River entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

**Ornate Hawk-Eagle, Spizaète orné** *Spizaetus ornatus* : S-L

Deux contacts : 1 ad. observé le 26/07, en soirée, à Xo-Pol. L'oiseau se tenait perché dans un arbre en bordure de la piste, avec une proie (mammifère) dans les serres, et était houspillé par qq. Geais enfumés ; 1 ad. en vol battu le 14/08 au-dessus de New River entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

**Collared Forest-Falcon, Carnifex à collier** *Micrastur semitorquatus* : S

1 ind. entendu le 26/07, en soirée, depuis la piste à Xo-Pol ; entendu les 11 et 12/08 dans la forêt à Shipstern: 2 ind. (1 ad. et 1 juv.) bien observés le 11/08 (JB).

## Falconidae

**Laughing Falcon, Macagua rieur** *Herpetotheres cachinnans* : S-CT-CB

Qq. observations : 1 ind. entendu le 21 et 1 ad. observé à deux reprises le 23/07 en bordure du chemin du Robin's land à Shipstern ; 1 ind. le 23/07 observé depuis la piste entre Orange Walk et Shipstern (VP) ; 1 posé dans un arbre en bordure de route le 25/07 à Crooked Tree et 1 ad. posé dans un arbre à proximité des habitations le 3/08 à Cockscomb (Maya Center).

**Bat Falcon, Faucon des chauves-souris** *Falco ruficularis* : CB-L

Deux contacts : 1 ad. observé posé le 5/08 à Cockscomb (VP, YC) et 2 ad. en chasse le 14/08 au-dessus de la forêt et des ruines à Lamanai.

## Cracidae

**Plain Chachalaca, Ortalide chacamel** *Ortalis vetula* : S-CB

Commun à Shipstern (QG, RL et bord de piste), vivant en petit groupes, assez bruyant (notamment le matin). Citons, entre autres, 4 le 20/07 et 5 le 15/08 au RL, une vingtaine le 24/07 portion de route entre le QG et Chunox, 6 le 8/08 en bordure de piste et qq-uns les 9, 10 et 11/08 à Shipstern. Notons, enfin, qq. ind. les 3 et 4/08 à Cockscomb; et qq-uns le 6/08 à Chunox.

**Crested Guan, Pénélope panachée** *Penelope purpurascens* : CB

Notée uniquement dans la forêt à Cockscomb, avec 4 ind. bien observés dans les arbres du campement le 3 en soirée et 6 ind. les 4 et 5/08 (toujours dans des arbres).

**Great Curassow, Grand Hocco** *Crax rubra* : S

1 ind. observé brièvement le 22/07 et 2 ind. (dont une f.) le 15/08 dans le sous-bois depuis le Thompson Trail (YC, JB) ; 3 ind. (1 m. et 2 f.) bien observés le 11/08 au matin sur le chemin d'accès à Shipstern (JB).

## Aramidae

**Limpkin, Courlan brun** *Aramus guarauna* : OW-L

Deux observations : 1 ind. posé dans des marais en bordure de route le 5/08 entre Bélize City et Orange Walk (YC, JB) ; 1 ind. décollant d'un arbre en bordure de New River le 14/08 entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

## Rallidae

**\*Ruddy Crake, Rôle roux** *Laterallus ruber* : S-LB

Uniquement entendu : pls chts le 25/07 dans un marais à Little Belize ; 3 chts le 13/08 en soirée dans la mangrove du Robin's land à Shipstern.

**Clapper Rail, Rôle gris** *Rallus longirostris* : CC

Un contact : 4-5 ind. (2 ad. et 2-3 jeunes) le 30/07 dans une zone humide bordant la piste de l'aérodrome de Caye Caulker.

**Gray-necked Wood-Rail, Rôle de Cayenne** *Aramides cajanea* : S-L

Qq. obs. : 1 ad. le 20/07 en bordure de la piste menant à Shipstern (YC) ; 1 ad. le 22/07 dans le sous-bois depuis le Thompson Trail; 4 ind. (dont 2 ad. accompagnés d'un jeune, bien observés) en bordure de New River le 14/08 entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

**Purple Gallinule, Talève violacée** *Porphyrio martinicus* : OW

Deux juvéniles les 22/07 et 6/08 dans la végétation au bord de New River à Orange Walk.

## Jacanidae

**Northern Jacana, Jacana du Mexique** *Jacana spinosa* : OW-CT-LB

Sur New River : 2 ad. le 20, 1 ad. le 22/07, 3 (2 ad. + 1 juv.) le 6/08 à Orange Walk et une vingtaine (ad. surtout) le 14/08 trajet en bateau entre Orange Walk et Lamanai. A part cela : nbx ind. (ad. et juv.) le 25/07 à Crooked Tree et qq-uns (dont un jeune) le 25/07 à Little Bélize (marais et prés inondés).

## Haematopodidae

**American Oystercatcher, Huïtrier-pie d'Amérique** *Haematopus palliatus* : C

Une dizaine d'individus le 18/07, en vol au-dessus de la mer à Célestun (Mex.).

## Charadriidae

**Semipalmated Plover, Gravelot semipalmé** *Charadrius semipalmatus* : CC

Une seule obs. : 2 ad. interuptiaux le 30/07 dans une zone humide bordant la piste de l'aérodrome de Caye Caulker.

**Wilson's Plover, Gravelot de Wilson** *Charadrius wilsonia* : C-S-CC

Observations régulières de qq. ind. en bordure du lagon à Robin's land, Shipstern, avec, entre autres, 7 ind. le 23/07, 4 ind. le 7, 5 le 8, et 3 le 15/08. Sinon, 4 ind. le 17/07 à Célestùn (Mex.) et 1 ad. le 30/07 Caye Caulker.

## Scolopacidae

### **Whimbrel, Courlis corlieu** *Numenius phaeopus* : D

Deux individus en vol le 3/08 à Dangriga.

### **Lesser Yellowlegs, Chevalier à pattes jaunes** *Tringa flavipes* : CC

Une observation : 1 ad. le 30/07 dans une zone humide bordant la piste de l'aérodrome de Caye Caulker. A noter, deux observations de chevaliers sp. (*T. flavipes* ou *T. melanoleuca*), en vol, ont été réalisées au niveau de la mangrove du Robin's land à Shipstern : 1 ind. le 7/08 (*T. melanoleuca* probable) et 1 ind. le 15/08 (plutôt un *T. flavipes*).

### **Solitary Sandpiper, Chevalier solitaire** *Tringa solitaria* : S

Un individu en vol le 13/08 au-dessus de la mangrove du Robin's land à Shipstern.

### **Spotted Sandpiper, Chevalier grivelé** *Actitis macularia* : C-S-CT-CC-D-L-T

Noté assez régulièrement au niveau des zones humides : 2 ad. le 17 et 1 le 18/07 à Célestùn (Mex.); observé à chaque sortie dans la mangrove du Robin's land à Shipstern (max. de 3 ind. les 7, 8 et 13/08); 2 ad. le 25/07 à Crooked Tree; 4 ad. le 29, 1 ad. les 30 et 31/07 à Caye Caulker; 2 le 3/08 sur la plage à Dangriga; 3 ind. en bordure de New River le 14/08 entre Orange Walk et Lamanaï (trajet en bateau) et, pour finir, 1 ind. le 16/08 sur la plage à Tulùm (Mex.).

### **Willet, Chevalier semipalmé** *Catoptrophorus semipalmatus* : C-CC-D

Qq. contacts ont été réalisés, sur les côtes : 1 ind. en vol les 17 et 18/07 à Célestùn (Mex.); 1 ind. en vol le 29/07 au niveau d'une petite île voisine de Caye Caulker; 4 ad. le 30/07 (zone humide bordant la piste de l'aérodrome) et 1 ad. sur la plage les 31/07 et 1/08 (2 ad. le 2/08 au même endroit) à Caye Caulker; 2 ad. le 3/08 sur la plage à Dangriga.

### **Ruddy Turnstone, Tourne-pierre à collier** *Arenaria interpres* : CC-T

1 ind. le 2/08 sur un ponton à Caye Caulker; 5 ind. le 17 et 8 le 18/08 sur la plage à Tulùm (Mex.).

### **Short-billed Dowitcher, Bécassin à bec court** *Limnodromus griseus* : CC

Un adulte (en plumage de transition) le 30/07 dans une zone humide bordant la piste de l'aérodrome de Caye Caulker.

### **Sanderling, Bécasseau sanderling** *Calidris alba* : CC-T

1 ad. (en plumage de transition) du 30/07 au 1/08 sur la plage à Caye Caulker et 6 ind. le 17/08 sur la plage à Tulùm (Mex.).

### **Least Sandpiper, Bécasseau minuscule** *Calidris minutilla* : S-CC-D

Observations régulières de qq. ind. de cette espèce, dans la mangrove du Robin's land à Shipstern (max. de 6 ind. les 7 et 13/08, et 4 ind. les 8 et 15/08). A part ça, 1 ad. le 28/07 sur le rivage du lagon au Thompson Trail, Shipstern; 4 ad. le 30/07 à Caye Caulker et 1 ind. le 3/08 sur la plage à Dangriga.

## Recurvirostridae

### **Black-necked Stilt, Echasse d'Amérique** *Himantopus mexicanus* : S-LB-CC

5 ind. le 24 et 2 le 25/07 dans un marais à Little Bélize; 1 ad. le 29 et 5 ind. (3 ad. et 2 juv.) le 30/07 dans une zone humide bordant la piste de l'aérodrome de Caye Caulker; 1 ind. le 7 et 2-3 ind. le 13/08 en vol au-dessus de la mangrove du Robin's land à Shipstern.

## Laridae

### **Laughing Gull, Mouette atricille** *Larus atricilla* : C-CC-T

Notée çà et là, sur la côte : une quarantaine (surtout imm., qq. ad.) les 17 et 18/07 sur la plage à Célestùn (Mex.); une le 29/07 en vol à Bélize City; 3-4 ind. le 29, 4-5 le 30/07 et qq-unes le 1/08 à Caye Caulker. Notons, enfin, 2 ind. le 18/08 en vol au-dessus de la mer à Tulùm (Mex.).

### **Caspian Tern, Sterne caspienne** *Sterna caspia* : CT

Un adulte le 25/07, en vol de prospection au-dessus des marais de Crooked Tree.

### **Royal Tern, Sterne royale** *Sterna maxima* : C-S-CC-D-T

Observée à plusieurs reprises au niveau des côtes : 7 ind. le 17 et 10 le 18/07 à Célestùn (Mex.) ; 1 ind. en vol le 23/07 lagon de Chetumal à Robin's land, Shipstern; 5-6 le 30/07 et 1 le 1/08 à Caye Caulker;

10 le 3/08 sur des piquets en mer à Dangriga; 4 ind. le 13/08 sur le lagon à Sarteneja (VP, YC); 1 ind. les 16 et 18 et 2 ind. le 17/08 en vol ou posées à Tulùm (Mex.).

**Sandwich Tern, Sterne caugék** *Sterna sandvicensis* : C-S-CC-D

Qq. obs. côtières : 1 ind. le 17/07 sur une digue à Célestùn (Mex.) ; 3 le 27/07 en migration au-dessus du lagon de Chetumal à Robin's land; 2 ind. le 30/07 à Caye Caulker et 5 le 3/08 sur des piquets en mer à Dangriga.

**Common Tern, Sterne pierregarin** *Sterna hirundo* : C

Une seule obs. : 1 juv. le 17/07 posé sur une digue à Célestùn (Mex.).

**Least Tern, Petite Sterne** *Sterna antillarum* : C-CC

2 juv. en mer le 17/07 à Célestùn (Mex.); 4 ind. le 29/07 et 1 le 1/08 en vol à proximité d'une petite île près de Caye Caulker.

**Black Tern, Guifette noire** *Chlidonias niger* : CT

Quatre adultes survolant les marais, à la recherche de nourriture, le 25/07 à Crooked Tree.

## Columbidae

**White-crowned Pigeon, Pigeon à couronne blanche** *Columba leucocephala* : CC

Noté uniquement à Caye Caulker et sur qq. îles voisines : 1 ind. le 29, min. de 8 ind. en vol le 30 et 5 (dont 1 juv.) dans un arbre le 31/07 à Caye Caulker; pls ind. en vol le 1/08 sur une île voisine.

**Red-billed Pigeon, Pigeon à bec rouge** *Columba flavirostris* : CI-S-OW-CT-T

Assez commun, en milieu forestier à proximité de zones dégagées : noté à Orange Walk; Shipstern (obs. régulières : RL, TT, QG...); Chunox (une quinzaine près des cultures le 6/08); Crooked Tree et Shipstern. Notons, enfin, 2 ind. le 19/07 à Chichen Itza (Mex.) et 1 le 17/08 à Tulùm (Mex.).

**Pale-vented Pigeon, Pigeon rousset** *Columba cayennensis* : CT-LB

Qq. ind. (dont 1 cht bien observé) le 25/07 à Crooked Tree et 1 ind. noté en vol le même jour à Little Belize.

**\*Scaled Pigeon, Pigeon ramiret** *Columba speciosa* : S

1 ind. entendu le 9/08 dans la forêt à Shipstern.

**Short-billed Pigeon, Pigeon à bec noir** *Columba nigrirostris* : CB

Noté seulement à Cockscomb : 2 ind. bien observés le 3 et qq. chts entendus le 5/08 dans la forêt.

**White-winged Dove, Tourterelle à ailes blanches** *Zenaida asiatica* : T-CI-S-CC-OW

Commune dans les milieux assez ouverts (savanes, villes et villages) : notée à Célestùn (Mex.), Chichen Itza (Mex.), Tulùm (Mex.), Shipstern (savane notamment : RL, TT, Xo-Pol et Shipstern landing), Chunox; Caye Caulker (très peu farouches...), Orange Walk...

**Common Ground-Dove, Colombe à queue noire** *Columbina passerina* : C-CI-S-OW-CB...

Commune dans les villes et les villages : contactée à Célestùn (Mex.), Chichen Itza (Mex.), Shipstern (qq. obs. au QG et au RL : max. de 4 ind.), Fresh Water Creek, Orange Walk, Cockscomb (Maya Center)...

**Ruddy Ground-Dove, Colombe rousse** *Columbina talpacoti* : C-CI-OW-LB-CT-T...

Même remarque que pour l'espèce précédente : notée, par ex., à Célestùn (Mex.) (à noter, 1 nid et qq. gpes comprenant une dizaine d'individus); Chichen Itza (Mex.); Orange Walk; Chunox; Little Bélize; Crooked Tree; Tulùm (Mex.)...

**Blue Ground-Dove, Colombe bleutée** *Clavaria pretiosa* : CB-L

Entendue les 4 et 5/08 dans la forêt à Cockscomb et qq. ind. notés en vol le 14/08 au-dessus de New River entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

**White-tipped Dove, Colombe de Verreaux** *Leptotila verreauxi* : S

Qq. obs. : 1 ind. le 23 et 2 les 24 et 25/07 cherchant leur nourriture à terre au QG à Shipstern et 2 ind. probables le 10/08 sur un chemin forestier à Shipstern. La détermination des colombes du genre *Leptotila* étant délicate, seuls les oiseaux entendus ou observés de près ont pu être identifiés.

**Gray-headed Dove, Colombe à calotte grise** *Leptotila plumbeiceps* : S

Entendue le 9/08 et 1 couple noté sur le chemin les 11 et 12/08 à Shipstern landing (ce couple sera capturé dans les filets le 12 et alors formellement identifié).

**\*Caribbean Dove, Colombe de Jamaïque** *Leptotila jamaicensis* : S

Entendue régulièrement dans la forêt tropicale sèche notamment depuis le Thompson Trail à Shipstern (3 chts le 15/08) et 1 cht noté le 10/08 dans la forêt à Shipstern.

**\*Ruddy Quail-Dove, Colombe rouviolette** *Geotrygon montana* : CB

Entendue les 4 et 5/08 dans la forêt à Cockscomb.

## Psittacidae

### **Aztec Parakeet, Conure aztèque** *Aratinga astec* : S-CT-CB

Assez commun à proximité de la réserve de Shipstern : au RL (observé à chaque sortie, max. d'une vingtaine d'ind. les 21/07 et 13-15/08) ; 6 le 23/07 et 2 le 8/08 en vol au-dessus du QG ; 8 le 7/08 dans des arbres bordant la piste ; entendu le 11/08 à Shipstern et 8 en vol le 15/08 au-dessus de la savane du Thompson Trail. Notons aussi : qq. ind. le 25/07 à Crooked Tree ; un dortoir rassemblant au moins 80 ind. le 25/07 à Chunox et, enfin, 1 ind. le 4/08 à Cockscomb.

### **White-fronted Parrot, Amazone à front blanc** *Amazona albifrons* : S/OW-CB

5 ind. le 5/08 posés dans un cécropia dans la forêt à Cockscomb et au moins 1500 ind. regroupés le 6/08 en soirée aux abords des cultures à Chunox. De nombreuses Amazones sp. (appartenant probablement à cette espèce) furent régulièrement notées dans les cultures en bordure de piste entre Shipstern et Orange Walk...

Remarque : les Amazones du Yucatan *Amazona xantholora*, présentes le restant de l'année à Shipstern étaient curieusement absentes pendant le séjour.

### **Mealy Parrot, Amazone poudrée** *Amazona farinosa* : CB

Une seule obs. : 3 ind. en vol le 5/08 au-dessus de la forêt à Cockscomb (VP, YC).

## Cuculidae

### **Squirrel Cuckoo, Piaye écureuil** *Piaya cayana* : S-CT

Qq. contacts ont été réalisés : 1 ind. le 24/07 à Fresh Water Creek ; 1 ind. entendu le 25/07 à Crooked Tree ; 2 ind. le 27/07 en bordure de la piste à Xo-Pol et 1 les 27/07 et 15/08 au QG à Shipstern.

### **Groove-billed Ani, Ani à bec cannelé** *Crotophaga sulcirostris* : C-S-LB-CT-CB-D

Noté çà et là, à proximité des villages et des zones cultivées : 2 couples le 18/07 à Célestùn (Mex.) ; 1 couple régulièrement observé dans la mangrove du Robin's land à Shipstern ; 2 ind. le 24/07 à Fresh Water Creek ; une dizaine le 24/07 dans les cultures à Little Belize ; qq-uns (dt un couple nourrissant 3 jeunes au nid) le 25/07 à Crooked Tree ; qq-uns les 3 et 5/08 près des habitations à Cockscomb (Maya Center) et, enfin, qq. ind. le 5/08 près de Dangriga.

### **Striped Cuckoo, Géocoucou tacheté** *Tapera naevia* : CB-D

Deux contacts ont été réalisés le 5/08 : 1 cht dans des cécropias en bordure de rivière à Cockscomb et 1 ind. dans des cécropias en bordure de route près de Dangriga.

## Tytonidae

### **Barn Owl, Effraie des clochers** *Tyto alba* : D

Une obs. : 1 ind. noté le 2/08 (de nuit) à Dangriga.

## Strigidae

### **\*Vermiculated Screech-Owl, Petit-Duc guatémaltèque** *Otus guatemalae* : S

Entendu régulièrement de nuit depuis le QG à Shipstern.

### **Ferruginous Pygmy-Owl, Chevêchette brune** *Glaucidium brasilianum* : S

Entendue régulièrement de nuit près du QG à Shipstern. A noter 1 ad. bien observé le 22/07 au soir, criant dans les arbres du QG (YC, JB).

### **Black-and-White Owl, Chouette noire-et-blanche** *Ciccaba nigrolineata* : CB

Un adulte bien observé de nuit, le 4/08, à la lampe torche, posé dans les arbres du campement à Cockscomb (qq. bribes de chants furent entendues).

## Nyctibiidae

### **Northern Potoo, Ibijau jamaïcain** *Nyctibius jamaicensis* : S

A Shipstern, 1 ad. observé régulièrement à partir du 7/08 posé, toute la journée, immobile, sur son nid à l'extrémité d'une grosse branche cassée d'un arbre bordant la piste (un jeune était souvent visible

sous lui). Le 15/08, en soirée, nous avons assisté à l'étirement puis à l'envol de l'adulte et qq. minutes plus tard, 2 ind. étaient observés en chasse au-dessus de la piste.

## Caprimulgidae

### **Lesser nighthawk, Engoulevent minime** *Chordeiles acutipennis* : S

Noté uniquement à Shipstern : observé à chaque sortie au Robin's land (en bordure du lagon et au niveau de la mangrove), avec par ex., une vingtaine d'ind. les 21, 23 et 27/07, posés à terre et dans les arbres ou chassant en vol en soirée (rq : le nombre d'ind. notés a diminué au cours du séjour : qq-uns les 7 et 13/08 puis un seul le 15/08). Notons également, 1 ind. en chasse le 27/07 au soir au-dessus de la piste à proximité du QG. De plus, deux observations d'Engoulevent sp. *Chordeiles* sp. ont été réalisées et concernent : 2 ind. le 17/07 en chasse de nuit au-dessus de la plage de Célestun (Mex.) et 1 en chasse le 4/08 au matin au-dessus d'une clairière dans la forêt à Cockscomb.

### **Pauraque, Engoulevent pauraqué** *Nyctidromus albicollis* : CB

Deux observations ont été faites à Cockscomb : 3 ind. le 3 et 2 ind. le 4/08 en soirée, posés à terre sur le chemin au niveau du campement, s'envolant quelquefois sur qq. mètres pour capturer un insecte avant de se reposer (ils criaient parfois).

## Apodidae

### **Vaux's Swift, Martinet de Vaux** *Chaetura vauxi* : CI-S-OW

Des observations de Martinets du genre *Chaetura* ont été réalisées assez fréquemment, notamment à proximité des zones habitées. Les individus identifiés appartenaient à cette espèce qui niche à ces latitudes. Le Martinet ramoneur *Chaetura pelagica*, difficile à distinguer, est un migrateur qui arrive normalement plus tard. Notons, entre autres : qq. ind. le 19/07 à Chichen Itza (Mex.); pls ind. le 20/07 à Sarteneja; une vingtaine le 24/07 à Chunox; qq. obs. d'ind. survolant le QG (une vingtaine le 27/07, une cinquantaine le 7 et une trentaine le 13/08) à Shipstern; pls ind. le 14/08 à Orange Walk...

### **Lesser Swallow-tailed Swift, Martinet de Cayenne** *Panyptila cayennensis* : OW-CB

Qq. contacts : 3 ind. le 3 et 1 ind. le 5/08 en vol au-dessus de la forêt à Cockscomb et 1 ind. le 6/08 en vol au-dessus de la ville à Orange Walk.

## Trochilidae

### **Long-tailed Hermit, Ermite à brins blancs** *Phaethornis superciliosus* : CB

Noté uniquement à Cockscomb, avec 1 ind. dans la forêt le 4 et 1 le 5/08 au niveau du campement.

### **Little Hermit, Ermite de Longuemare** *Phaethornis longuemareus* : CB

Peu noté : qq. ind. les 4 et 5/08 dans la forêt à Cockscomb.

### **Scaly-breasted Hummingbird, Colibri de Cuvier** *Campylopterus cuvierii* : CB

Une seule observation : 1 ind. le 5/08 en bordure d'une rivière dans la forêt à Cockscomb (JB).

### **Wedge-tailed Sabrewing, Campyloptère pampa** *Campylopterus curvipennis* : S

Une seule observation : 1 ind. le 13/08 à proximité du lagon du Robin's land (VP).

### **Violet Sabrewing, Campyloptère violet** *Campylopterus hemileucurus* : CB

Assez commun à Cockscomb : 1 m. le 3, 5-6 ind. (dt une f.) le 4 et pls ind. le 5/08 (surtout en forêt mais aussi près du campement).

### **White-necked Jacobin, Colibri jacobin** *Florisuga melivora* : CB

Entendu et 1 mâle observé brièvement par VP le 4/08 dans la forêt, en bordure d'une petite rivière à Cockscomb.

### **Green-breasted Mango, Mango de Prévost** *Anthracothorax prevostii* : S-CC-CB

Noté çà et là : à Shipstern, avec 1 f. le 21/07 au Robin's land et une le 22/07 au QG; 1 m. les 29 et 31/07 à Caye Caulker; 1 cpl le 1/08 sur Goff's Caye et, enfin, 1 f. près des habitations le 3/08 à Cockscomb.

### **White-bellied Emerald, Ariane candide** *Amazilia candida* : S-CB

Assez commun au QG à Shipstern sur les héliconiacées (1 les 23 et 25/07, 2-3 ind. le 28/07, 2 le 7/08...). A noter également, qq. ind. les 3 et 4/08 dans la forêt à Cockscomb.

### **Cinnamon Hummingbird, Ariane cannelle** *Amazilia rutila* : C-S-T

Qq. contacts, notamment à proximité des côtes mexicaines : 2 le 17/07 et une dizaine le 18/07 à Célestùn (Mex.) et 1 ind. le 17/08 à Tulùm (Mex.). Egalement, 1 ind. le 7/08 en bordure de la piste à Shipstern.

**Buff-bellied Hummingbird, Ariane de Yucatan** *Amazilia yucatanensis* : S

Notée uniquement aux environs de la réserve de Shipstern : 2 le 20/07 et 1 le 8/08 en bordure de piste, qq-uns le 21/07 au Robin's land, qq-uns les 26 et 27/07 à Xo-Pol et 1 ind. les 6 et 13/08 au QG.

**Rufous-tailed Hummingbird, Ariane à ventre gris** *Amazilia tzacatl* : CT-CB

Qq. obs. : 4 ind. le 25/07 à Crooked Tree; qq-uns les 3, 4 et 5/08 à Cockscomb.

**Mexican Sheartail, Colibri élise** *Calliphlox eliza* : C

Noté seulement le 18/07 à Célestùn (au Mexique), avec une dizaine d'ind. (f. surtout) regroupée notamment à proximité de mangeoires.

## Trogonidae

**Slaty-tailed Trogon, Trogon de Masséna** *Trogon massena* : CB

Une seule observation : 1 m. posé dans un cécropia en bordure de chemin le 5/08 dans la forêt à Cockscomb (JB).

**Black-headed Trogon, Trogon à tête noire** *Trogon melanocephalus* : S-CT-CB-L-T

Commun au niveau des zones boisées, notamment à Shipstern : obs. quotidiennes au QG (max. de 8 ind. le 13/08); obs. régulières au Robin's land (qq. ind. se nourrissaient souvent sur des termitières en bordure du lagon); qq-uns les 26 et 27/07 à Xo-Pol ; qq-uns entendus les 10, 11 et 12/08 dans la forêt à Shipstern (2 ind. observés le 10). Ailleurs, qq. ind. notés le 24/07 Fresh Water Creek; qq-uns le 25/07 à Crooked Tree; qq-uns le 4/08 dans la forêt à Cockscomb; qq-uns en bordure de New River le 14/08 entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau) et 1 ind. le 17/08 à Tulùm (Mex.).

**Violaceous Trogon, Trogon violacé** *Trogon violaceus* : S

Entendu assez régulièrement dans les environs du QG à Shipstern. Une seule observation : 1 f. observée le 12/08 dans un arbre au-dessus du chemin d'accès à Shipstern.

## Alcedinidae

**Ringed Kingfisher, Alcyon à collier** *Ceryle torquata* : OW-CT-CB-L

Noté çà et là, à proximité des zones humides : 1 ind. les 20/07 et 6/08 sur New River à Orange Walk; 3 le 25/07 à Crooked Tree ; 1 sur un fil électrique en bordure de route les 2 et 5/08 entre Belize City et Belmopan ; 1 ind. observé les 4 et 5/08 en bordure d'une rivière dans la forêt à Cockscomb ; et, enfin, 2 ind. sur New River le 14/08 entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

**Belted Kingfisher, Alcyon ceinturé** *Ceryle alcyon* : CC

Une seule observation : 1 m. en bord de mer le 31/07 à Caye Caulker (YC, JB).

**Amazon Kingfisher, Alcyon de l'Amazone** *Chloroceryle amazona* : CB

Noté uniquement à Cockscomb : 1 f. le 4 et 2 ind. le 5/08 en bordure d'une rivière dans la forêt.

**Green Kingfisher, Alcyon vert** *Chloroceryle americana* : OW-CB-L

Qq. obs. : 2 ind. le 20, 1 m. le 22/07, 2 (1 m. + 1 f.) le 6/08 sur New River à Orange Walk; 1 f. le 4/08 en bordure d'une rivière dans la forêt à Cockscomb et 3 ind. sur New River le 14/08 entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

## Momotidae

**Keel-billed Motmot, Momot à bec caréné** *Electron carinatum* : CB

Un seul contact : 1 ind. assez bien observé le 4/08 dans des arbres en bordure d'un chemin dans la forêt à Cockscomb.

**Turquoise-browed Motmot, Momot à sourcils bleus** *Eumomota superciliosa* : CI

Noté uniquement au Mexique (Yucatan) : 1 ind. le 17 et une dizaine le 18/07 en bordure de route entre Mérida et Célestun; une cinquantaine d'ind. (nidification dans les temples et dans une petite falaise) le 19/07 à Chichen Itza .

**Blue-crowned Motmot, Motmot houtouc** *Momotus momota* : S-CB

Pls ind. entendus quotidiennement près du QG à Shipstern (notamment le matin), 2 ind. furent bien observés (dont un avec de la nourriture) le 21/07 au QG; entendu le 27/07 à Xo-Pol et le 10/08 à Shipstern. Egalement, 1 ind. le 3/08 dans la forêt à Cockscomb (VP).

## Galbulidae

**Rufous-tailed Jacamar, Jacamar à queue rousse** *Galbula ruficauda* : CB

Une seule observation: 1 f. le 4/08 en bordure d'une rivière dans la forêt à Cockscomb (VP, JB).

## Bucconidae

**White-necked Puffbird, Tamatia à gros bec** *Notharchus macrorhynchos* : S-CB

Peu noté : 2 ind. le 26 et 1 le 27/07 à Xo-Pol; et 1 le 4/08 dans la forêt à Cockscomb.

## Ramphastidae

**Keel-billed Toucan, Toucan à carène** *Ramphastos sulfuratus* : S-CB

Noté dans les environs de Shipstern : 3 ind. les 22 et 24/07 en bordure de piste entre Shipstern (QG) et Chunox ; entendu le 26/07 à Xo-Pol ; 2 ind. le 9 et 4 le 10/08 dans la forêt à Shipstern (entendus le 11) ; à Cockscomb, avec 2 ind. les 4 et 6 (qq. belles obs.) le 5/08 dans la forêt.

**Collared Araçari, Araçari à collier** *Pteroglossus torquatus* : S-LB

Contacté à plusieurs reprises dans les environs de Shipstern : au QG, avec, par ex. : 1 ind. les 21, 28/07 et 15/08, et 1 gpe de 5 ind. le 16/08 ; 3 ind. (ensemble) le 24/07 en bordure de route entre Little Belize et San Estevan; 1 le 27/07 sur un arbre en bordure de piste à Xo-Pol; et 2 ind. bien observés le 7/08 en bordure de la piste près du QG.

## Picidae

**Chesnut-colored Woodpecker, Pic roux** *Celeus castaneus* : S

Un seul contact : 2-3 ind. (un mâle seul puis un couple un peu plus loin) le 26/07 dans la forêt de Xo-Pol.

**Lineated Woodpecker, Pic ouentou** *Dryocopus lineatus* : S

Noté à Shipstern, à proximité du QG : 1 f. le 28/07 dans la forêt sèche depuis le Thompson Trail; 1 m. bien observé les 7 et 16/08 sur les poteaux bordant la piste.

**Acorn Woodpecker, Pic glandivore** *Melanerpes formicivorus* : CT

4 ind. (m. et f.) bien observés le 25/07 dans une pinède à Crooked Tree.

**Black-cheeked Woodpecker, Pic de Pucheran** *Melanerpes pucherani* : CB

Noté uniquement à Cockscomb, dans la forêt, avec : 1 ind. les 3, 2 le 4 et 1 le 5/08.

**Golden-fronted Woodpecker, Pic à front d'or** *Melanerpes aurifrons* : S-CT-CC-T

Commun : contacté le 19/07 à Chichen Itza (Mex.) avec pls couples (3 nids ont été notés); observé quotidiennement à Shipstern, au QG notamment (jusqu'à 4 ind. ensemble); noté également à Fresh Water Creek; Crooked Tree; Caye Caulker (1 le 30/07); et à Tulum (Mex.).

**Red-vented Woodpecker, Pic du Yucatan** *Melanerpes pygmaeus* : S-CT

Contacté çà et là aux environs de Shipstern : 1 couple (nid dans le tronc d'un cocotier) observé à plusieurs reprises au Robin's land ; 1 ind. les 22 et 28/07 puis le 15/08 dans la savane du Thompson Trail ; 1 ind. entendu le 24/07 Fresh Water Creek; 1 le 25/07 à Crooked Tree; et, enfin 1 ind. les 13 et 15/08 près du QG.

**Smoky-brown Woodpecker, Pic enfumé** *Veniliornis fumigatus* : CB

A Cockscomb : 1 ind. le 3 au campement, 1 f. le 4 et 1 m. le 5/08 dans la forêt.

**Pale-billed Woodpecker, Pic de Lesson** *Phloeocoastes guatemelensis* : S-CB-T

Qq. obs. : 2 ind. (dont 1 m.) le 3/08 dans la forêt à Cockscomb; 1 cple le 10 (VP) et 1 f. le 12/08 (JB) dans la forêt à Shipstern (également entendu les 11 et 12); et 1 le 17/08 à Tulum (Mex.) (VP).

## Dendrocolaptidae

### **Ruddy Woodcreeper, Grimpar roux** *Dendrocincla homochroa* : S

Noté uniquement à Shipstern : 2 le 23/07 depuis une Survey Line; 1 ind. le 27/07 dans la forêt de Xo-Pol et 2 ind. le 10 et 1 ind. (capturé) le 12/08 dans la forêt à Shipstern landing.

### **Olivaceous Woodcreeper, Grimpar fauvette** *Sittasomus griseicapillus* : S

Une seule obs. : 1 ind. contacté le 4/08 dans la forêt à Cockscomb. Un le 12/08 à Shipstern (JB).

### **Wedge-billed Woodcreeper, Grimpar bec-en-coin** *Glyphorhynchus spirurus* : CB

Deux obs. d'un ind. les 4 et 5/08 (belle obs.) dans la forêt à Cockscomb.

### **Barred Woodcreeper, Grimpar barré** *Dendrocolaptes certhia* : S

Un individu bien observé le 12/08 dans des arbres en bordure du chemin dans la forêt à Shipstern (entendu le 10/08 au même endroit).

### **Ivory-billed Woodcreeper, Grimpar à bec d'ivoire** *Xiphorhynchus flavigaster* : S-CB

Noté çà et là en forêt tropicale : 1 ind. le 23/07 Survey Line à Shipstern; 1 ind. observé le 26/07 dans la forêt de Xo-Pol (qq. chts entendus le lendemain au même endroit) ; qq-uns le 4/08 dans la forêt à Cockscomb; et 1 le 10, 2 le 11 et 3 ind. le 12/08 dans la forêt à Shipstern.

### **Streak-headed Woodcreeper, Grimpar de Souleyet** *Lepidocolaptes souleyetti* : CB

Un contact : 1 ind. noté le 4/08 dans la forêt à Cockscomb.

## Furnariidae

### **Rufous-breasted Spinetail, Synallaxe à poitrine rousse** *Synallaxis erythrothorax* : CB

Contacté uniquement le 4/08 à Cockscomb : qq. ind. (dont chts) dans une zone de végétation basse en bordure d'un chemin.

### **Buff-throated Foliage-gleaner, Anabate à gorge fauve** *Automolus ochrolaemus* : CB

Un individu bien observé le 4/08 cherchant sa nourriture dans des buissons en bordure d'un chemin à Cockscomb.

### **Plain Xenops, Sittine brune** *Xenops minutus* : S-CB

Qq. obs. : 2 ind. le 3 et 5 ind. le 4/08 dans la forêt à Cockscomb ; 2 ind. le 10 et 1 le 11/08 dans la forêt à Shipstern.

## Formicariidae

### **\*Great Antshrike, Grand Batara** *Taraba major* : CB

Entendu les 4 et 5/08 à Cockscomb (dans la forêt, à proximité de clairières).

### **Barred Antshrike, Batara rayé** *Thamnophilus doliatus* : CB

A Cockscomb : 1 m. le 3 (YC) et 3 ind. (2 m. + 1 f.) le 4/08 (notamment à proximité du campement).

### **Dot-winged Antwren, Grisin étoilé** *Microrhopias quixensis* : CB

Le 4/08 : 4 ind. (1 couple et 2 m. chts) ont été observés dans la forêt à Cockscomb.

### **Black-faced Antthrush, Tétéma coq-de-bois** *Formicarius analis* : S-CB

Plusieurs chts entendus les 3, 4 et 5/08 dans la forêt à Cockscomb (1 ind. fut observé brièvement le 3 chantant dans le sous-bois). Egalement, 1 cht entendu les 9 et 12/08 dans la forêt à Shipstern.

## Pipridae

### **Red-capped Manakin, Manakin à cuisses jaunes** *Pipra mentalis* : S-CB

Noté çà et là, en forêt (souvent entendu) : pls entendus les 26 et 27/07 à Xo-Pol; pls (à chaque fois un mâle et qq. femelles) les 3, 4 et 5/08 à Cockscomb (chts); 2 m. le 10 et 1 cple le 12/08 à Shipstern (également entendu les 9 et 11).

### **White-collared Manakin, Manakin à col blanc** *Manacus candei* : CB

Noté uniquement dans la forêt à Cockscomb, avec qq. ind. (surtout des f. et imm., 2-3 m.) les 4 et 5/08 (+ chts).

**Thrushlike Mourner (Manakin), Antriade turdoïde** *Schiffornis turdinus* : S-CB

Qq. contacts : 1 ind. le 24/07 Fresh Water Creek ; 1 ind. le 3/08 dans la forêt à Cockscomb; et 1 juv. capturé dans les filets le 12/08 dans la forêt à Shipstern landing (également entendu le 11, à cet endroit).

## Cotingidae

**Bright-rumped Attila, Attila à croupion jaune** *Attila spadiceus* : S-CB

Entendu le 4/08 dans la forêt à Cockscomb et 1 ind. observé le 11/08 dans la forêt à Shipstern (JB).

**Rose-throated Becard, Bécarde à gorge rose** *Pachyramphus aglaiae* : CI-S

Assez peu noté, en lisière de forêt (souvent en bordure de piste). A Shipstern, un couple est régulièrement observé en bordure de piste et à proximité du QG et un mâle est noté le 27/07 en bordure de piste à Xo-Pol. Notons enfin, un couple (nid dans un poteau) le 19/07 à Chichen Itza (Mex.).

**Masked Tityra, Tityra masqué** *Tityra semifasciata* : CI-S-OW-CC-T

Noté çà et là : un couple (nid dans un temple) le 19/07 à Chichen Itza (Mex.) ; qq. ind. le 20/07 à Orange Walk; obs. régulières de qq. ind. à Shipstern (QG, bord de piste et RL) (max. de 2 cples les 8 et 15/08); 1 f. le 3/08 à Cockscomb et, pour finir, 1 f. le 17/08 à Tulum (Mex.).

**Vermilion Flycatcher, Moucherolle vermillon** *Pyrocephalus rubinus* : C-CT

Contacté seulement à deux endroits : à Célestùn (Mex.), avec 2 m. le 17 et 1 cple le 18/07; ainsi qu'à Crooked Tree (pls dizaines (m. et f.) le 25/07 dans les jardins et les zones buissonneuses).

**Fork-tailed Flycatcher, Tyran des savanes** *Tyrannus savana* : CT-LB-OW/L

Qq. obs. (généralement à proximité de lieux humides) : une vingtaine d'ind. (en groupe) dans les buissons bordant une route au milieu des marais le 25/07 à Crooked Tree; 2 ind. le 25/07 dans un marais à Little Bélize (localisé dans le Corozal District); 1 ind. le 29/07 observé depuis la route entre Orange Walk et Bélize City; et, enfin, un petit groupe de 6 ind. le 14/08 en bordure de New River entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau).

**Tropical Kingbird, Tyran mélancolique** *Tyrannus melancholicus* : C-S-CB-T

La distinction entre cette espèce et la suivante repose sur l'écoute de leurs vocalises (les ind. observés n'ont donc pas tous été identifiés). Le Tyran mélancolique semble le plus commun, et fréquente les zones assez dégagées (lisières, villages, savanes...). Noté (de manière certaine) à Célestùn (Mex.); Shipstern (QG, piste et savane); Fresh Water Creek; Cockscomb; Shipstern sud (savane) et Tulum (Mex.).

**Couch's Kingbird, Tyran de Couch** *Tyrannus couchii* : C-S

Même remarque que pour l'espèce précédente, ce tyran fréquente des milieux identiques (non noté cependant en savane malgré qu'il y soit tout de même...). Contacté à Célestùn (Mex.) et à Shipstern.

**Piratic Flycatcher, Tyran pirate** *Legatus leucophaeus* : S-CB

Deux obs. : 1 ind. le 27/07 en bordure de piste à Xo-Pol (VP) et 1 ind. noté le 4/08 à Cockscomb.

**Sulphur-bellied Flycatcher, Tyran tigré** *Myiodynastes luteiventris* : CT-CB

Qq. contacts : 2 le 24/07 à Chunox; 1 le 25/07 dans une pinède à Crooked Tree et 1 ind. observé le 4/08 à Cockscomb.

**Boat-billed Flycatcher, Tyran pitangua** *Megarynchus pitangua* : C-CI-S

Assez commun : contacté à Célestùn (Mex.), à Chichen Itza (Mex.), à Shipstern : QG, RL... (Notons-y un couple nourrissant des jeunes dans un nid situé sur un pylône, en bordure de piste); et à Fresh Water Creek.

**Social Flycatcher, Tyran sociable** *Myiozetetes similis* : C-S-OW-CT-CB-T

Commun (notamment à proximité des villages et même en centre-ville) : noté à Célestùn (Mex.), Orange Walk (pls couples nicheurs au centre-ville, sur des pylônes), Shipstern (QG, RL), Fresh Water Creek, Crooked Tree, Cockscomb et Tulum (Mex.) où un couple nourrissait des jeunes au nid.

**Great Kiskadee, Tyran quiquivi** *Pitangus sulphuratus* : CI-S-OW-CT-CB-T

Assez commun dans les milieux ouverts (notamment, à proximité des zones humides ou habitées) : noté à Chichen Itza (Mex.) : 2 jeunes, Orange Walk, Shipstern (QG (2 couples), RL, Xo-Pol...), Fresh Water Creek, Crooked Tree, Cockscomb et Tulum (Mex.).

**Brown-crested Flycatcher, Tyran de Wied** *Myiarchus tyrannulus* : C-CI-S

Qq. obs. : 3 ind. le 18/07 à Célestùn (Mex.); qq-uns le 19/07 à Chichen Itza (Mex.); 1 ind. le 23/07 QG; 1 ind. le 27/07 RL; et, enfin, 1 ind. le 9/08 dans une savane à Shipstern,

**Yucatan Flycatcher, Tyran du Yucatan** *Myiarchus yucatanensis* : S-CT

Deux observations : qq-uns (1 ind. observé) le 24/07 Fresh Water Creek et 1 ind. le 25/07 à Crooked Tree.

**Dusky-capped Flycatcher, Tyran olivâtre** *Myiarchus tuberculifer* : S-CB

Assez peu noté : 2 ind. le 24/07 Fresh Water Creek (dans les mêmes milieux que des Tyrans du Yucatan) et 1 ind. le 5/08 dans la forêt à Cockscomb. Notons, enfin, l'observation de qq. « *Myiarchus* sp. » le 15/08 dans la forêt depuis le Thompson Trail à Shipstern.

**Sulphur-rumped Flycatcher, Moucherolle barbichon** *Myiobius barbatus* : CB

Contacté uniquement dans la forêt de Cockscomb, avec 3 ind. notés le 4/08.

**Royal Flycatcher, Moucherolle couronné** *Onychorhynchus coronatus* : S

Deux observations ont été réalisées dans la forêt à Shipstern: 1 f./imm. le 10/08 (JB) et 1 ind. le 11/08 (VP).

**White-throated Spadebill, Platyrhynque à moustaches** *Platyrinchus mystaceus* : S-CB

Deux contacts : 1 ind. observé le 4/08 dans la forêt à Cockscomb et 2 ind. capturés dans les filets le 9/08 dans la forêt à Shipstern.

**Yellow-olive Flycatcher, Platyrhynque jaune-olive** *Tolmomyias sulphurescens* : S-CT

Assez peu noté : qq. obs. au QG à Shipstern, avec un ind. (et peut-être un nid) et à Crooked Tree (qq. ind. le 25/07).

**Eye-ringed Flatbill, Platyrhynque à bec court** *Rhynchocyclus brevirostris* : S

Entendu les 10 et 12/08 (1 ind. observé par VP le 12) dans la forêt à Shipstern.

**Common Tody-Flycatcher, Todirostre familial** *Todirostrum cinereum* : CB

Un seul contact : un couple affairé à nourrir 2 ou 3 jeunes dans des arbres en bordure d'une rivière le 5/08 à Cockscomb (JB).

**Northern Bentbill, Tyranneau à bec courbe** *Oncostoma cinereigulare* : S-CB

Qq. obs. : 2 le 3 et 1 le 4/08 dans la forêt à Cockscomb; 1 ind. le 11/08 dans la forêt à Shipstern (également entendu les 11 et 12).

**Greenish Elaenia, Elénie verdâtre** *Myiopagis viridicata* : CT-CB

Peu contactée : entendue le 25/07 à Crooked Tree; et 1 ind. observé le 4/08 dans la forêt à Cockscomb.

**Yellow-bellied Elaenia, Elénie à ventre jaune** *Elaenia flavogaster* : S-CT-CB

Notée çà et là : 2 couples (un nid dans un pin) observés régulièrement au bord du lagon au Robin's land à Shipstern; qq-unes le 25/07 à Crooked Tree; qq-unes les 3 et 5/08 à Cockscomb; 1 ind. les 7 et 15/08 au QG (Shipstern); et 1 ind. le 9/08 dans une savane à Shipstern.

**Sepia-capped Flycatcher, Pipromorphe à tête brune** *Leptopogon amaurocephalus* : CB

Un individu observé le 4/08 dans la forêt à Cockscomb.

**Ochre-bellied Flycatcher, Pipromorphe roussâtre** *Mionectes oleagineus* : S-CB

Qq. obs. : 1 le 3 et 2 le 4/08 dans la forêt à Cockscomb; et 1 ind. capturé dans les filets le 12/08 dans la forêt à Shipstern.

## Hirundinidae

**Mangrove Swallow, Hirondelle des mangroves** *Tachycineta albilinea* : S-CT-L-D

Notée çà et là à proximité des zones humides : obs. régulières au niveau du lagon du Robin's land à Shipstern (max. de 4 ind., niche à Sarteneja mais aussi à Robin's land dans les trous de pics dans les palmiers); nombreuses le 25/07 Crooked Tree; qq-unes les 9 et 11/08 à Shipstern landing (lagon et savane) et nbx ind. le 14/08 sur New River entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau). Notons enfin deux obs. d'ind. isolés à San Estevan et à Dangriga.

**Purple Martin, Hirondelle noire** *Progne subis* : S-OW-LB-CT-CC-D-L...

Cette espèce a été notée en nombre dès la fin juillet et la migration battait, semble-t-il, son plein à la fin de ce mois et au début d'août. Première : 1 f. le 22/07 à Orange Walk; notée, ensuite le 24/07 à Little Bélize et Fresh Water Creek. Puis c'est le « rush », avec, entre autres : ts nbx ind. le 25/07 Crooked Tree; 95 en migr. le 28/07 (en un quart d'heure) au niveau du lagon du Thompson Trail à Shipstern; nbxes le 28/07 au RL; notée en migr. fin-07 à Caye Caulker; nbxes le 3/08 à Dangriga; et surtout, pls milliers en soirée le 5/08 en bordure de route entre Bélize City et Orange Walk (en vol ou posées en grand nombre sur les fils électriques). Ensuite, les obs. concernent moins d'ind. : plusieurs le 6/08 Orange Walk; qq-unes du 9 au 12/08 à Shipstern landing; qq-unes le 14/08 entre Orange Walk et Lamanai (trajet en bateau) et qq-unes le 18/08 Cancun (Mex.).

**Gray-breasted Martin, Hirondelle chalybée** *Progne chalybea* : CT

Identifiée seulement le 25/07 (ad. et jeunes) dans le village à Crooked Tree, sur les fils électriques, en compagnie d'Hirondelles noires *Progne subis*. La confusion avec cette dernière explique peut-être le faible nombre d'obs. du séjour (les mâles de l'Hirondelle noire étant, eux, bien reconnaissables).

**Barn Swallow, Hirondelle rustique** *Hirundo rustica* : C-S-CC-D

Plusieurs obs. de migrateurs ont été réalisées : qq-unes le 18/07 à Célestùn (Mex.); 31 ind. en migr. le 28/07 (16 en un quart d'heure) au niveau du lagon du Thompson Trail à Shipstern; qq-unes en migr. le 31/07 à Caye Caulker; nbses le 3/08 à Dangriga et, enfin : 1 ind. le 13 et 4 le 15/08 en migr. au Robin's land.

**Cave Swallow, Hirondelle à front brun** *Hirundo fulva* : CI-T

Notée uniquement au Mexique, au niveau des temples mayas : une cinquantaine (nidification dans une petite falaise) le 19/07 à Chichen Itza; qq-unes le 16 et pls centaines le 17/08 à Tulum.

## Corvidae

**Brown Jay, Geai enfumé** *Psilorhinus morio* : S-CT-CB

Assez commun, notamment à Shipstern : obs. régulières au QG, en forêt et en bordure de piste. Entre autres : 3 ad. le 21/07 et qq-uns le 8/08 au QG; 2 le 22 et 6 le 24/07 en bordure de piste entre Shipstern (QG) et Chunox; 5 le 15/08 au Robin's land; pls les 26 et 27/07 à Xo-Pol (à noter un gpe de 5 et 1 ad. au nid le 27) et pls les 9,10 et 11/08 dans la forêt à Shipstern. Ailleurs, qq-uns (dont 1 imm. bien observé) le 25/07 Crooked Tree et qq. ind. entendus les 4 et 5/08 à Cockscomb. (Rq : Ces individus appartenaient à la ssp « fuliginosus »).

**Green Jay, Geai vert** *Cyanocorax yncas* : S

Une seule obs. : 1 ad. le 8/08 en compagnie de qq. Geais enfumés le 8/08 dans les arbres au niveau du QG à Shipstern (JB).

**Yucatan Jay, Geai du Yucatan** *Cissilopha yucatanica* : S-T

Commun en forêt à Shipstern, vagabondant en petites troupes bruyantes regroupant des âges différents (ad., imm. et juv.). Par exemple : 9 ind. (2 ad., 2 imm. et 5 juv.) le 21 et une quinzaine le 28/07 sur le Thompson Trail; une vingtaine le 23/07 au Robin's land; 5 le 23, 12 le 24/07, une dizaine le 13 et une trentaine le 16/08 au QG; 2 ad. le 26/07 à Xo-Pol et 3 troupes le 7/08 le long du Main Trail. Notons, enfin, 4 ad. le 17/08 à Tulum (Mex.).

## Troglodytidae

**Yucatan Wren, Troglodyte du Yucatan** *Campylorhynchus yucatanicus* : C

Noté uniquement au Mexique, à Célestùn (Yucatan), avec 2 chts (dont 1 bien observé) le 18/07 dans une zone buissonneuse, non loin de la mer.

**Spot-breasted Wren, Troglodyte à poitrine tachetée** *Thryothorus maculipectus* : S-CB

Assez commun en forêt : entendu assez régulièrement dans les environs du QG à Shipstern : 1 cht observé le 15/08 au QG et 2 le 28/07 dans la forêt sèche depuis le Thompson Trail. Sinon, 1 cht le 24/07 Fresh Water Creek; entendu les 26 et 27/07 à Xo-Pol; 1 ind. le 3 et 2-3 ind. le 4/08 dans la forêt à Cockscomb; et qq. familles (ad. accompagnés de juv.) les 10, 11 et 12/08 dans la forêt à Shipstern.

**Southern House-Wren, Troglodyte familial** *Troglodytes (aeden) musculus* : CT-D-CB

Noté çà et là à proximité des habitations : 1 cht le 24/07 à San Estevan; qq. chts le 25/07 dans le village à Crooked Tree; 1 le 3/08 dans un jardin à Dangriga; 1 cht le 3 et 2 ind. le 5/08 à Cockscomb (à proximité du campement).

**White-breasted Wood-Wren, Troglodyte à poitrine blanche** *Henicorhina leucosticta* : S-CB

Assez peu contacté : 1 cht entendu le 3 et 1 ind. observé le 5/08 alarmant dans le sous-bois à Cockscomb; et 2 ind. (1 couple + cht) le 10 et 1 ind. le 12/08 dans la forêt à Shipstern.

**White-bellied Wren, Troglodyte à ventre blanc** *Uropsila leucogastra* : S-T

Assez commun en forêt : à Shipstern : entendu assez régulièrement dans les environs du QG (1 le 28/07 et qq. chts observés le 15/08 dans le sous-bois en bordure du Thompson Trail); 1 ind. le 26/07 à Xo-Pol et 1 ind. observé les 10, 11 et 12/08 dans la forêt à Shipstern. Ailleurs, entendu le 24/07 à Fresh Water Creek et le 17/08 à Tulum (Mex.).

## Mimidae

**Black Catbird, Moqueur noir** *Melanoptila glabrirostris* : CI-S-CT-LB

Assez commun à Shipstern, dans la mangrove du Robin's land (obs. régulières : min. de 3 couples notés) et en savane : Thompson Trail (min. de 2 chts contactés); Main Trail (1 cht le 7/08) et à Shipstern landing (3 ind. : dt 2 chts le 9/08). A part ça, un couple (nid dans un ficus en milieu forestier!!) le 19/07 en bordure d'un chemin à Chichen Itza (Mex.); 1 ind. les 24 et 25/07 à proximité d'un étang à Little Belize et 1 cht entendu le 25/07 dans une savane à Crooked Tree.

**Tropical Mockingbird, Moqueur des savanes** *Mimus gilvus* : C-S-OW-CT-CC-CB-D-T

Commun dans les milieux ouverts (villages, savanes, mangroves, bords de route...). Entre autres, noté (un jeune noté le 18) à Célestùn (Mex.); Orange Walk; Shipstern (mangrove du Robin's land (un jeune le 13/08), savanes du Thompson Trail, du Main Trail et de Shipstern landing); Chunox; Fresh Water Creek; Crooked Tree (dont un couple nourrissant des jeunes); Caye Caulker; Cockscomb (Maya Center); Dangriga et Tulum (Mex.).

## Turdidae

**White-throated Robin, Merle à gorge blanche** *Turdus assimilis* : CB

Noté uniquement à Cockscomb : 5-6 ind. (ad. et juv.) le 4 et 1 ad. le 5/08 dans la forêt.

**Clay-colored Robin, Merle fauve** *Turdus grayi* : CI-S-CT-CB

Commun par endroits, absent à Shipstern : nbx ind. (ad. + juv.) le 19/07 dans la forêt à Chichen Itza (Mex.); qq-uns à Chunox le 24/07; entendu le 24/07 à Fresh Water Creek; pls (dt chts) le 25/07 Crooked Tree et qq-uns (notamment à proximité du campement) les 3, 4 et 5/08 à Cockscomb.

## Sylviidae

**Blue-gray Gnatcatcher, Gobemoucheon gris-bleu** *Polioptila caerulea* : CI-S-CT

Noté ça et là : 1 f. le 19/07 à Chichen Itza (Mex.); qq-uns les 21 et 23/07 mangrove du Robin's land à Shipstern; qq-uns le 25/07 à Crooked Tree; qq-uns le 28/07 et 3 ind. le 15/08 savane du Thompson Trail à Shipstern.

**Tropical Gnatcatcher, Gobemoucheon tropical** *Polioptila plumbea* : S-CB

Qq. obs. ont été réalisées en milieu forestier : 2 le 24/07 à Fresh Water Creek; 1 f. le 27/07 à Xo-Pol et 1 ind. le 4/08 à Cockscomb.

**Long-billed Gnatwren, Microbate à long bec** *Ramphocaenus melanurus* : S-CB

Peu contacté : 1 cht entendu le 24/07 à Fresh Water Creek et 1 cht observé le 5/08 dans la forêt en bordure d'un chemin à Cockscomb (JB).

## Cyclarhidae

**\*Rufous-browed Peppershrike, Sourciroux mélodieux** *Cyclarhis gujanensis* : S

Entendu le 9/08 dans une savane à Shipstern.

## Vireonidae

**Mangrove Vireo, Viréo des mangroves** *Vireo pallens* : S-T

Assez commun (plus souvent entendu que vu...) : entendu le 21/07 mangrove du Robin's land à Shipstern; le 24/07 Fresh Water Creek; le 25/07 Crooked Tree et le 28/07 dans la savane du Thompson Trail. Notons : pls (2 ind. observés) les 26 et 27/07 à Xo-Pol; 2 chts observés le 15/08 TT (savane et clairière); 1 le 7/08 en bordure de piste à Shipstern; et, enfin, 1 le 17/08 à Tulum (Mex.).

**Red-eyed Vireo, Viréo aux yeux rouges** *Vireo olivaceus* : S-T

Qq. obs. de migrants en fin de séjour : 2 ind. le 13 et 1 le 15/08 dans les arbres du QG à Shipstern et 1 ind. le 17/08 à Tulum (Mex.).

**Yellow-green Vireo, Viréo jaune-verdâtre** *Vireo flavoviridis* : S-CT

Plus souvent entendu qu'observé : 1 cht entendu régulièrement au QG à Shipstern (1 ind. observé les 8 et 13/08); entendu le 24/07 à Fresh Water Creek et qq. ind. (surtout entendus) le 25/07 Crooked Tree

**Yucatan Vireo, Viréo du Yucatan** *Vireo magister* : CC

Une seule obs. : 1 ind. le 29/07 à Caye Caulker.

**Tawny-crowned Greenlet, Viréon à calotte rousse** *Hylophilus ochraceiceps* : S-CB

Noté les 4 et 5/08 dans la forêt à Cockscomb (1 ind. observé le 4); et dans la forêt à Shipstern, avec, 1 ind. le 10 et 2 ind. (dont un capturé dans les filets) le 12/08.

**Lesser Greenlet, Viréon menu** *Hylophilus decurtatus* : S

Contacté çà et là : 1 ind. le 23/07 Survey Line à Shipstern; 1 le 24/07 à Fresh Water Creek; qq-uns les 26 et 27/07 à Xo-Pol; 1 le 7/08 en bordure de piste à Shipstern; et, pour finir, 1 ind. le 10, 2 le 11 et 3-4 le 12/08 dans la forêt à Shipstern.

## Coerbididae

**Red-legged Honeycreeper, Guit-guit saï** *Cyanerpes cyaneus* : S-CB

Présent à Shipstern : au QG (1 m. les 21, 28/07, 7 et 8/08, et 4 ind. (1 m. et 3 f.) le 15/08); à Xo-Pol (1 m. le 26 et 4-5 ind. le 27/07) et à Shipstern (1 m. le 11/08). Ailleurs : 1 m. le 24/07 à Chunox et qq. ind. (m. en mue et f.) les 3, 4 et 5/08 à Cockscomb.

**Green Honeycreeper, Guit-guit émeraude** *Chlorophanes spiza* : CB

Une seule observation : 1 f./imm. le 5/08 en compagnie de qq. Guit-guit saï dans la forêt à Cockscomb (en bordure d'un chemin).

**Bananaquit, Sucrier à ventre jaune** *Coereba flaveola* : CC-CB

Les deux types ont été contactés : un couple le 29 et 3 ind. le 31/07 à Caye Caulker (ssp. à gorge blanche); et 2 ind. (dont un juv.) le 4 et 1 le 5/08 dans la forêt à Cockscomb (ssp. à gorge grise).

## Parulidae

**Prothonotary Warbler, Paruline orangée** *Protonotaria citrea* : S

Qq. migrateurs ont été observés en 08, à Shipstern : 4 ind. (3 + 1) le 7 dans des buissons en bordure de piste; 1 m. le 12 dans la forêt à Shipstern et 1 m. le 13 dans les arbres du QG.

**Yellow Warbler, Paruline jaune** *Dendroica petechia* : S-CC

Les 2 ssp ont été contactées :

- la sous-espèce nord-américaine migratrice *aestiva* (Yellow Warbler, Paruline jaune), migratrice, a été observée le 12/08 dans la forêt à Shipstern par VP (il s'agissait d'un mâle) ; remarque : la ssp type est antillaise.

- la sous-espèce des mangroves du groupe *erithachorides* (Mangrove Warbler, Paruline des mangroves), nicheuse, chez laquelle la tête du mâle est de couleur marron. Cette sous-espèce est assez commune au niveau des mangroves et en savane, par exemple, à Shipstern : savanes du Thompson Trail (1 m. + 2 f./imm. le 28/07) et du Main Trail (2 f./imm. le 7/08) et à Caye Caulker où elle semble assez abondante (6 ind. le 29/07 : 2 m., 1 m. imm. et 3 f./imm.).

**Yellow-throated Warbler, Paruline à gorge jaune** *Dendroica dominica* : S

Une obs. : 1 ind. (f. probable) le 21/07 dans les arbres du QG à Shipstern (JB).

**Warbler sp., paruline sp. (des ruisseaux/hochequeue)** *Seiurus sp. noveboracensis/motacilla* : S

Un contact : 1 ind. cherchant sa nourriture à terre sur un sentier le 10/08 dans la forêt à Shipstern landing.

**Kentucky Warbler, Paruline du Kentucky** *Geothlypis formosa* : S

Une seule obs. : 1 f. le 12/08 dans la forêt à Shipstern (JB).

**Gray-crowned Yellowthroat, Paruline à calotte grise** *Geothlypis poliocephala* : S

Notée uniquement au Robin's land à Shipstern, avec 1 m. le 23/07 dans la mangrove (YC, JB).

**American Redstart, Paruline flamboyante** *Setophaga ruticilla* : S-CB

Deux obs. de migrants : 1 f. le 3/08 dans la forêt à Cockscomb et 1 f./imm. le 10/08 dans la forêt à Shipstern landing.

## Icteridae

**Chestnut-headed Oropendola, Cassique à tête brune** *Psarocolius wagleri* : CB

Un individu contacté le 4/08 dans la forêt à Cockscomb (YC).

**Montezuma Oropendola, Cassique de Montezuma** *Psarocolius montezuma* : CB (S)

Observé uniquement à Cockscomb, avec 1 ind. le 4 et 2 ind. le 5/08 dans des cécopias en bordure d'une rivière (+ chants). A noter qq. colonies désertées, dont une en bordure de piste à Cockscomb et une dans les cultures le long du chemin d'accès à Xo-Pol (Shipstern).

**Yellow-billed Cacique, Cassique à bec jaune** *Cacicus holosericeus* : S-CB

Qq. obs. : 1 ad. en compagnie de Geais du Yucatan le 28/07 dans la forêt sèche depuis le Thompson Trail à Shipstern; 1 ind. les 4 et 5/08 dans la forêt à Cockscomb et 1 ind. entendu le 10/08 à proximité du lagon à Shipstern landing.

**Bronzed Cowbird, Vacher bronzé** *Molothrus aeneus* : C-S-OW-CT-T

Noté çà et là, par ex. : 4 ind. le 18/07 à Célestùn (Mex.); 1 les 20/07 et 6/08 à Orange Walk; 1 m. les 23/07 et 8/08 au QG à Shipstern. Contacté aussi à Chunox; San Estevan; Fresh Water Creek; Crooked Tree et Tulum (Mex.).

**Great-tailed Grackle, Quiscale à longue queue** *Quiscalus mexicanus* : C-CI-S-OW-LB-CT-CC-CB-D...

Très commun dans les villes et les villages. Notons : une soixantaine en dortoir le 17/07 à Célestùn (Mex.); une cinquantaine le 22/07 dans un labour à Chunox; nbx ind. fin-07 à Caye Caulker et une centaine le 18/08 en dortoir à Cancun (Mex.). Peu commune à Shipstern : notée au Robin's land en bordure du lagon (max. de 7 ind.) et dans les villages voisins (Sarteneja et Chunox). Nidif. constatée à Bélize City (jeunes le 2/08) et à Dangriga (jeunes le 3/08).

**Melodious Blackbird, Quiscale chanteur** *Dives dives* : CI-S-OW-CT-CB-T

Noté çà et là, en petit nombre, dans les zones buissonneuses à proximité des zones dégagées (village, rivière, temples...) : à Cancùn (Mex.); Chichen Itza (Mex.) avec, pls chts le 19/07; Orange Walk (qq. chts); au QG de Shipstern (un couple régulièrement observé); Fresh Water Creek; Crooked Tree; Cockscomb et Tulum (Mex.).

**Black-cowled Oriole, Oriole à capuchon** *Icterus dominicensis* : S-CB

Assez commun à Shipstern: obs. régulières au QG et en bordure de piste (par ex. : 2 imm. le 21 et 1 cple les 27 et 28/07, 4 imm. le 7/08...); noté aussi au Robin's land (2 chts le 23/07); à Xo-Pol (1 imm. le 27/07) et dans la forêt sèche en bordure du Thompson Trail (1 imm. le 28/07). Ailleurs, contacté à Cockscomb (max. de 4 ind. (dt 2 m.) le 4/08).

**Hooded Oriole, Oriole masqué** *Icterus cucullatus* : C-S-OW-CT-T

Noté çà et là, généralement en couples. Contacté à Célestùn (Mex.); Orange Walk; Shipstern (obs. régulières au QG : un couple nichant dans un toit en palmes (2 jeunes notés hors du nid le 13/08), et au Robin's land; ainsi qu'un couple observé depuis le Thompson Trail); Crooked Tree et Tulum (Mex.).

**Yellow-backed Oriole, Oriole noir-et-or** *Icterus chrysater* : S-CT

Peu commun : un couple observé les 21 et 28/07 dans la savane du Thompson Trail à Shipstern et 1 ind. noté le 25/07 à Crooked Tree (VP).

**Altamira Oriole, Oriole à gros bec** *Icterus gularis* : C-CI-S-OW-T

Observé régulièrement à Shipstern dans les environs du QG (1 ou 2 ind.) et dans la forêt sèche en bordure du Thompson Trail (un couple). Sinon, noté à Orange Walk (1 m. le 22/07) et au Mexique : à Célestùn (un couple nichant dans des pins); Chichen Itza (2 couples le 19/07) et Tulum (2 ind. le 17/08).

**Red-winged Blackbird, Carouge à épaulettes** *Agelaius phoeniceus* : CT-LB

Contacté uniquement à deux endroits, le 25/07, avec une dizaine d'ind. (m. et f.) à Crooked Tree et une vingtaine (m. chts et f.) dans un marais à Little Belize.

## Thraupidae

**Yellow-throated Euphonia, Organiste à gorge jaune** *Euphonia hirundinacea* : S-CT-L

Commun, souvent en groupes : présence régulière au QG de Shipstern (max. d'une vingtaine d'ind. le 13/08 ); contacté aussi au Robin's land; à Xo-Pol; Shipstern; Fresh Water Creek; Crooked Tree et Lamanai. Notons, enfin, une femelle capturée le 12/08 (de nuit) alors qu'elle était entrée dans notre cabane au QG.

**Scrub Euphonia, Organiste de brousse** *Euphonia affinis* : S

Assez peu noté : qq. obs. au QG à Shipstern (1 cple le 23/07 et qq-uns en compagnie de l'espèce précédente le 13/08). Signalons aussi un cht entendu le 24/07 à Fresh Water Creek.

**Olive-backed Euphonia, Organiste olive** *Euphonia gouldi* : CB

Noté uniquement à Cockscomb, avec qq. ind. (des 2 sexes) le 4 et 1 f. le 5/08 (principalement à proximité du campement).

**Masked Tanager, Calliste à coiffe d'or** *Tangara larvata* : CB

A Cockscomb : 5 ind. le 3, 1 le 4 et 4 le 5/08, à proximité du campement.

**Blue-gray Tanager, Tangara évêque** *Thraupis episcopus* : OW-CT-CB

Contacté çà et là, souvent à proximité des villages : 2 ind. le 20/07 à Orange Walk; une dizaine le 25/07 dans le village à Crooked Tree; et, enfin, 2 ind. le 3 et 1 le 4/08 au campement à Cockscomb.

**Yellow-winged Tanager, Tangara à miroir jaune** *Thraupis abbas* : CI-CB

Noté uniquement en deux sites : Chichen Itza (Mex.) avec 3 ind. le 19/07 et Cockscomb (2 ind. le 3, 1 le 4 et 3 le 5/08 à proximité du campement).

**Scarlet-rumped Tanager, Tangara à croupion rouge** *Ramphocelus passerinii* : CB

Contacté à Cockscomb au niveau du campement, avec 1 m. le 3 et qq. ind. (m. et f.) notés les 4 et 5/08.

**Crimson-collared Tanager, Tangara ceinturé** *Ramphocelus sanguinolentus* : CB

A Cockscomb : 1 ind. le 3 et 3-4 ind. les 4 et 5/08.

**Rose-throated Tanager, Tangara à gorge rose** *Piranga roseogularis* : S

Plusieurs observations ont été réalisées à Shipstern : 1 m. cht le 21/07 en bord de piste; 1 m. le 27/07 à Xo-Pol (VP); 3 ind. (2 m. + 1 f.) le 7/08 à l'entrée du Main Trail; 1 couple le 10/08 dans la forêt à Shipstern et 1 couple le 15/08 dans la forêt en bordure du Thompson Trail.

**Red-crowned Ant-Tanager, Tangara à couronne rouge** *Habia rubica* : CB

Uniquement noté à Cockscomb : 2 ind. le 3 (VP) et 1 m. le 4/08 dans la forêt.

**Red-throated Ant-Tanager, Tangara à gorge rouge** *Habia fuscicauda* : S-CB

Assez commun en forêt, par endroits : 2 m. le 26/07 à Xo-Pol; pls (m. et f.) les 4 et 5/08 dans la forêt à Cockscomb; qq-uns (m. cht et f./juv.) les 10, 11 et 12/08 dans la forêt à Shipstern.

## Fringillidae

**Black-headed Saltator, Saltator à tête noire** *Saltator atriceps* : S-CB

Peu noté : 3 ind. en vol le 24/07 à Fresh Water Creek et qq-uns les 4 et 5/08 à Cockscomb (notamment à proximité du campement).

**Buff-throated Saltator, Saltator des grands-bois** *Saltator maximus* : CB

Noté uniquement près du campement à Cockscomb, avec qq. ind. (ad. et imm.) les 3, 4 et 5/08.

**Grayish Saltator, Saltator gris** *Saltator coerulescens*

Contacté à qq. reprises dans les villages : 2 chts le 18/07 à Célestùn (Mex.); 1 ind. le 24/07 à Chunox et 2 ind. le 25/07 à Crooked Tree.

**Red Cardinal, Cardinal rouge** *Cardinalis cardinalis* : S-CT

Deux observations : 1 m. le 24/07 au niveau de la mangrove du Robin's land à Shipstern (VP) et 1 le 25/07 à Crooked Tree (YC).

**Black-faced Grosbeak, Cardinal à ventre blanc** *Caryothraustes poliogaster* : CB

Dans la forêt de Cockscomb : 2 ind. le 3 et 3 le 4/08.

**Blue-black Grosbeak, Evêque bleu-noir** *Cyanocompsa cyanoides* : CB

Peu noté : 1 cht entendu le 24/07 à Fresh Water Creek et 2 ind. (dt 1 cht) le 4/08 dans la forêt à Cockscomb.

**Yellow-faced Grassquit, Sporophile grand-chanteur** *Tiaris olivacea* : CI-CB

Noté uniquement en deux sites : Chichen Itza (Mex.) avec 2 m. chts le 19/07 et Cockscomb, où une dizaine d'ind. était présente près du campement les 3 et 4/08.

**White-collared Seedeater, Sporophile à col blanc** *Sporophila torqueola* : S-OW-CT-LB-CC-D-CB

Commun, dans les villages, en bordure des routes et autres milieux ouverts : noté, entre autres, à Orange Walk; Shipstern (QG et RL); Fresh Water Creek; Little Bélize; Crooked Tree; Caye Caulker; Dangriga et Cockscomb (ssp. « moreletti »).

**Variable Seedeater, Sporophile variable** *Sporophila aurita* : CB

Noté uniquement à Cockscomb, avec pls ind. (surtout des f., qq. m. imm.) le 4/08 dans une zone de végétation basse en bordure d'un chemin.

**Thick-billed Seed-Finch, Sporophile curio** *Oryzoborus angolensis (funereus)* : S-CB

Qq. obs. : 1 m. le 24/07 à Fresh Water Creek et pls ind. (1 m. et qq. f.) le 4/08 à Cockscomb dans une zone de végétation basse en bordure d'un chemin

**Blue-black Grassquit, Jacarini noir** *Volatinia jacarina* : OW-LB-CB

Commun dans les cultures bordant la piste entre Orange Walk et Chunox. Noté également le 24/07 dans les cultures à Little Bélize et San Estevan; ainsi que les 3 et 5/08 à Cockscomb (Maya Center).

**Orange-billed Sparrow, Tohi à bec orange** *Arremon aurantirostris* : CB

Contacté uniquement dans la forêt à Cockscomb : 1 couple le 3 et 1 ad. occupé à construire un nid le 5/08.

**Olive Sparrow, Tohi olive** *Arremonops rufivirgatus* : S

Noté dans les savanes de Shipstern, avec par ex. : la savane du Thompson Trail (1 cht les 22, 23/07 et 15/08); et la savane du Main Trail (2 ind. (dt 1 + nourr.) le 7/08).

**Green-backed Sparrow, Tohi à dos vert** *Arremonops chloronotus* : S

A Shipstern: min. de 6 ind. (dt 1 cple nourrissant) le 10, 2 ind. (un couple) le 11 et 1 juv. (capturé dans les filets) le 12/08 dans la forêt (le cht y fut entendu les 10 et 12/08). Notons enfin, 1 cht entendu le 24/07 à Fresh Water Creek.

## Espèces de mammifères rencontrées

Remarque : n'ayant pas d'ouvrage sur le sujet, l'identification de certains d'entre eux peut être incomplète...

**White-lined sac-winged Bat** *Saccopteryx bilineata*

3 le 4/08 dans la forêt à Cockscomb (contre le tronc d'un arbre)

**Long-nosed Bat** *Leptonycteris sp*

Une dizaine le 14/08 contre le tronc d'un arbre en bordure de New River entre Orange Walk et Lamanai.

**Margay** *Felis wiedii*

Une femelle sortant d'une cavité au pied d'un arbre où était caché son jeune le 7/08 dans la forêt tropicale sèche en bordure du Main Trail à Shipstern.

**Gray Fox, Renard gris** *Urocyon cinereoargenteus*

Noté çà et là (de jour comme de nuit), qq. belles obs.: par ex. : 1 ind. le 18/07 à Célestun (Mex.); 1 ind. observé à plusieurs reprises au QG (Shipstern) et 1 ind. noté les 4 et 5/08 au campement à Cockscomb.

**Northern Raccoon; Raton laveur** *Procyon lotor*

1 ind. assez bien observé le 17/07, en bordure de rivière, dans les palétuviers à Célestun (Mex.).

**Yucatan Black Howler Monkey; Singe hurleur** *Alouatta palliata*

Observé à Lamanai (un groupe près de la rivière) et entendu à Cockscomb.

**White-nosed Coati** *Nasua narctica*

Plusieurs observations à Shipstern mais également en bord de route sur différents trajets

**Squirrel sp ; écureuil sp** *Sciurus sp*

Deux observations à Shipstern

**Jaguar** *Panthera onca*

Uniquement des traces observées à Shipstern et Cockscomb...

**Puma** *Felis concolor*

Uniquement des traces observées à Shipstern...

**West Indian Manatee, Lamantin** *Trichechus manatus*

Quelques individus très bien observés depuis le bateau, au large de Caye Caulker (excursion ciblée)

**White-lipped Peccary, Pécari à lèvres blanches** *Tayassi pecari*

Une observation depuis le bus, vers Chunox

**Opposum sp.**

Une observation de nuit, au QG de Cockscomb

**Baird's Tapir, tapir de Baird** *Tapirus bairdii*

Uniquement des traces observées à Shipstern et Fresh Water Creek...

**Central American Agouti** *Dasyprocta punctata*

Une observation depuis le bus vers Little Belize

## Autres espèces de vertébrés rencontrées (...)

Remarque : n'ayant pas d'ouvrage sur le sujet, l'identification de certains d'entre eux peut être incomplète...

## **Reptiles**

**Boa constrictor** *Boa constrictor*

Un individu chassant les chauves-souris à l'entrée d'une grotte à Shipstern.

**Green Iguana; Iguane vert** *Iguana iguana*

Observations régulières, notamment dans les sites archéologiques mayas.

**Spiny-tailed Iguana** *Ctenosaura similis*

Observé en bord de mer, à Caye Caulker notamment

**“Jesus Christ Lizard”** *Basiliscus spp*

Observé en bord de mer, à Caye Caulker notamment

**American / Morelet’s Crocodile** *Crocodylus acutus / moreletii*

Des individus de bonne taille ont été observé dans la rivière New River à Orange Walk ; un individu de petite taille a été trouvé dans une flaque en bordure d’un chemin à Fresh Water Creek.

(...)

## **Poissons**

Remarque : très belle diversité de poisson de récifs observés en bordure de Caye Caulker...

Les espèces suivantes y ont, entre autres, été observées dans très bonnes conditions :

**Jewfish, Mérou tropical** *Epinephelus itajara*

**Spotted Eagle Ray, Raie léopard** *Aetobatus narinari*

**Sting Ray, Raie pastenague américaine** *Dasyatis americana*

**Nurse Shark, Requin dormeur** *Ginglymostoma cirratum*

**Green Muray, Murène verte** *Gymnothorax funebris*

**Slender Sea Horse, Hippocampe** *Hippocampus reidi*

**Great Barracuda, Barracuda** *Sphyraena barracuda*

(...)

## **Quelques espèces d’Invertébrés rencontrés...**

Remarque : n’ayant pas d’ouvrage sur le sujet, l’identification de certains d’entre eux est incomplète et certains noms scientifiques / vernaculaires peuvent faire défaut...

**Mygale sp** *Brachypelma (vagans ?)*

Régulièrement rencontrée de nuit au QG de Shipstern, notamment autour des terriers en bordure de chemin. Une belle femelle sur la toile de tente également...

**Scorpion sp** *Centruroides sp.*

Régulièrement rencontré au QG de Shpistern, notamment dans les bâtiments...

(...)