

Séjour dans le sud des Pays-Bas du 26.12 au 30.12.2003 (Zeeland et Zuid-Holland)

Participants : Nicolas Bazin, Julien Bottinelli, Jean-Marie Frenoux, Grégory Haas, Lydia Laurent et Vincent Palomares

Rédacteurs : Julien Bottinelli (observations sur le terrain) et Vincent Palomares (rapport final)

Abréviations utilisées : qq. : quelques ; pl. : plusieurs ; env. : environ ; + : plus de ; ind. : individu, ad. : adulte ; imm. : immature ; f. : femelle ; m. : mâle ; H1 : 1^{er} hiver ; nb. : nombreux

Sommaire :

- Principaux sites visités / conditions d'accès / intérêts ornithologiques
- Principales observations, espèce par espèce
- Principales observations, par jour et par site

Principaux sites visités / conditions d'accès / intérêts ornithologiques :

Hébergement à l'auberge de jeunesse de Bergen op Zoom ; renseignements disponibles sur le site Internet www.stayokay.com

EN ZUID-HOLLAND

HOEKSE WAARD

Polder Oudeland van Strijen

Accès par Strijen, au sud-ouest de Dordrecht. Rechercher le polder Oudeland à l'ouest du village (Molenweg notamment).

Intérêts : un des meilleurs sites de Hollande pour les **oies naines**, à chercher parmi des oies rieuses et des bernaches nonnettes. Un **pygargue à queue blanche** était signalé dans le secteur les jours précédents notre visite...

BEIJERLAND

Korendijkse Slikken (Goudswaard)

Accès par Zuid Beijerland (à l'ouest de Strijen), prendre la direction de Goudswaard. Les Korendijkse Slikken correspondent aux prés littoraux derrière la digue, à gauche de la route, au sud-ouest de Goudswaard.

Intérêts : rassemblements de **bernaches nonnettes** et d'oies cendrées. Une **Oie de Ross** y était signalée (une petite oie blanche a été vue de loin, mais le temps et la visibilité du soir (26.12) ne nous ont pas permis d'aller plus loin dans l'identification).

GOEREE – OVERFLAKKEE

(sites déjà visités par V. Palomares lors de plusieurs séjours en février)

Brouwersdam - côté Mer du Nord

Accès : digue séparant Goeree-Overflakkee de Schouwen, empruntée par la N57, entre Ouddorp et Zierikzee. Quitter la N57 au niveau de Port Zélande et se diriger vers les plages de la Mer du Nord (Noordzee Stranden). On peut rouler sur la digue, à proximité immédiate de la mer. L'extrémité sud de cette digue est très intéressante (zone de siphons brassant les eaux de la mer du nord et de la mer intérieure (Grevelingenmeer)), notamment à marée descendante... Au nord, notamment en cas de vent de secteur nord, une petite jetée formant une petite anse procure une zone d'eau plus calme propice à des observations rapprochées...

Intérêts : un des hauts lieux ornithologiques de Hollande, idéal pour observer (parfois très près de la digue) les **5 espèces de grèbes (jougris et esclavons faciles à voir)**, **2 ou 3 espèces de plongeurs (l'imbrin est régulier à cet endroit)**, des canards plongeurs par centaines ou par milliers, dont **régulièrement une quinzaine d'hareldes boréales** parmi des **macreuses noires**, des **eiders**, des **garrots**, des **fuligules milouinans** et des **harles huppés**... La digue est également très propice au **bécasseau violet**, à rechercher parmi les tournepierres... Le site est également favorable à l'observation de **laridés (et sternes) de passage** ; il a déjà accueilli de nombreuses espèces rares et occasionnelles...

Des **alcidés (guillemot de Troïl et Pingouin torda** surtout) sont couramment observés le long de la digue (partie sud notamment). Enfin, l'observation de **phoques gris et veau marin** dans la zone de siphons est assez régulière...

Des **phalaropes à bec large** y avaient été signalés vers la mi-décembre, avant notre arrivée...

Brouwersdam – côté Grevelingen Meer

Accès : au niveau de port Zélande, suivre la digue par la route parallèle vers le springersdiep (au nord) ou vers le middelplaat (au sud). Observer sur le Grevelingenmeer (mer intérieure).

Intérêts : **très belles concentrations de grèbes huppés** aux alentours du Middelplaat, les **5 espèces de grèbes** y sont observables, ainsi que des **plongeurs**, des **fuligules milouinans**, d'assez nombreux **harles huppés**, **quelques sternes caugeks en plein hiver**, mais également parfois des **phoques gris et veau marin** (traversant par la zone de siphons et atteignant ainsi le Middelplaat).

Potentiellement, notamment par grand vent, toutes les espèces signalées côté mer du nord peuvent y être observées (observations personnelles de guillemots le 26.12.1999, le jour de la fameuse tempête...)

Port de Stellendam (buitenhaven)

Accès : à partir de Stellendam, emprunter la N57 en direction de Rotterdam, puis suivre la direction Buitenhaven (par le Meester Snijderweg) et rejoindre la digue à l'extrémité nord-ouest du petit port. De là, observer dans le port ou sur les vasières (à marée montante si possible) de l'autre côté de la digue... Un bon secteur à passereaux nordiques est visible de l'autre côté du port, en contre bas de la digue traversant le Haringvliet (bras de mer). On peut y accéder à pied en se garant côté binnenhaven (de l'autre côté de la N57, à l'est), précisément vers le Haringvliet Expo, après avoir passé une petite écluse. Ensuite, marcher sous le pont, en empruntant une voie pavée pour atteindre ce secteur de friches jouxtant le petit port de pêche (buitenhaven).

Intérêts : bon secteur pour observer des **linottes à bec jaune** dans les secteurs de friches. Des **alouettes haussecols** y étaient également signalées lors de notre passage... Le port est favorable à l'observation de **grèbes** et de **canards marins**, parfois des **phoques** y sont aussi visibles (un veau marin lors de notre visite)... Rechercher également des espèces plus rares parmi les laridés... Sur les vasières, beaucoup de limicoles, de tadornes...

A noter que les plans d'eau intérieurs (au sud-ouest du port, Zuiderdiep notamment) sont favorables à l'observation de **harles bièvres et piettes**.

Plaat van Scheelhoek

Accès : à partir de Stellendam, emprunter la N215 en direction de Middelharnis ; juste à la sortie de Stellendam, dans un virage à droite, prendre une petite route à droite, à suivre vers l'est jusqu'à une plateforme d'observation située à une dizaine de mètres après le passage de la digue (buitendijk). De là, observer sur le canal (Zuiderdiep), les prés et les roselières au nord, face à la digue.

Intérêt : de belles **troupes d'oies cendrées et de bernaches nonnettes** notamment, y rechercher la **Bernache à cou roux**, régulièrement observée à cet endroit (et signalée lors de notre passage). Par contre, toutes les oies ne sont pas visibles et/ou identifiables depuis ce poste d'observation et pour celles plus à l'est, secteur inaccessible sans déranger, il faut attendre qu'elles daignent se rapprocher... Bon secteur pour l'observation de **harles** et de **rapaces** également, notamment des busards au-dessus des roselières. Troupes de **fuligules** et de **canards siffleurs** sur le canal, à fouiller...

Port d'Ouddorp

Accès : d'Ouddorp, prendre la N57 en direction de Zierikzee et rapidement à la sortie sud d'Ouddorp la direction d'Ouddorpsehaven (le port en question). Observer sur le Grevelingenmeer.

Intérêt : surtout intéressant par le fait que les **5 espèces de grèbes** peuvent être observées depuis le même poste d'observation. Pas mal de harles huppés également...

Polder Oudeland (Goedereede)

Accès : de Ouddorp prendre la direction du port (voir ci-dessus) et bifurquer à gauche (plein est) en empruntant la petite route longeant la digue (Oudelandse zeedijk), s'arrêter sur le bord de la route (Zuidweg et Jillesweg) et observer dans les prés et sur le Grevelingenmeer (notamment sur l'îlot proche de la digue).

Intérêt : de belles **troupes d'oies et de bernaches** (à fouiller), ainsi que de **pluviers dorés** et de **courlis cendrés** ; secteur assez riche en rapaces, y rechercher notamment la **buse pattue** et les **faucons émerillon et pèlerin**. Côté Grevelingenmeer, les rapaces sont à rechercher sur l'îlot et les **limicoles** sont nombreux...

Slikken van Flakkee

Accès : ensemble des prés littoraux (entretenus par des aurochs et des tarpans) à l'ouest de la digue entre Melissant et Herkingen, à l'ouest de Middelharnis. De nombreux arrêts sont nécessaires pour balayer la zone entièrement. Les secteurs les plus favorables se situent dans la zone centrale, accès par des impasses à l'ouest de Dirksland...

Intérêt : nombreuses troupes de **bernaches nonnettes** et de **pluviers dorés** ; secteur riche en rapaces, y rechercher notamment le **hibou des marais**, la **buse pattue**, les **faucons émerillon et pèlerin** ; le **pygargue à queue blanche** et même l'**aigle criard** y sont parfois observés...

EN ZEELAND

SINT PHILIPSLAND

Sint Philipsland (Krabben Kreek)

Accès par la N257 au nord-ouest de Steenberg, au nord de Bergen op Zoom. En entrant dans Sint Philipsland par l'est, prendre la route longeant la digue bordant le Krabben Kreek (bras de la mer intérieure « Oosterschelde »). Observation possible depuis la digue (marée montante doit être mieux, cela n'était pas notre cas...), plusieurs arrêts conseillés...

Intérêts : beaux rassemblements de **bernaches cravants**, de **limicoles (pluviers argentés, bécasseaux variables, huîtriers pies)**. Rien de vraiment particulier ne nous y avait été signalé.

Partie sud du Philipsdam

Accès par la N257 en direction de Zierikzee ou de Rotterdam en venant du site précédent. Le site correspond en fait à la digue empruntée par la N257. Observation possible depuis le bord de la route (possibilités de parking). Côté ouest : vasières plus ou moins découvertes selon la marée ; côté est : le Zoommeer, toujours en eau et présentant des îlots herbeux à ce niveau.

Intérêts : un **pygargue à queue blanche** y a été bien observé dans la partie est (signalé dans ce secteur et les Slikken van de Heen, encore un peu plus à l'est). D'après nos observations, un bon site pour les **cygnes de Bewick**, **grèbes esclavons** et **canards pilets** (...).

Partie est du Grevelingendam, à la jonction du Philipsdam

Accès à partir du site précédent, se diriger vers le nord en direction de Rotterdam et au niveau du carrefour avec la N59, prendre une petite route parallèle à la N59 en direction d'Oude Tonge. L'observation se fait depuis cette petite route, en regardant sur le Zoommeer...

Intérêts : nous y avons observé entre autres des **grèbes esclavons**, des cygnes chanteurs et des **fuligules milouinans**... Rien ne nous y avait été particulièrement signalé.

THOLEN

Stink Gat

Accès : en partant de Sint Philipsland, prendre la direction de Sint Annaland ; premiers polders sur la droite de la route après la bifurcation de la N257 pour Steenberg.

Intérêts : **Oie de Ross** de forme blanche, signalée et observée parmi des bernaches nonnettes...

SCHOUWEN

Serooskerke – Morianshoofd

Accès : de Zierikzee, emprunter la N59 en direction d'Ouddorp ; à hauteur du hameau de Moriaanshoofd (grand moulin en bord de route), un peu avant Serooskerke, inspecter les polders à droite et à gauche de la route. En fait, tout le secteur (polders et vasières) bordant la mer intérieure (Oosterschelde) entre Moriaanshoofd (à l'est) et Westschouwen (à l'ouest) est intéressant et à prospecter... Site qu'il est conseillé de visiter à marée montante...

Intérêts : **oies, canards de surface, limicoles...** Toutes les espèces d'oies y ont déjà été observées, une **oie naine** avant notre passage, puis une **bernache à cou roux** et une **oie à bec court** après notre retour en France...

WALCHEREN

Westkappelle

Accès : de Middelburg, emprunter la N288 en direction de Westkappelle. Sur place, nous avons traversé le village et nous sommes postés à côté du bar « Westkap », face à la mer, sur la digue. Ce site favorable au seawatch (pointe ouest des Pays-Bas) en Mer du Nord est à visiter si possible par vent de nord à ouest... Le site « officiel » est au lieu-dit Telpost (non trouvé).

Intérêts : observation en mer de déplacements d'oiseaux de mer : **plongeurs, fous de Bassan, alcidés, macreuses, labbes (Grand Labbe notamment), mouettes pygmées et tridactyles** ; les semaines précédant notre passage, avaient été observé un **goéland à ailes blanches**, des **plongeurs imbrins**, des **océanites culblancs** et des **phalaropes à bec large**... Bref, mieux vaut visiter le site par un bon vent de NW (ce qui n'était pas notre cas, mais nous n'étions tout de même pas déçus) !
En outre, la digue se prête à d'excellentes observations de **bécasseaux violets**.

NOORD BEVELAND

Katse Plaats (Zandkreek Dam)

Accès : de Goes, emprunter la N256 en direction de Zierikzee, s'arrêter sur le Zandkreekdam (digue pont) ou continuer jusqu'au carrefour suivant et rebrousser chemin sur une petite route parallèle à la nationale, pour atteindre la digue au nord-est du Zandkreekdam.

Intérêts : troupes de **bernaches cravants (à ventre sombre** déjà observée à cet endroit) et de **canards siffleurs, limicoles...** Nous y avons également observé une troupe de bruants des neiges en vol...

ZUID BEVERLAND

Yerseke

Accès : de Goes, prendre l'autoroute A58 jusqu'à la sortie n°33 (Yerseke). De là, gagner le village et se diriger dans les polders au nord-ouest, en direction de Kapelle (avant le pont au-dessus du canal). Inspecter les troupes d'oies dans les polders...

Intérêts : **troupes de bernaches et d'oies** ; y rechercher la **bernache à cou roux** notamment (signalée à cet endroit au cours de notre séjour)

Partie sud de l'Oesterdam

Accès : de Goes ou de Bergen op Zoom, prendre l'autoroute A58 jusqu'à la sortie n°31 (Rilland). De là, suivre la direction Tholen et accéder à l'Oesterdam (grande digue). Sur la digue, emprunter la petite route parallèle, à l'ouest. Faire des arrêts fréquents, inspecter les vasières, la digue et le canal.

Intérêts : site de prédilection connu de troupes de **bruants des neiges** (une observée dans la partie sud de la digue). Très beaux **rassemblements de limicoles**, notamment de **bécasseaux maubèches et variables**, des troupes de **bernaches cravants** et quelques **milouinans** sur le canal...

Principales observations, espèce par espèce :

Plongeon catmarin *Gavia stellata* : max de +340 posés en mer, observables dans de bonnes conditions de lumière depuis la digue de Brouwersdam, le 30 au matin où de nombreux petits groupes comptant parfois plusieurs dizaines d'oiseaux (beaucoup d'adultes) étaient visibles, déplacements en vol comptabilisant jusqu'à une centaine d'oiseaux ! Très belles observations ! Ailleurs : 15 en vol sud à Westkappelle le 29, où 1 H1 pêchait près de la digue, 1 ad à proximité du petit port de Stellendam le 30.

Plongeon arctique *Gavia arctica* : 1 H1 en pêche sur le Grevelingenmeer, bien observé depuis Brouwersdam (Port Zélande) le 27 ; 3 en vol sud le 29 à Westkappelle où 2 ad se sont arrêté pour pêcher ; 4 en mer, visibles depuis Brouwersdam le 30.

Plongeon sp. *Gavia sp.* : 1 le 28 au large de Brouwersdam (arctique/imbrin) et 19 en vol sud au large de Westkappelle le 29 au matin.

Grèbe castagneux *Tachybaptus rufficollis* : noté çà et là, en faibles effectifs, la dizaine d'ind. a été dépassée sur le Grevelingenmeer (port d'Ouddorp et Brouwersdam).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* : grandes bandes sur le Grevelingenmeer, avec notamment +4000 individus dans l'anse de la partie sud de Brouwersdam. (...)

Grèbe jougris *Podiceps griseigena* : 1 au port d'Ouddorp le 28 ; à Brouwersdam (côté mer, proches de la digue) 2 le 28 et 4 le 30 (dont 3 ensembles) ; 1 dans le port de Stellendam le 30.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus* : max de 13 au port d'Ouddorp le 28, de 11 à Brouwersdam (côté mer, proches de la digue) le 30, de 11 au sud du Philipsdam le 30 et de 10 à l'est du Grevelingendam. Sinon, 1 au sud de Philipsdam le 27, 2 sur le Grevelingenmeer (depuis Brouwersdam) le 27 et 1 le lendemain et 5 à Brouwersdam (côté mer) le 28.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* : max d'une dizaine le 27 sur le Grevelingenmeer depuis Brouwersdam, 7 au port d'Ouddorp le 28, 1 au sud du Philipsdam le 30.

Fou de Bassan *Sulla bassana* : 3 en vol S le 29 à Westkappelle.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* : noté çà et là, généralement en faibles effectifs, excepté dans le port de Stellendam où des centaines d'individus ont été notés les 28 et 30.

Grande aigrette *Egretta alba* : 2 le 26 dans les Korendijkse Slikken (Goudswaard), 2 au Plaat van Scheelhoek (Stellendam) le 30 (1 le 28).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* : belle série d'observations pour un oiseau très rare encore dans ce secteur il y a 7 ans... 3 à Sint Philipsland (Krabben Kreek), 1 à Serooskerke et 1 à Zierikzee le 27 ; 6 dans les Slikken van Flakkee et 2 au Polder Oudeland de Goedereede le 28 ; 1 au Stink Gat (Sint Annaland) le 30.

Héron cendré *Ardea cinerea* : çà et là en très faibles effectifs.

Cygne tuberculé *Cygnus olor* : çà et là en très faibles effectifs.

Cygne de Bewick *Cygnus bewickii* : au sud du Philipsdam, 6 ad le 27 et 13 (dont 7 ad.) le 30 ; dans les Slikken van Flakkee, 2 ad le 28 et 15 ad le 30.

Cygne chanteur *Cygnus cygnus* : 2 ad le 30 à la jonction entre le Grevelingendam et le Philipsdam (très belle observation).

Oie des moissons *Anser fabalis rossicus* : très peu d'observations... 1 le 26 entre Strijen et Strijensas ; 2 le 28 dans les Slikken van Flakkee.

Oie rieuse *Anser albifrons* : la plus grosse concentration au nord ouest de Yerseke le 29 : +4000 individus ; quelques centaines dans le Polder Oudeland van Strijen et les Korendijkse Slikken le 26 ; le 28, +400 dans les Slikken van Flakkee, +800 au Plaat van Scheelhoek...

Oie naine *Anser erythropus* : 32 ensembles dans le Polder Oudeland van Strijen (35 signalées), parmi des bernaches nonnettes et paradoxalement très peu d'oies rieuses. Large majorité d'adultes.

Oie cendrée *Anser anser* : max de +1000 au Plaat van Scheelhoek (Stellendam) le 30 ; régulièrement observée en groupes de plusieurs centaines d'individus : +300 au polder Oudeland van Strijen et +500 aux Korendijkse Slikken (Goudswaard) le 26 ; 550 à Sint Philipsland, +600 dans la partie sud du Philipsdam, 500 au Dijkwater, +500 aux alentours de Moriaanshoofd à Serooskerke le 27 ; env. 600 au sud de l'Oesterdam le 29 (...).

Oie de Ross *Anser rossii* : 1 de forme blanche parmi +1500 bernaches nonnettes au Stink Gat à l'est de Sint Annaland le 30.

Bernache du Canada *Branta canadensis* : 13 de grande taille au sud du Philipsdam le 27 et 2 à priori de la race *huntchinsii*, parmi des bernaches nonnettes (taille similaire) au Plaat van Scheelhoek (Stellendam) le 30.

Bernache nonnette *Branta leucopsis* : max de +11000 dans les Slikken van Flakkee le 28 ; régulièrement observée en troupes plus ou moins importantes... A noter, parmi les plus grandes troupes, +8000 aux Korendijkse Slikken (Goudswaard) le 26, +4000 à Serooskerke le 27, +1000 à Yerseke le 29, +1500 au Stink Gat (Sint Annaland) et +3500 au Plaat van Scheelhoek (Stellendam) le 30...

Bernache cravant *Branta bernicla* : régulièrement observée en troupes plus ou moins importantes... A noter parmi les plus grandes troupes, un max. de +1800 au Krabben Kreek à Sint Philipsland le 27, +1400 aux alentours de Serooskerke le 27, +800 dans les Slikken van Flakkee le 28, + 600 au Katse Plaat, +1000 à Yerseke et +1000 au sud de l'Oesterdam le 29...

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiacus* : observations régulières dans les champs ou les labours ; à noter un max. de 82 dans un même champ le 30 à Oude Tonge et de 30 dans un labour le 27 au Dijkwater.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* : observations régulières, à noter : +450 au Krabben Kreek à Sint Philipsland, +300 au sud du Philipsdam le 27 ; 370 dans les Slikken van Flakkee le 28 (...).

Canard siffleur *Anas penelope* : observations régulières, à noter +4000 à Serooskerke le 27, +2000 au Katse Plaat le 29, +1000 à Yerseke le 29 (...).

Canard chipeau *Anas strepera* : peu noté ; max de 300 dans le port de Stellendam les 28 et 30.

Sarcelle d'Hiver *Anas crecca* : peu notée ; quelques individus aux Korendijkse Slikken le 26, à Serooskerke le 27, au Katse Plaat le 29 et au Plaat van Scheelhoek le 30.

Canard colvert *Anas platyrhynchos* : nombreux individus, non comptés, mais souvent en moins grand nombre que les siffleurs.

Canard pilet *Anas acuta* : observations régulières en bordure de slikken et de vasières ; max dans la partie sud du Philipsdam : 210 le 27 et 110 le 30.

Canard souchet *Anas clypeata* : assez peu noté ; max de 180 dans la partie sud du Philipsdam et de 150 à Serooskerke le 27.

Fuligule milouin *Aythya ferina* : peu d'observations, surtout noté au Philipsdam.

Fuligule morillon *Aythya fuligula* : observations dans les ports ou sur des canaux ; pas de très grandes troupes.

Fuligule milouinan *Aythya marila* : quelques petits groupes çà et là... Max de 42 au Grevelingendam le 30, 3 imm sur le canal bordant l'Oesterdam le 29, quelques individus à Brouwersdam le 28 et 5 à Serooskerke le 27.

Eider à duvet *Somateria mollissima* : max de +350 à Brouwersdam le 30 (+100 le 28) et quelques individus dans le port de Stellendam le 30.

Harelde boréale *Clangula hyemalis* : 13 à Brouwersdam le 30 (dont 5 m. ad. et 2 m. imm), très bien observés depuis la digue, assez près du bord.

Macreuse brune *Melanitta fusca* : 1 m. en vol S à Westkappelle le 29.

Macreuse noire *Melanitta nigra* : max de +1800 à Brouwersdam le 30 ; à noter 135 en vol S à Westkappelle le 29.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* : observations régulières ; max de +800 à Brouwersdam le 30. Groupes de quelques individus à plusieurs dizaines sinon.

Harle piette *Mergus albellus* : 1 f. les 28 et 30 dans le port de Stellendam.

Harle huppé *Mergus serrator* : observations très régulières en bord de mer ; max de 180 au port d'Ouddorp le 28, de 130 à Brouwersdam, côté Grevelingenmeer le 27, de +100 dans la partie sud de l'Oesterdam le 29 et à Brouwersdam le 30.

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* : 1 immature de 1^{er} Hiver en vol et posé sur les îlots à l'est de la partie sud du Philipsdam le 27 (côté Slikken van de Heen).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : 1 f en vol au-dessus des vasières de la partie sud de l'Oesterdam le 29 et 3 en vol au-dessus des roselières du Plaat van Scheelhoek le 30.

Busard St Martin *Circus cyaneus* : quelques rares observations : 1 f. au Slikken van de Heen le 27, 1 f. au Katse Plaat le 29 et un couple au Plaat van Scheelhoek le 30.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus* : noté le 28 à Stellendam...

Buse variable *Buteo buteo* : observations régulières dans les polders et les slikken.

Buse pattue *Buteo lagopus* : 1 f. ad. le 28, accompagnée d'un autre adulte le 30, dans les Slikken van Flakkee.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* : observations régulières dans les polders et les slikken.

Faucon émerillon *Falco columbarius* : 1 f/imm en vol au-dessus du Grevelingenmeer (Brouwersdam) le 27 et 1 f/imm au Plaat van Scheelhoek le 30.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : observations régulières (uniquement des adultes, très souvent posés à terre) : 1 à Sint Philipsland, 1 dans la partie sud du Philipsdam et 1 à Serooskerke le 27, 1 dans les Slikken van Flakkee et 1 au Polder Oudeland le 28, 1 au Katse Plaat et 1 à Yerseke le 29, 1 dans es Slikken van Flakkee et 1 au sud du Philipsdam le 30.

Perdrix grise *Perdrix perdrix* : quelques observations dans les polders ; max de +20 à Serooskerke le 27.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* : observations régulières dans les polders en bord de route.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus* : observations très régulières, parfois d'individus étonnamment citadins, notamment sur les trottoirs, platebandes et ronds-points de Goes... Petites troupes d'un dizaine à une quinzaine d'individus parfois.

Foulque macroule *Fulicula atra* : observations régulières sur les canaux, dans les prés au bord de l'eau et certains petits ports...

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* : observations très régulières sur les vasières mais aussi parfois d'individus en zone urbaine à suburbaine... Max de +5000 à Sint Philipsland le 27.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : quelques observations de petits groupes sur des vasières : 35 à Sint Philipsland et 70 à Serooskerke le 27, 3 dans les Slikken van Flakkee, 45 au port de Stellendam le 28, 9 au Katse Plaat et 35 au sud de l'Oesterdam le 29, 40 au port de Stellendam et 4 au Philipsdam le 30.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* : très peu noté, +40 à Sint Philipsland le 27 et +100 au Katse Plaat le 29.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : observations régulières dans certains polders et dans les Slikken ; 150 aux Korendijkse Slikken le 26, 250 au Philipsdam et 70 à Serooskerke le 27, max de +500 dans les Slikken van Flakkee et de +700 au Polder Oudeland le 28...

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* : noté sur les vasières ; max de +800 à Sint Philipsland le 28, 40 à 60 individus sur les autres sites où l'espèce a été observée.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* : observations régulières de troupes de quelques dizaines à quelques centaines d'individus dans les polders et les slikken.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : uniquement observé dans la partie sud de l'Oesterdam le 29, mais il s'agissait d'un groupe important : +1400 rassemblés sur une vasière.

Bécasseau sanderling *Calidris alba* : max de +20 au Philipsdam le 27, 8 à Westkappelle le 29, 5 à Brouwersdam le 30.

Bécasseau variable *Calidris alpina* : régulièrement observé sur les vasières ; max de +3000 à Sint Philipsland le 27, nombreux sur les vasières bordant l'Oesterdam et +600 au Katse Plaat le 29.

Bécasseau violet *Calidris maritima* : observé sur le littoral de la mer du Nord avec notamment une belle troupe de 36 individus à Westkappelle le 29 ; 2 à Brouwersdam les 28 et 30.

Combattant varié *Philomachus pugnax* : 3 à Serooskerke le 27 et 8 au Stink Gat le 30.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* : 3 à Serooskerke le 27.

Barge rousse *Limosa lapponica* : +50 à Sint Philipsland et 10 à Serooskerke le 27, 1 à Brouwersdam le 30.

Courlis cendré *Numenius arquata* : observations très régulières, aussi bien sur les vasières, que dans les polders ou en zone suburbaine et en bord de route... Des centaines d'individus au Philipsdam, à Serooskerke et à l'Oesterdam.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* : 4 à Sint Philipsland le 27 et 1 dans les Slikken van Flakkee le 28.

Chevalier gambette *Tringa totanus* : observations très régulières sur le bord des mers intérieures...

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* : 1 au Polder Oudeland le 28.

Tournepiere à collier *Arenaria interpes* : observations régulières aux abords de la Mer du Nord : 3 à Sint Philipsland le 27, une 40aine à Brouwersdam, noté dans le port de Stellendam les 28 et 30, 8 à Westkappelle le 29...

Grand Labbe *Stercorarius skua* : 1 en vol S à Westkappelle le 29.

Labbe sp. *Stercorarius sp* : 2 en vol S à Westkappelle le 29. Un probable grand labbe, suivi d'un probable parasite...

Mouette pygmée *Larus minutus* : 1 ad dans le port de Stellendam et 3 (1 ad et 2 H1) à Brouwersdam le 28, 17 en vol S à Westkappelle le 29, 1 ad à Brouwersdam le 30.

Mouette rieuse *Larus ridibundus* : observations régulières...

Goéland cendré *Larus canus* : observations régulières, notamment en troupes plus ou moins importantes dans les polders et certains labours.

Goéland argenté *Larus argentatus* : observations régulières, notamment sur le littoral...

Goéland leucophée *Larus cachinnans michaellis* : 15 dans la partie sud de l'Oesterdam le 29.

Goéland marin *Larus marinus* : observations régulières, notamment sur le littoral...

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* : 70 (ad + H1) en vol S à Westkappelle le 29.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis* : 4 à Brouwersdam (Middelplaat, côté Grevelingenmeer) les 27 et 28.

Guillemot de Troïl *Uria aalge* : 2 le 28 et 3 le 30 à Brouwersdam, près (voire très près) de la digue ; 7 en vol S à Westkappelle le 29.

Pingouin torda *Alca torda* : 1 en vol S à Westkappelle le 29 et 1 assez près de la digue, à Brouwersdam le 30.

Alcidé sp. *Uria/Alca* : 1 en mer le 28 à Brouwersdam et 4 en vol S à Westkappelle le 29.

Pigeon colombin *Columba oenas* : noté assez régulièrement dans les polders

Pigeon ramier *Columba palumbus*

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

Chouette hulotte *Strix aluco* : 1 entendu le 27 au matin à l'auberge de jeunesse de Goes.

(à noter que notre attention et notre intérêt ne se sont que rarement portés sur les passereaux, ce qui explique entre autres, la faible diversité de la liste qui suit...)

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

Pipit maritime *Anthus petrosus* : notamment autour de Sint Philipsland le 27...

Accenteur mouchet *Prunella modularis*

Rougegorge familier *Erithacus rubecula*

Merle noir *Turdus merula*

Grive litorne *Turdus pilaris*

Grive draine *Turdus viscivorus*

Grive mauvis *Turdus iliacus*

Mésange bleue *Parus caeruleus*

Mésange charbonnière *Parus major*

Pie bavarde *Pica pica*

Choucas des tours *Corvus monedula*

Corneille noire *Corvus corone*

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

Moineau domestique *Passer domesticus*

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris* : 39 bien observées dans une friche du petit port de Stellendam le 30.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* : 21 en vol au Katse Plaat et 34 bien observés sur la digue, dans la partie sud de l'Oesterdam le 29.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

Phoque veau marin : 1 très bien observé dans le port de Stellendam le 30 et 1 à Brouwersdam le 27.

Principales observations, par jour et par site :

Le 26.12.2003

Polder Oudeland van Strijen : qq cygnes tuberculés, 1 oie des moissons (rossicus), qq oies rieuses, 300+ cendrées, 32 oies naines (majorité d'adultes) parmi plus de 3000 bernaches nonnettes, 4 ouettes d'Egypte, canards colverts, +300 siffleurs, buse variable, faucon crécerelle, faisans de Colchide, poules d'eau, 15 courlis cendrés, goélands cendrés, mouettes rieuses, pigeons colombins, ramiers, corneilles noires...

Korendijkse Slikken (Goudswaard) – Nieuwendijk : qq grèbes huppés, 2 grandes aigrettes, pl. 100aines d'oies rieuses, +500 oies cendrées (1 hybride o.cendrée-b. du Canada), +8000 bernaches nonnettes, 5 ouettes d'Egypte, +200 canards siffleurs, canards colverts, 2 canards souchets, qq sarcelles d'hiver, fuligules morillons, vanneaux huppés, 150 pluviers dorés, buse variable, faucon crécerelle, poules d'eau (un gp de +20 ind.), mésange charbonnière, rougegorge, lièvres...

Le 27.12.2003

Sint Philipsland (Krabben Kreek) : qq grèbes huppés et castagneux, grands cormorans, 3 aigrettes garzettes, 550 oies cendrées, +1800 bernaches cravants, +300 canards siffleurs, +450 tadornes de Belon, 65 canards pilets, +60 garrots à œil d'or, env. 10 harles huppés, 1 faucon pèlerin ad. posé, faisans de Colchide, +5000 huîtres pies, +100 courlis cendrés, +50 barges rousses, 35 avocettes élégantes, +40 grands gravelots, +800 pluviers argentés, 3 tournepierres à collier, +3000 bécasseaux variables, 60 chevaliers gambettes, 4 chevaliers arlequins, goélands cendrés, marins et argentés, pigeons colombins, 5 pipits maritimes

Sint Philipsland, au nord (Mastgat Zijpe) : 450 bernaches cravants, 28 oies rieuses en vol, 2 tadornes de Belon, 190 canards siffleurs, 7 canards pilets, 15 garrots à œil d'or, env. 15 harles huppés, env. 20 gambettes, env. 20 pluviers argentés (...).

Partie sud du Philipsdam : grèbes huppés, 1 grèbe esclavon, +600 oies cendrées, 6 cygnes de Bewick ad., +500 bernaches cravants, 5 bernaches nonnettes, 13 bernaches du Canada (ssp de gde taille), env. 300 tadornes de Belon, 210 canards pilets, 180 souchets, +400 siffleurs, 10 chipeaux, qq fuligules milouins et morillons, env. 70 garrots à œil d'or, 1 pygargue à queue blanche H1 en vol et posé sur les îlots, 1 faucon pèlerin ad. posé, 650 huîtres, +20 bécasseaux sanderlings, env. 100 bécasseaux variables, env. 250 pluviers dorés, env. 170 courlis cendrés, env. 60 pluviers argentés, qq chevaliers gambettes, bruants des roseaux.

Dijkwater : 500 oies cendrées, env. 30 ouettes dans un labour, qq. canards chipeaux, env. 20 courlis cendrés.

Brouwersdam – côté Grevelingen Meer : 1 plongeon arctique H1, +4000 grèbes huppés, 2 grèbes esclavons, env. 15 grèbes à cou noir, canards siffleurs, env. 130 harles huppés, env. 130 garrots à œil d'or, 7 fuligules milouins en vol, 1 faucon émerillon f/imm. en vol, huîtres pies de partout, 4 sternes caugeks, qq. goélands marins, 1 phoque veau marin (...)

Serooskerke – Morianshoofd : 2 aigrettes garzettes, +500 oies cendrées, qq. rieuses, +4000 bernaches nonnettes, env. 1400 cravants, 150 canards souchets, +4000 siffleurs, chipeaux, colverts, sarcelles d'hiver, +40 pilets, 5 fuligules milouins, qq. harles huppés, 1 faucon pèlerin ad. posé, +20 perdrix grises, faisans de Colchide, qq. tournepierres, env. 20 chevaliers gambettes, 10 barges rousses, env. 70 pluviers dorés, +60 argentés, 3 combattants variés, env. 70 avocettes élégantes, 3 bécassines des marais, nb. Courlis cendrés, pigeons colombins (...).

Le 28.12.2003

Slikken van Flakkee : 6 aigrettes garzettes, 2 cygnes de Bewick ad., +400 oies rieuses, 2 oies des moissons (rossicus), pl. 100aines d'oies cendrées, +11000 bernaches nonnettes, 800 cravants, 2 ouettes d'Egypte, 370 tadornes de Belon, pl. 100aines de canards siffleurs, qq. souchets et pilets, 1 épervier d'Europe, 1 buse pattue f. ad., qq. buses variables et faucons crécerelles, 1 faucon pèlerin ad., env. 100 courlis cendrés, +500 pluviers dorés, qq. chevaliers gambettes, 1 chevalier arlequin, 3 avocettes élégantes, huîtres pies, goélands cendrés, argentés et marins, pigeons colombins et ramiers, mésanges bleues, accenteurs mouchets, étourneaux sansonnets, grives litornes, bruants des roseaux, lièvres, chevreuils, ...

Port de Stellendam : grèbes huppés et castagneux, grands cormorans, hérons cendrés, qq. oies cendrées, tadornes de Belon, canards colverts, siffleurs, chipeaux, fuligules morillons, qq. garrots à œil d'or, harles huppés, 1 harle piette f., 1 épervier d'Europe, qq. huîtres pies, tournepierres à collier, env. 45 avocettes élégantes, goélands cendrés et argentés, mouettes rieuses, 1 mouette pygmée ad., grives litornes, pies bavardes, pinsons des arbres, merles noirs...

Plaat van Scheelhoek (passage rapide durant une averse) : 1 grande aigrette, +800 oies rieuses, +600 cendrées, nb bernaches nonnettes, nb. canards siffleurs, tadornes de Belon, courlis cendrés...

Port d'Ouddorp : 13 grèbes esclavons, 7 grèbes à cou noir, 1 grèbe jougris, grèbes huppés et castagneux, grands cormorans, 3 aigrettes garzettes, +180 harles huppés, qq. garrots à œil d'or, goélands argentés, cendrés et marins, 1 accenteur mouchet, ...

Polder Oudeland (Goedereede) : qq. hérons cendrés, oies cendrées et rieuses, 1 oie à tête barrée, bernaches cravants et nonnettes, 2 ouettes d'Egypte, nb. canards siffleurs et colverts, qq. pilets, qq. buses variables, 1 faucon pèlerin ad., poules d'eau et foulques, qq. bécasseaux variables, +700 pluviers dorés, vanneaux huppés, courlis cendrés, qq. chevaliers gambettes, 1 chevalier aboyeur, +100 bécasseaux variables, ...

Brouwersdam, côté Mer du Nord (vent, observation en mer difficile) : 1 plongeon sp. en vol, 5 grèbes esclavons, 2 grèbes jougris, grèbes huppés, qq. fuligules milouinans, +100 eiders à duvet, env. 20 macreuses noires, env. 50 garrots à œil d'or, harles huppés, qq. huîtres pies, env. 10 tournepierres à collier, 2 bécasseaux violets, goélands cendrés, argentés et marins, 3 mouettes pygmées (1ad. + 2H1), 2 guillemots de Troïl près de la digue, 1 alcidé sp. en vol, ...

Brouwersdam, côté Grevelingen Meer : 1 grèbe esclavon, nb. huppés, qq. castagneux, bernaches cravants, harles huppés, 3 sternes caugeks, ...

Le 29.12.2003

Westkappelle, seawatch de 8h30 à 10h30 (oiseaux en en vol sud) : 19 plongeurs sp., 15 plongeurs catmarins + 1H1 en pêche, 3 plongeurs arctiques, qq. grèbes huppés et grands cormorans en stationnement, 3 fous de Bassan ad., 135 macreuses noires, 1 macreuse brune m., 4 harles huppés, 1 grand labbe, 2 labbes sp. (1 probable grand labbe et 1 probable parasite), 70 mouettes tridactyles, 17 mouettes pygmées, 7 guillemots de Troïl, 1 pingouin torda, 4 alcidés sp.
A noter sur la digue : huîtres pies, 36 bécasseaux violets, 8 sanderlings, +10 tournepierres...

Katse Plaat (Zandkreek Dam) : +600 bernache cravants, 130 tadornes de Belon, qq. canards pilets, +2000 canards siffleurs, qq. sarcelles d'Hiver, +50 garrots à œil d'or, +50 harles huppés, 1 busard St Martin f., 1 faucon pèlerin ad. en vasière, huîtres pies, 9 avocettes élégantes, +100 grands gravelots, +50 pluviers argentés, +600 bécasseaux variables, qq. chevaliers gambettes, courlis cendrés, qq. tournepierres à collier, 21 bruants des neiges en vol...

Yerseke (près au nord-ouest du village) : +4000 oies rieuses, env. 100 cendrées, +1000 bernaches cravants, env. 100 nonnettes, +1000 canards siffleurs, qq. chipeaux, pilets, souchets, qq. fuligules morillons, qq. buses variables et faucons crécerelles, 1 faucon pèlerin ad. posé sur un buisson, 8 perdrix grises, faisans, poules d'eau, courlis cendrés, vanneaux huppés, choucas des tours...

Partie sud de l'Oesterdam : env. 600 oies cendrées, qq. rieuses et bernaches nonnettes, +1000 cravants, tadornes de Belon, fuligules morillons, 3 milouinans imm. sur le canal, qq. garrots à œil d'or, +100 harles huppés, qq. buses variables, 1 busard des roseaux f., huitriers pies, +1400 bécasseaux maubèches, nb. variables, 35 avocettes élégantes, pluviers argentés, +40 chevaliers gambettes, nb. courlis cendrés, mouettes rieuses, goélands argentés, cendrés, marins, 15 leucophées, 34 bruants des neiges bien observés sur la digue, ...

Le 30.12.2003

Brouwersdam, côté Mer du Nord (très peu de vent, mer calme) : +340 plongeurs catmarins en mer, 4 plongeurs arctiques, 4 grèbes jougris, 11 grèbes esclavons, qq. huppés, 100aines de canards siffleurs, 13 hareldes boréales (dont 5 m. ad. et 2 imm.), +350 eiders à duvet, +1800 macreuses noires, +800 garrots à œil d'or, env. 100 harles huppés, 1 barge rousse, 2 bécasseaux violets, 5 sanderlings, +40 tournepierres à collier, qq. chevaliers gambettes, huitriers pies, 1 mouette pygmée ad., 3 guillemots de Troil, 1 pingouin torda, 4 phoques sp. sur un banc de sable au large, ...

Port de Stellendam : 1 plongeur catmarin ad., 1 grèbe jougris, qq. huppés et castagneux, pl. 100aines de grands cormorans, tadornes de Belon, canards siffleurs, qq. pilets, env. 300 chipeaux, fuligules morillons, qq. eiders à duvet, garrots à œil d'or, 1 harle piette f., +500 huitriers pies, env. 40 avocettes élégantes, pluviers argentés, nb. bécasseaux variables, tournepierres à collier, chevaliers gambettes, 1 pipit farlouse, 39 linottes à bec jaune bien observées dans une friche du petit port, 1 phoque veau marin bien observé dans le petit port.

Plaat van Scheelhoek : hérons cendrés, oies rieuses, +1000 cendrées, +3500 bernaches nonnettes, 2 bernaches du Canada (race d'Hutchinson), tadornes de Belon, canards siffleurs, pilets, souchets, sarcelles d'hiver, fuligules morillons, garrots à œil d'or, qq. buses variables, 3 busards des roseaux, 2 busards St Martin (1 couple), 1 faucon émerillon f/imm. en chasse, qq. crécerelles, vanneaux huppés, courlis cendrés, ...

Slikken van Flakkee : 15 cygnes de Bewick ad., oies rieuses et cendrées, 1000ers de bernaches nonnettes, 100aines de cravants, tadornes de Belon, canards siffleurs, qq. pilets, qq. buses variables, 2 buses pattues ad (dont 1 f.), 1 faucon pèlerin ad. posé à terre, vanneaux huppés, courlis cendrés, pigeons colomains, chevreuils, lièvres, ...

Oude Tonge : 82 ouettes d'Egypte dans un champ.

Grevelingendam – portion est : 10 grèbes esclavons, 1 grèbe à cou noir, 2 cygnes chanteurs ad., 42 fuligules milouinans, garrots à œil d'or, (...)

Philipsdam – partie sud : 11 grèbes esclavons, 1 aigrette garzette, 13 cygnes de Bewick (7 ad.), oies cendrées, bernaches cravants, tadornes de Belon, 110 canards pilets, souchets, garrots à œil d'or, 1 faucon pèlerin ad., 4 avocettes élégantes, bécasseaux variables, pluviers argentés, courlis cendrés, vanneaux huppés, qq. chevaliers gambettes

Stink Gat (Sint Annaland) : 1 aigrette garzette, 1 oie de Ross (forme blanche), +1500 bernaches nonnettes, 8 combattants variés (...).