

Observations ornithologiques réalisées aux Açores du 10 au 20 octobre 2010



Bruant de Lincoln, Vila Nova do Corvo, 12-10-2010

Île de CORVO du 11 au 18 octobre

Île de TERCEIRA les 11, 18, 19 et 20 octobre

Trajets inter-îles et Europe-Açores les 10, 18 et 20 octobre (avec arrêts sur les îles de Faial et de Flores)

Hugues DUFOURNY (hdufournyornitho@yahoo.fr) (texte & photos) & Kris DE ROUCK (kris.de.rouck@skynet.be) (photos) - BELGIQUE

N.B. : Les nombres relatifs au nombre de données pour les espèces les plus rares sont déduits à partir de l'information trouvée sur le site « Birding Azores » le 21-11-2010 et sont sujets à d'éventuels ajustements ultérieurs en cas d'ajouts de données tardives.

Cory's Shearwater - Puffin cendré *Calonectris diomedea* :

Espèce très commune, particulièrement sur les côtes de Corvo où des centaines d'oiseaux se rassemblent chaque soir, p. ex. devant les moulins. Elle était particulièrement abondante au long de la côte orientale de l'île par vent de nord-est fort le 17-10.

Great Shearwater - Puffin majeur *Puffinus gravis* :

- Corvo, côte sud-ouest, 18-10 : au moins 2 ex. parmi les Puffins cendrés observés d'assez loin par Kris.
Le 17-10, par vent de nord-est soufflant fort, d'autres observateurs ont observé plusieurs dizaines de Puffins majeurs.

Northern Gannet - Fou de Bassan *Morus bassanus* :

- Corvo, 12 & 18-10 : 1 adulte parmi les Puffins cendrés.

Double-crested Cormorant - Cormoran à aigrettes *Phalacrocorax auritus* :

- Corvo, côte sud-ouest, 12 & 13-10 : 1 immature de premier hiver.

Belles observations de ce visiteur néarctique qui pêchait dans les eaux très tumultueuses de la côte sud-ouest de Corvo. Cet individu était étonnamment farouche pour un cormoran, ne tolérant pas d'être approché par les observateurs. A la moindre tentative, il décollait et s'éloignait au long de la côte ouest, inaccessible ! La peau faciale nue orange est particulièrement remarquable. Il s'agirait du cinquantième individu observé dans les Açores.



Great Cormorant - Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* :

- Terceira, Praia da Vitoria, baie, 19-10 : 1 immature de premier hiver.

Cet oiseau peu actif était posé dans la baie de Praia da Vitoria parmi un groupe de Goélands leucophées. Il s'agirait seulement du onzième individu pour les Açores.

Little Egret - Aigrette garzette *Egretta garzetta* :

- Terceira, Paul da Praia, 20-10 : maximum de 4 ex.
- Terceira, près de Lagoa do Junco, 19-10 : 1 ex.



Grey Heron - Héron cendré *Ardea cinerea* :

Au moins 1 ex. présent sur Corvo, vu çà et là, et 1 ex. dans le secteur de Paul da Praia, Praia da Vitoria, sur Terceira.

Great Blue Heron – Grand Héron *Ardea herodias* :

- Terceira, Paul da Praia et environs, 11, 19 & 20-10 : 1 adulte.

Cet oiseau est présent depuis longtemps ici et l'observer ne s'avéra pas difficile. Curieusement, il avait l'habitude d'ignorer le site humide de Paul da Praia pour lui préférer les balustrades métalliques des gros réservoirs à carburant qui dominant le site du côté nord ... Un environnement peu esthétique que l'oiseau ne quittait quasiment jamais tant il semblait apprécier d'y rester posé pendant des heures ! Il s'agirait du vingt-sixième individu pour les Açores.

Eurasian Teal - Sarcelle d'hiver *Anas crecca* :

- Corvo, près de Ribeira do Poço de Agua, 13-10 : 2 femelles en vol.
- Terceira, près de Lagoa do Junco, 19-10 : 1 femelle.

Blue-winged Teal - Sarcelle à ailes bleues *Anas discors* :

- Corvo, Ribeira da Ponte, 11-10 : 1 ex.
- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 19-10 : 1 ex.

Si l'observation à Terceira fut classique, celle de Corvo ne le fut pas car cet oiseau se laissait approcher à deux mètres, visiblement affaibli et non-concerné par la présence d'admirateurs bipèdes ! Il se nourrissait dans les mares de la « ribeira ».



Ring-necked Duck - Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* :

- Terceira, Paul da Praia, 11 & 19-10 : respectivement 3 ex. (1 mâle et 2 femelles) et 1 femelle.

Ces oiseaux passaient le plus clair de leur temps à dormir, tête enfouie dans le plumage. La femelle fut quand même vue « en entier » lors de la dernière observation.

harrier sp. - busard sp. *Circus* sp. :

- Terceira, près de Paul da Praia, 19-10 : 1 ex. « ringtail » en vol.

Observation très brève d'un busard de type femelle/jeune (ringtail) en vol au sommet de la colline qui domine le site de Paul da Praia avant de disparaître aussi vite derrière celle-ci ... Très frustrant ! D'après la légèreté du vol et de la silhouette, il s'agissait d'un oiseau de type *pygargus/macrourus*. Il n'existe qu'une seule donnée du Busard cendré dans les Açores et aucune du Busard pâle.

Eurasian Buzzard - Buse variable *Buteo buteo* :

- Terceira, Paul da Praia, 19 & 20-10 : respectivement 3 et 1 ex. en vol.
- Terceira, près de Lagoa do Junco, 19-10 : 1 ex. posé sur un poteau.



Peregrine Falcon - Faucon pèlerin *Falco peregrinus* :

- Corvo, Vila Nova do Corvo, 13-10 : 1 juvénile/immature de premier hiver en vol.

Cet oiseau immature a survolé pendant quelques minutes le site des Orioles de Baltimore. Son plumage présentait une couleur de fond assez roussâtre et pas de calotte claire, ce qui exclut au moins la sous-espèce néarctique *tundrius*. Il s'agirait du vingt-septième individu pour les Açores.

Quail - Caille des blés *Coturnix coturnix* :

- Corvo, pentes de colline entre Pico et la caldeira, 12-10 : 2 ex. levés.
- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 19-10 : 1 ex. levé.

A remarquer car très peu banal : un des 2 ex. levés à Corvo était entièrement blanc !

Common Moorhen - Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* :

- Terceira, Paul da Praia, 19-10 : maximum de **17** ex. dont une proportion élevée de juvéniles.
- Terceira, Lagoa do Ginjal, 19-10 : 2 ex.

Eurasian Coot - Foulque macroule *Fulica atra* :

- Terceira, Paul da Praia, 19-10 : maximum de 6 ex.

Northern Lapwing - Vanneau huppé *Vanellus vanellus* :

- Corvo, aérodrome, 18-10 : 1 ex.

Un des premiers arrivés avec le fort vent de nord-est, ce vanneau huppé s'est posé sur l'aérodrome un peu avant que nous quittions Corvo.

American Golden-Plover - Pluvier bronzé *Pluvialis dominica* :

- Corvo, pentes de colline en-dessous du réservoir, 15 & 16-10 : 1 juvénile.

Belle observation en compagnie de l'espèce suivante, ce qui a permis une intéressante comparaison des plumages et des silhouettes. Avec quarante-huit observations antérieures à celle-ci, ce limicole d'origine néarctique est presque deux fois plus commun dans les Açores que son parent européen.



European Golden-Plover - Pluvier doré *Pluvialis apricaria* :

- Corvo, pentes de collines en-dessous du réservoir, 15 & 16-10 : 1 adulte. Il s'agirait du vingt-neuvième individu pour les Açores.

Grey Plover - Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* :

- Flores, Santa Cruz das Flores, 18-10 : 2 ex.
- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 19-10 : maximum de 9 ex.

Ringed Plover - Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* :

- Terceira, 19-10 : maximum de 6 ex.

Semipalmated Plover - Gravelot semipalmé *Charadrius semipalmatus* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 18 et 19-10 : respectivement 1 et 2 ex.

Identification assez aisée grâce au trait blanc au-dessus des commissures du bec et au bec très court. Le cri, fréquemment émis, rappelle à la fois le Chevalier arlequin *Tringa erythropus* et le Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*. Le 19-10, un des deux oiseaux a plusieurs



fois émis le chant de l'espèce est s'est montré agressif vis-à-vis de l'autre oiseau, comme un individu territorial ! Espèce rare mais très régulière aux Açores.

Kentish Plover - Gravelot à collier interrompu
Charadrius alexandrinus :

- Terceira, Cabo da Praia, port, 19-10 : maximum de **103** ex.

L'espèce était aussi très commune mais ne fut pas dénombrée à la carrière de Cabo da Praia et sur les plages de Terceira. Pas vu à Corvo.

Eurasian Woodcock - Bécasse des bois Scolopax rusticola :

- Corvo, colline au-dessus de la station électrique, 14-10 : 1 ex. levé dans les genévriers.

- Flores, Santa Cruz das Flores, près de l'aérodrome, 18-10 : 1 ex.

Common Snipe - Bécassine des marais Gallinago gallinago :

- Corvo, aux alentours du réservoir, 14-10 : 3 ex.
- Corvo, au-dessus de la station électrique, 15-10 : 1 ex.
- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 19-10 : 2 ex.
- Terceira, Lagoa do Ginjal, 19-10 : 3 ex.

Si les trois premières observations se rapportent sans aucun doute à des Bécassines des marais, la quatrième observation devrait plutôt être classée comme « B. des marais ou de Wilson » car les trois oiseaux ne furent vus que posés de loin. Leur plumage à dominante brune incitait cependant à en faire des Bécassines des marais aussi.

Black-tailed Godwit - Barge à queue noire *Limosa limosa* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 18 & 19-10 : un groupe de respectivement **36** et 33 ex.

Bar-tailed Godwit - Barge rousse *Limosa lapponica* :

- Terceira, Praia da Vitoria, près du port de plaisance, 20-10 : 1 ex.

Eurasian Whimbrel - Courlis corlieu *Numenius phaeopus* :

- Corvo, côte sud-ouest, 13 & 18-10 : respectivement 2 et 1 ex.
- Terceira, Cabo da Praia, carrière et champs au-dessus de la carrière, 19-10 : minimum de 6 ex.
- Terceira, Cabo da Praia, port de pêche, 19-10 : 2 ex.

Lesser Yellowlegs - Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 18 & 19-10 : 2 ex.

Classique du site en automne, ce chevalier est toujours un régal pour son élégance et son caractère peu farouche qui permet de l'approcher à moins de dix mètres.

Ruddy Turnstone - Tournepierre à collier *Arenaria interpres* :

Pas plus de 10 ex. ensemble sur la côte sud-sud-ouest de Corvo alors qu'il est très commun (des dizaines) sur Terceira dans tout le secteur de Cabo da Praia & Praia da Vitoria. Aussi 3 ex. à Flores lors de notre halte du 18-10.

Red Knot - Bécasseau maubèche *Calidris canutus* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 18 & 19-10 : 4 ex.



Sanderling - Bécasseau sanderling *Calidris alba* :

Espèce commune (des dizaines) sur Terceira dans tout le secteur de Praia da Vitoria & Cabo da Praia. Pas dénombrée.

Semipalmated Sandpiper - Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 18 & 19-10 : 2 juvéniles.

Ces deux juvéniles étaient peu farouches et aisés à comparer aux Bécasseaux minutes : allure générale plus trapue, bec plus haut à la base et au bout plus arrondi, aspect écaillé du dessus plus gris, arrière de l'oiseau plus court.

Little Stint - Bécasseau minute *Calidris minuta* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 18 & 19-10 : respectivement 1 et 2 juvéniles.

Un de ces deux oiseaux ressemblait fortement aux Bécasseaux semipalmés car son V blanc aux scapulaires était souvent invisible ! Les critères structurels étaient, dans son cas, de meilleurs indices de sa réelle identité que son plumage



White-rumped Sandpiper - Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis* :

- Corvo, pentes de colline en-dessous du réservoir, 15 & 16-10 : 2 juvéniles.

Encore deux limicoles d'origine néarctique très peu farouches approchés à une dizaine de mètres !

Baird's Sandpiper - Bécasseau de Baird *Calidris bairdii* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 18 & 19-10 : 1 juvénile.

Beaucoup plus rare que le précédent, le Bécasseau de Baird est généralement isolé lors de ses apparitions en Europe. L'individu observé à Cabo da Praia était peu farouche, tolérant une approche à une dizaine de mètres. Son cri à la sonorité aigre se rapproche assez bien de celui du Bécasseau variable. Il s'agirait du vingt-sixième individu pour les Açores.

Pectoral Sandpiper - Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* :

- Corvo, près du réservoir, 14-10 : 1 juvénile.
- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 18 & 19-10 : respectivement 2 juvéniles et 3 juvéniles.

Cette belle espèce a, comme toujours, procuré d'excellentes observations rapprochées à la carrière de Cabo da Praia. Un des trois oiseaux du 19-10 était un nouvel arrivant (v. site Birding Azores).



Curlew Sandpiper - Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 18 & 19-10 : respectivement 2 et 3 ex.

Dunlin - Bécasseau variable *Calidris alpina* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 18 & 19-10 : respectivement 2 juvéniles et 3 ex. (2 juvéniles + 1 ex.).

Les deux juvéniles étaient de petite taille et présentaient de nettes stries sombres sur les flancs se prolongeant jusqu'aux pattes. Il n'est, dès lors, pas exclu qu'ils aient appartenu au taxon néarctique *hudsonia*.

Buff-breasted Sandpiper - Bécasseau rousset *Tryngites subruficollis* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 18-10 : 1 ex.

Cet oiseau ne fut, hélas, pas très bien vu ! Il fut rapidement découvert par Kris posé sur une zone couverte de végétation mais très vite, il s'envola pour s'éloigner vers les champs et prairies situés au-dessus de la carrière. Peu de temps plus tard, il réapparut et se reposa au même endroit ... pour le quitter de nouveau aussi promptement sans plus y revenir alors que le crépuscule rendait de toute façon l'observation déjà peu agréable. Il ne fut plus du tout observé le 19-10 mais il fut recontacté plusieurs fois à des dates ultérieures (v. Birding Azores). Il s'agirait du trente-deuxième individu pour les Açores, où il est beaucoup moins fréquent que dans les Iles Britanniques.

Lesser Black-backed Gull - Goéland brun *Larus fuscus* :

Une vingtaine d'oiseaux estimés dans les champs et prairies du secteur de Lagoa do Ginjal sur Terceira le 19-10. Pas vu sur Corvo.



Yellow-legged Gull - Goéland leucophée *Larus michahellis* :

Le taxon très sombre *atlantis* est vraiment abondant sur l'île de Terceira où il est vu par centaines dans les champs un peu partout et sur la côte de Cabo da Praia/Praia da Vitoria mais il est peu nombreux à Corvo (pas plus de 10 ex. ensemble).

Black-headed Gull - Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* :

- Corvo, Vila Nova do Corvo, 17-10 : 1 ex. immature de premier hiver en vol.
- Terceira, Cabo da Praia, port et environs, 18 & 19-10 : c.20 ex.

Mediterranean Gull - Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* :

- Terceira, Cabo da Praia, port, 19-10 : 2 ex. immatures de premier hiver.

Ces deux immatures étaient posés parmi quelques Mouettes rieuses et des Sternes pierregarins sur une structure en béton du port de Cabo da Praia. Il s'agirait des vingt-neuvième et trentième individus pour les Açores.

White-winged Tern - Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 18 & 19-10 et Terceira, Praia da Vitoria, Paul da Praia, 19-10 : 1 adulte.

Cet individu a séjourné un bon moment sur Terceira, partageant son temps entre les deux sites de Cabo da Praia et Paul da Praia. On pouvait parfois le voir à quelques mètres. Son croupion étonnamment gris était plutôt étonnant pour l'espèce ! Il s'agit seulement du quatrième individu pour les Açores.



Common Tern - Sterne pierregarin *Sterna hirundo* :

- Corvo, côte sud-ouest, 18-10 : 2 ex.
- Terceira, Cabo da Praia, port, 20-10 : maximum de c.75 ex. Le 19-10 ici, des juvéniles quémandaient encore leur pitance aux adultes.

(Feral) Rock Dove - Pigeon biset (domestique) *Columba livia* :

L'espèce est commune partout. Sur Corvo, elle occupe les falaises intérieures et en bord de mer pour nicher.


Woodpigeon - Pigeon ramier *Columba palumbus* :

Très commun à Terceira mais peu nombreux à Corvo où il est surtout vu dans le nord-est de l'île avec pas plus de 6 ex. ensemble.

Short-eared Owl - Hibou des marais *Asio flammeus* :

- Corvo, pentes de collines entre Pico et la caldeira, 12-10 : 1 ex. en vol et posé.

Cet oiseau est arrivé en vol, probablement dérangé d'un gîte, s'est posé pendant quelques minutes sur un mur de pierres (ce qui a permis d'en réaliser quelques médiocres clichés) puis a disparu derrière une colline. Il s'agirait du dix-neuvième individu pour les Açores. Comme pour le Faucon pèlerin, l'origine des Hiboux des marais vus dans l'archipel des Açores est sujette à suppositions : Europe ou Amérique du Nord ?



Belted Kingfisher - Martin-pêcheur ceinturé *Ceryle alcyon* :

- Terceira, Praia da Vitoria, Paul da Praia, 11 & 19-10 : 1 femelle.

Voici un accidentel prestigieux qu'il nous fut donné d'observer deux fois au cours de ce séjour ! L'oiseau était cependant fugace, n'apparaissant que vers 08h30-09h00 sur les plans d'eau de Paul da Praia pour ensuite disparaître vers un lieu inconnu. Le 11-10, nous l'avons vu d'assez loin posé sur un piquet et le 19-10, il était posé sur un pont en bois enjambant le cours d'eau qui aboutit aux plans d'eau. Hélas, les deux observations furent trop distantes pour réaliser des clichés de ce visiteur très rare.

Il s'agit du huitième individu observé dans les Açores.

Northern Flicker - Pic flamboyant *Colaptes auratus* :



- Corvo, secteur de Ribeira do Fojo et Ribeira do Poço de Agua, 15 & 16-10 : 1 mâle, respectivement entendu et vu deux fois.

Ce pic, un des plus extraordinaires accidentels jamais découverts dans les Açores, restera pour moi synonyme d'une très grande frustration car je quittai Corvo sans l'avoir vu, « privilège » peu enviable dont je suis le seul bénéficiaire parmi tous les observateurs présents sur l'île en même temps que l'oiseau ! Découvert le 15-10 près de la station électrique par David Monticelli et Vincent Legrand (après déjà des contacts auditifs quelques jours plus tôt dans la caldeira et à la Ribeira da Ponte), il fut relocalisé ce même jour à la Ribeira do Poço de Agua par Pierre-André Crochet. A partir de ce moment, il devint extrêmement mobile dans tout le secteur nord-centre oriental de l'île, se déplaçant sans cesse entre les sites de Ribeira do Poço de Agua, Ribeira do Fojo, Ribeira da Ponte et Pico. Chaque fois qu'il était signalé quelque part, j'arrivais toujours trop tard, l'oiseau avait déjà quitté l'endroit ... si bien que je dois me contenter de quelques auditions distantes près de Ribeira do Fojo le 15-10. Kris fut beaucoup plus chanceux que moi puisqu'il

observa deux fois l'oiseau le 16-10, d'abord brièvement à Ribeira do Fojo puis plus longuement à Ribeira do Poço de Agua. A l'heure où j'écris ces lignes (27-10), l'oiseau est toujours présent et semble satisfaire la plupart des observateurs encore présents à Corvo ... God damned !! Il s'agit du second individu pour le Paléarctique Occidental et du premier pour les Açores.

Eurasian Skylark - Alouette des champs *Alauda arvensis* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 19-10 : un groupe de 9 ex. en vol vers le nord.
L'espèce fait partie des visiteurs venus d'Europe amenés par le vent d'est qui a soufflé à partir du 17-10.

House Martin - Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* :

- Corvo, colline au-dessus de la station électrique, 14, 15 & 16-10 : respectivement 4, 1 et 1 ex.
Encore une espèce venue d'Europe à la faveur du vent d'est-nord-est. Nous aurions plutôt espéré une autre espèce d'hirondelle ...

pipit sp. - pipit sp. *Anthus sp.* :

- Corvo, près du réservoir, 14-10 : 1 ex.
Ce pipit farouche, vu trois fois sur les pentes de colline proches du réservoir, n'a jamais daigné se laisser approcher d'assez près pour être identifié. Son cri ne fut pas entendu non plus.

White Wagtail - Bergeronnette grise *Motacilla alba* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 19-10 : 2 ex. (1 adulte + 1 immature de premier hiver).

Encore une espèce « rare » dans les Açores originaire d'Europe amenée ici par le vent d'est-nord-est. Ces deux oiseaux, apparemment les vingt-trois et vingt-quatrièmes pour les Açores, appartenaient à la sous-espèce nominale *alba*.



Yellow Wagtail - Bergeronnette printanière *Motacilla flava* :

- Corvo, Vila Nova do Corvo, champs, 18-10 : 1 ex.

Cet oiseau photographié par Kris dans les champs de Vila Nova do Corvo serait seulement le deuxième individu pour Corvo et le sixième pour les Açores, bien évidemment amené par le vent d'est-nord-est qui a caractérisé la seconde décennie d'octobre 2010.

Grey Wagtail - Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* :

Une des espèces très communes des Açores, présente absolument partout. Le taxon *patriciae* est plus sombre dessus et plus jaune dessous que *cinerea* d'Europe et le sourcil blanc n'est présent que derrière l'œil.

Cedar Waxwing - Jaseur des cèdres *Bombycilla cedrorum* :

- Corvo, colline au-dessus de la station électrique, 14 & 16-10 : 1 juvénile.

Autre accidentel exceptionnel, ce Jaseur des cèdres avait un comportement identique à celui du Pic flamboyant : apparaître à un ou deux observateurs puis disparaître aussi vite lorsque les suivants arrivent ! Si Kris eut la chance d'être au bon endroit au bon moment lors de l'observation du 14-10, il me fallut deux jours de plus pour finalement l'observer dans un petit massif de



genévriers qu'il semblait avoir choisi comme lieu de prédilection. L'observation ne fut cependant pas bien longue (probablement deux minutes vers 08h35), après quoi il s'envola vers les pentes de « sa » colline pour disparaître dans les massifs d'hortensias. A tout le moins, lorsqu'il n'était pas visible, on pouvait être quasiment certain qu'il était caché quelque part dans les importants massifs d'hortensias ou de genévriers sur cette colline. Cet oiseau aura donc testé cruellement la patience de plus d'un observateur !



Grey-cheeked Thrush - Grive à joues grises *Catharus minimus* :

- Corvo, Ribeira do Poço de Agua, 17 & 18-10 : 1 ex.

Belle découverte par Christian Leth de cette grive lors de la recherche du Pic flamboyant. L'oiseau fut très bien vu et photographié par Kris le 17-10 après une longue attente tandis que je dus me contenter d'une brève observation de l'oiseau posé sur un mur de pierres partiellement caché par des hortensias lors de ma visite du 18-10, après mon quatrième et dernier échec avec le Pic flamboyant. Maigre compensation ... La quatrième pour les Açores.

Eurasian Blackbird - Merle noir *Turdus merula* :

Un des membres les plus abondants du groupe de sept espèces hyper-communes sur Corvo. Il est partout, tout le temps, toujours !! Plumage très noir (mâle), silhouette plus compacte, ailes et queue plus courtes que *merula* d'Europe.



Blackcap - Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* :

Statut identique à celui du Merle noir mais elle est peut-être encore plus nombreuse puisque l'on peut parfois en voir jusqu'à 15-20 ex. se nourrissant ensemble dans les figuiers de Vila Nova do Corvo. Un « stress » permanent pour les chercheurs de raretés ... A l'évidence, le taxon *gularis* est un peu plus grand, plus trapu et plus sombre qu'*atricapilla* d'Europe et le ventre est toujours lavé de jaunâtre.

Garden Warbler - Fauvette des jardins *Sylvia borin* :

- Corvo, Vila Nova do Corvo, 13-10 : 1 ex.

C'est l'observation d'une Paruline obscure (Tennessee Warbler) qui a provoqué la découverte de cette fauvette, la seconde Fauvette des jardins pour Corvo et pour les Açores ! L'oiseau affectionnait un important massif de figuiers qu'il partageait avec de très nombreuses Fauvettes à tête noire et 2 Orioles de Baltimore ! La Paruline obscure, quant à elle, ne fut jamais retrouvée et l'observateur retira sa donnée, admettant qu'il devait plus probablement s'agir d'un pouillot (*Phylloscopus*).

European Robin - Rougegorge familier *Erithacus rubecula* :

Absent à Corvo. Nous avons vu quelques individus çà et là sur Flores et Terceira, notamment dans la carrière de Cabo da Praia.

Northern Wheatear - Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* :

- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 19-10 : 1 ex.

Peu de temps après le passage de 9 Alouettes des champs et la découverte d'1 Bergeronnette grise, ce Traquet motteux vint s'ajouter à la liste des passereaux européens qui constituaient le thème de cette journée !

European Starling - Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* :

Autre membre du septuor infernal ... Ses groupes sur Corvo atteignent la centaine d'individus. Très peu farouche, il chante partout et constitue un beau sujet photographique lors des nombreux moments de désespoir que vit inévitablement le cocheur frustré !

House Sparrow - Moineau domestique *Passer domesticus* :

Comme le Sansonnet mais peut être vu en groupe plus



important. Par contre, il est presque absent au-dessus d'une certaine altitude, sans doute parce que la présence humaine y est aussi quasiment nulle.

Common Waxbill - Astrild ondulé *Estrilda astrild* :

- Terceira, Praia da Vitoria, Paul da Praia, 11-10 : maximum de 4 ex.
- Terceira, Cabo da Praia, carrière, 19-10 : maximum de 7 ex.

Red-eyed Vireo - Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus* :

- Corvo, Ribeira da Ponte, 12-10 : 1 ex.
- Corvo, Ribeira do Poço de Agua, 15 & 18-10 : 1 ex.

Ce viréo est bien sûr un des passereaux d'origine néarctique les plus fréquents dans les Açores mais nous l'avions quand même raté en 2009. Ce manque fut comblé cette année avec deux individus bien vus : le premier à Ribeira da Ponte vu par Kris le 12-10 pendant son attente pour la Paruline des ruisseaux (ça occupe agréablement ...) et le second vu séparément par Kris le 15-10 et le 18-10 par moi lors de nos attentes respectives pour le Pic flamboyant à la Ribeira do Poço de Agua. Belles observations chaque fois, en particulier celle du 18 car l'oiseau se trouvait dans un petit vallon plus bas que les observateurs, ce qui permit d'obtenir une observation reposante sans risque de torticolis !

La comptabilité des individus est difficile ici. Ces deux oiseaux se situent autour de la vingtième position.



Chaffinch - Pinson des arbres *Fringilla coelebs* :

Hyper-commun sur Corvo, nous ne l'avons pas vu sur Terceira. Son chant est identique à celui des oiseaux d'Europe (*coelebs*) mais ses cris sont très différents. Que dire alors de son plumage et de ses proportions qui en font un oiseau si différent malgré qu'il soit considéré comme appartenant à la même espèce ?

European Goldfinch - Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* :

Peu commun à Corvo où il n'est pas vu chaque jour. Maximum de 6 ex. en un seul groupe. Aussi quelques oiseaux sur Terceira.



Atlantic Canary - Canari *Serinus canaria* :

Encore un des oiseaux hyper-communs des Açores, aussi bien à Corvo qu'à Terceira. Les groupes maximaux à Corvo comptaient c.40 ex. mais sur Terceira, il était encore plus nombreux dans le secteur des Lagoas do Ginjal/do Junco. Ses nombreux cris aigus peuvent être déroutants, surtout lorsque l'on recherche les passereaux néarctiques !

American Redstart - Paruline flamboyante *Setophaga ruticilla* :

- Corvo, Ribeira da Ponte, 15-10 : 1 ex.

Christian Leth, décidément très en forme durant son séjour, découvrit une Paruline flamboyante dans la partie supérieure de la Ribeira da Ponte le 14-10. Ce secteur est peu visité par les observateurs. Kris obtint une observation assez fugace de cet oiseau le lendemain. Il s'agirait du septième individu pour les Açores.



Northern Waterthrush - Paruline des ruisseaux *Seiurus noveboracensis* :

- Corvo, Ribeira da Ponte, 12-10 : 1 ex.

Ce séjour dans les Açores se clôture pour moi par cinq nouvelles espèces observées dans le Paléarctique Occidental et par ... trois échecs : le Bécasseau d'Alaska de Terceira en n°1 (il fut présent jusqu'au 13-10 à Cabo da Praia et il aurait sans doute été possible d'y faire un saut très rapide lors de notre halte sur l'île le 11-10), le Pic flamboyant en n°2 (que dire de plus ...) et cette Paruline des ruisseaux en n°3 ! Tout comme le Pic flamboyant, cette paruline fut en effet observée par tous les observateurs présents sur Corvo en même temps qu'elle, sauf par moi ! Je passai pourtant entre cinq et six heures à l'attendre près des mares de la Ribeira da Ponte qui constituaient son lieu de prédilection. Kris, décidément très chanceux au cours de ce voyage et plus patient que moi, l'observa très bien le 12-10 ! Il ne s'agit que de la deuxième observation pour les Açores, la première se situant en mer sur un bateau en avril 1996 !

Common Yellowthroat - Paruline masquée *Geothlypis trichas* :

- Corvo, Vila Nova do Corvo, 12-10 : 1 femelle.

Magnifique observation d'une femelle probablement adulte (très jaune sur la gorge et les sous-caudales) en même temps que le Bruant de Lincoln dans la partie supérieure des champs de Vila Nova do Corvo le 12-10. L'oiseau, que nous avons initialement raté dans un massif de figuiers, est soudainement apparu à nos yeux ébahis dans un autre massif alors que nous observions le bruant, constituant une « dream team » de choc ! Il se nourrissait sur le même mur de pierres que le bruant ou très près du sol dans les figuiers. Il s'agirait déjà du dixième individu pour les Açores.



Scarlet Tanager - Tangara écarlate *Piranga olivacea* :

- Corvo, Vila Nova do Corvo, autour de la Comodoro Guesthouse, 12-10 : 1 ex.

Après le Bruant de Lincoln et la Paruline masquée, le 12-10 n'avait pas encore tout donné ... J'étais encore en train d'observer ces deux oiseaux lorsque l'information de la présence d'un Tangara écarlate à la « guesthouse » me parvint. Je me rendis immédiatement sur place et pus ainsi observer un troisième passereau néarctique en une heure dans un rayon d'un kilomètre ! L'oiseau était posé immobile dans un arbre d'un jardin, semblant déjà prêt pour passer la nuit. Après de longues minutes cependant, il s'envola pour gagner un autre arbre où il put encore être bien observé sous d'autres angles. Magnifique complément à l'observation irlandaise de Garinish Point par météo de déluge le 10-10-2008 ! Cet oiseau, présent depuis quelques jours, est apparemment le septième pour les Açores.

Summer Tanager - Tangara vermillon *Piranga rubra* :

- Corvo, juste au nord de Ribeira da Lapa, 14-10 : 1 mâle immature de premier hiver.

La découverte de cet oiseau fait évidemment partie du trio gagnant de l'automne 2010 à Corvo avec le Pic flamboyant et le Bruant de Lincoln ! Un regret important, pourtant, « ternit » un peu l'observation : le fait qu'elle n'ait profité qu'à un seul observateur, moi-même ! Mais je ne dois évidemment pas me plaindre : il ne s'agit quand même que de la troisième donnée pour le Paléarctique Occidental et de la deuxième pour les Açores (précédente en octobre 2006, aussi à Corvo).

L'oiseau fut repéré à son cri roulé très inhabituel émis deux fois. Lorsque j'en localisai l'origine, je découvris un beau mâle immature de Tangara vermillon, typiquement orangé, posé bien en évidence sur une branche morte. Le temps de faire trois clichés et l'oiseau s'envola vers l'est, c'est-à-dire vers la côte. Malgré la présence d'une quinzaine d'observateurs un quart d'heure plus tard et de recherches ultérieures, il ne fut, hélas, jamais retrouvé !

La photo ci-jointe apporte la preuve incontestable de l'observation et je ne peux qu'en remercier mon petit Panasonic ...



Lincoln's Sparrow - Bruant de Lincoln *Melospiza lincolni* :

- Corvo, Vila Nova do Corvo, champs, 12 & 13-10 : 1 juvénile.

Pour sûr, rien ne me préparait à découvrir une nouvelle espèce pour le Paléarctique Occidental en fin d'après-midi ce 12-10 : j'avais raté la Paruline des ruisseaux de Ribeira da Ponte (que Kris avait vue) et une Paruline masquée à Vila Nova refusait aussi obstinément de se montrer ! C'est donc d'humeur plutôt maussade que je commençai à errer dans les champs non loin du lieu de la Paruline masquée lorsque je fis décoller un passereau d'une petite parcelle envahie de chénopodes. Machinalement, je levai les jumelles pour mieux voir l'oiseau qui s'était posé sur un mur de pierres. Et mon cœur tomba dans ma poitrine lorsque je découvris un petit bruant brun et gris très rayé avec une calotte hérissée et une petite tache sombre sur la poitrine. Tout alla très vite ensuite : j'appelai immédiatement Kris qui n'était pas loin de moi et lui annonçai que je venais de voir un Bruant mélodieux (Song Sparrow), après quoi j'annonçai la même information à toute la troupe ornitho via les talkies-walkies. En un temps record, ils furent tous là et nous pûmes alors commencer à rechercher l'oiseau qui, entre temps, s'était envolé. Très vite, Pierre-André Crochet le relocalisa un peu plus à l'ouest dans les champs et tout le monde put alors suivre ses déplacements jusqu'à ce qu'il se cantonne dans une petite zone composée de figuiers et d'un mur de pierres couvert de chénopodes sur lequel il se nourrissait très activement de petites céréales. Des centaines de photos de l'oiseau furent prises et le soir même, lors de l'examen de ces photos, la vérité surgit au grand jour : ce bruant n'était pas un Bruant mélodieux mais un Bruant de Lincoln, une espèce jamais encore observée dans la Paléarctique Occidental auparavant ! L'identification erronée initiale provenait de la présence de la tache sombre au centre de la poitrine, critère bien connu du Bruant mélodieux, et de la brièveté de la première observation qui n'avait pas permis de voir plus de détails de l'oiseau. Cette belle trouvaille me valut quelques poignées de mains chaleureuses et un repas payé par la confrérie ornitho de Corvo ! L'identification put être facilement confirmée par des ornithologues américains consultés via Internet d'après les critères suivants : les stries fines des flancs et de la poitrine (plus larges et épaisses chez le B. mélodieux), le bec plutôt fin au culmen droit (plus épais et arrondi chez le B. mélodieux), la petite taille (le B. mélodieux est plus grand), la queue plutôt courte (longue chez le B. Mélodieux), la calotte souvent hérissée (arrondie chez le B. mélodieux). Le Bruant de Lincoln fut encore observé (et même filmé par Simon Buckell) le lendemain (13-10), pour le plus grand bonheur de quatre observateurs allemands arrivés ce jour-là, après quoi il ne fut plus vu.

Lapland Bunting - Bruant lapon *Calcarius lapponicus* :

- Corvo, un peu au sud du réservoir, 14-10 : 1 ex. entendu, probablement en vol.
- Corvo, Ribeira da Lapa, 14-10 : 1 ex. en vol vers le nord.

Apparemment seulement les onzième et douzième individus pour les Açores de ce bruant qui est certainement à y considérer plus comme un migrateur peu nombreux que comme un vrai accidentel.

Snow Bunting - Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* :

- Corvo, près du réservoir, 14-10 : un groupe d'au moins 7 ex.
Un groupe de 7 ex. est déjà important pour les Açores où l'espèce est un hivernant et migrateur régulier en petit nombre.

Indigo Bunting - Passerin indigo *Passerina cyanea* :

- Corvo, Ribeira da Ponte, 11, 13, 15 & 16-10 : 1 ex. (mais très probablement 2 ex. différents).

Alors qu'il avait toujours été furtif en 2009, le Passerin indigo fut très généreux cette année ! Il y avait généralement 1 ex. présent au pont de la Ribeira da Ponte, souvent en train de se nourrir de graines de hautes herbes au pied d'un arbre mort, qu'il affectionnait aussi comme perchoir. Cet endroit précis semble visité chaque automne par l'espèce ! Nos observations à quatre dates semblent concerner 2 ex. différents dont un plus nettement strié sur la poitrine que l'autre. Il s'agit au moins du vingt-quatrième individu observé dans les Açores.

Baltimore Oriole - Oriole de Baltimore *Icterus galbula* :

- Corvo, Vila Nova do Corvo, 13-10 : 2 ex. immatures de premier hiver (1 mâle et 1 femelle).
- Corvo, station électrique, 14-10 : 1 femelle immature de premier hiver posée puis en vol vers le sud.

Les deux oiseaux de Vila Nova furent particulièrement coopératifs, se laissant voir à quelques mètres pendant qu'ils se nourrissaient avidement de figes ! L'oiseau de la station électrique fut découvert vers 12h30 et observé pendant une dizaine de minutes avant de s'envoler vers le sud, c'est-à-dire vers Vila Nova. L'examen des photos a cependant permis d'établir qu'il s'agissait d'un oiseau différent de celui vu deux jours plus tôt. Le second individu présentait en effet une tête globalement plus orangée alors que celui de Vila Nova avait une teinte grise sur la nuque. Ces observations concernent apparemment les cinquième, sixième et septième Orioles de Baltimore dans les Açores.



Soit un total de 82 espèces

