

Observations ornithologiques réalisées aux

ACORES

TERCEIRA, CORVO, FLORES

du 05 au 26 octobre 2013



Yellow-throated Warbler – *Setophaga dominica* – Ribeira do Poço de Agua – Corvo – Kris de Rouck

Hugues DUFOURNY (hdufournyornitho@yahoo.fr) (Rédaction du compte rendu) en compagnie de Guy MIRGAIN (photos) et de Kris DE ROUCK (photos).

Itinéraire

Île de **TERCEIRA** (Ter) du 05 au 07, les 25 et 26 octobre.

Île de **CORVO** du 07 au 22 octobre.

Île de **FLORES** (Flo) du 22 au 25 octobre.

Trajets inter-îles et Europe-Açores les 05, 07, 22, 25, 26 et 27 octobre (avec arrêts sur l'île de Faial et à Lisbonne).

Liste des observations

N.B. 1 : Les dates ne sont données que pour les espèces très rares à peu fréquentes, ces termes s'appliquant soit au seul archipel des Açores ou à l'entièreté de la zone du Paléarctique Occidental.

N.B. 2 : Les informations relatives au statut ou au nombre d'observations pour les espèces rares dans l'archipel proviennent du site <http://www.birdingazores.net> qui constitue la banque de données pour les Açores jusqu'au 31-12-2011. Seules les espèces pour lesquelles moins de 50 ex. ont été observés sont considérées.

N.B. 3 : Espèces **en rouge** = espèces nouvelles dans la zone du Paléarctique Occidental pour l'auteur de ce rapport.

1. Eurasian Wigeon – *Anas penelope* :

- Ter, Cabo da Praia : 1 femelle.
- Ter, Paul da Praia : 1 mâle de premier hiver.

2. American Wigeon – *Anas americana* :

- Flo, Lagoa da Lomba, 23 et 24-10 : 1 femelle immature de premier hiver bien observée se nourrissant dans la végétation aquatique flottante, en compagnie d'un Canard noir le 23-10. Migrateur néarctique rare mais très régulier dans les Açores.



3. Black Duck – *Anas rubripes* :

- Corvo, côte sud en face des moulins, 15-10 : 1 ex. apparemment en migration active vers le nord-nord-est, suivi jusqu'à perte de vue au-dessus de l'océan.
- Flo, Lagoa dos Patos, 22-10 : 1 ex. posé sur l'eau puis s'envolant, farouche.
- Flo, Lagoa da Lomba, 23-10 : 1 ex. se nourrissant dans la végétation aquatique flottante en compagnie d'un Canard à front blanc.
- Flo, Mirador de Craveiro Lopes, 23 et 24-10 : respectivement 2 et 3 au repos dont certains présentent des marques d'hybridation avec le Canard colvert (liseré blanc au speculum et reflets verts à la tête).
- Flo, Lagoa Branca, 24-10 : 2 ex. dont un présentant des marques d'hybridation avec le Canard colvert (reflets verts à la tête).

4. Northern Shoveler – *Anas clypeata* :

- Ter, Paul da Praia, 25-10 : 1 femelle.

5. Northern Pintail – *Anas acuta* :

- Ter, Cabo da Praia, 05 et 26-10 : respectivement 3 ex. en vol et 2 ex.
- Corvo, aéroport, 10-10 : 4 ex. en vol (revus plus tard par d'autres observateurs dans la caldeira).
- Ter, Paul da Praia, 25-10 : 1 ex.

6. Garganey – *Anas querquedula* :

- Flo, Lagoa dos Patos, 22 et 24-10 : 1 ex. se nettoyant le plumage sur la berge du lac puis nageant, parfois en compagnie des Fuligules à bec cerclé.

Migrateur paléarctique rare dans les Açores (34 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).

7. Ring-necked Duck – *Aythya collaris* :

- Flo, Lagoa dos Patos, 22 et 24-10 : 2 femelles très bien vues, très actives, plongeant beaucoup, se nettoyant ... parfois en compagnie de Poules d'eau et d'une Sarcelle d'été. Un des deux oiseaux présente un pattern facial pâle plus prononcé que l'autre. Migrateur néarctique rare mais très régulier dans les Açores.



8. Tufted Duck – *Aythya fuligula* :

- Ter, Cabo da Praia, 26-10 : 3 ex.

9. Surf Scoter – *Melanitta perspicillata* :

- Ter, Baie de Praia da Vitoria, 25 et 26-10 : 2 femelles de premier hiver bien observées nageant dans un groupe de goélands le 25. Le 26, ces oiseaux sont seuls et plus près de la route côtière. Très belles observations. Un de ces deux oiseaux est nouveau, l'autre est signalé ici depuis une dizaine de jours.



Migrateur néarctique rare dans les Açores (12 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).

10. Common Quail – *Coturnix coturnix* :

- Ter, Cabo da Praia : 1 ex. levé dans les champs.

11. Cory's Shearwater – *Calonectris diomedea* :

- Très commun partout ; des 100aines chaque soir en face de la côte sud de Corvo et de superbes observations très proches lors de la traversée en bateau de Corvo à Flores le 22-10. Le 25-10, quelques dizaines d'oiseaux sont vus dans la Baie de Praia da Vitoria.

12. Manx Shearwater – *Puffinus puffinus* :

- Corvo, en mer en face des moulins, 19-10 : 1 ex. en vol vers l'ouest.

13. Northern Gannet – *Morus bassanus* :

- Corvo, côte sud, 19-10 : 1 juvénile en stationnement près de la côte.

14. Grey Heron – *Ardea cinerea* :

- Flo, Lagoa Branca : 1 adulte.
- Flo, Santa Cruz das Flores : 1 ex. en vol en bord de mer.
- Flo, Lagoa dos Patos : 1 adulte.
- Ter, Paul da Praia : 2 ex.

15. Little Egret – *Egretta garzetta* :

- Ter, Cabo da Praia : 2 ex. en vol de loin.

- Corvo, côte sud près des moulins : 1 ex. brièvement posé dans les rochers.
- Ter, Cabo da Praia, port : 1 ex.

16. Glossy Ibis – *Plegadis falcinellus* :

- Corvo, 07 → 20-10 : 4 ex. (d'un groupe qui a compté jusqu'à 5 ex.) jusqu'au 11-10, ensuite seulement 2 ex. survivent mais certains jours un seul oiseau est vu. Souvent vus à moins de dix mètres se nourrissant dans l'herbe au bord de la piste de l'aéroport ou à côté de la centrale électrique, souvent aussi en vol entre ces endroits et les hauteurs de l'île. Deux de ces oiseaux ont été trouvés morts près de la piste de l'aéroport et un autre dans le cratère du volcan, vraisemblablement empoisonnés par les produits raticides !
Migrateur (supposé paléarctique) rare mais de plus en plus régulier dans les Açores (18 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).

17. Osprey – *Pandion haliaetus* :

- Ter, Baie de Praia da Vitoria, 25-10 : 1 ex. survole la baie juste devant la plage, houspillé par des goélands.
Migrateur paléarctique et/ou néarctique rare dans les Açores (26 ex enregistrés jusqu'au 31-12-2011).

18. Rough-legged Buzzard – *Buteo lagopus* :



- Corvo, caldeira, 09-10 : 1 ex. vu de loin en vol sur place au-dessus du bord de la caldeira puis s'éloignant vers le nord-ouest. Oiseau clair de sous-espèce indéterminée.

- Corvo, quart nord-est de l'île (Fojo, do Vinte, Pico, da Ponte, Lapa Fields), 14-10 : 1 superbe juvénile de forme sombre de la sous-espèce *sanctijohannis* longuement observé se déplaçant au-dessus des versants herbeux, brièvement posé aussi au sommet d'un conifère. Cet oiseau est revu très brièvement le 15-10 dans le même secteur.

- Corvo, Vila Nova, 16-10 : 1 ex. clair en vol sur place juste au nord du village, probablement l'oiseau vu le 09-10. Sous-espèce indéterminée. Espèce rare d'origine néarctique certaine et paléarctique possible mais qui semble devenir plus régulière depuis quelques années dans les Açores (11 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).

19. Common Buzzard – *Buteo buteo* :

- Ter, Cabo da Praia : 2 ex. brièvement.
- Ter, colline au-dessus de Paul da Praia : un couple criant beaucoup.
- Ter, intérieur de l'île : 5-6 ex.

20. Common Moorhen – *Gallinula chloropus* :

- Ter, Cabo da Praia, 06 et 26-10 : 1 ex.
- Flo, Lagoa dos Patos, 22 et 24-10 : respectivement 9 ex. (3 adultes et 6 juvéniles) et 6 ex.
- Flo, Mirador de Craveiro Lopes, 23 et 24-10 : 3 ex.
- Ter, Paul da Praia, 25-10 : jusqu'à 10 ex.

21. Eurasian Coot – *Fulica atra* :

- Ter, Paul da Praia : jusqu'à 4 ex.
- Flo, Lagoa dos Patos : un couple.

22. Common Ringed Plover – *Charadrius hiaticula* :

- Ter, Cabo da Praia : c.7 ex.

23. Semipalmated Plover – *Charadrius semipalmatus* :

- Ter, Cabo da Praia, 05 → 07-10, 26-10 : respectivement jusqu'à 4 ex. dont 1 juvénile (le 06-10) et 2 ex. Observations très rapprochées. Migrateur néarctique rare mais très régulier dans les Açores.

24. Kentish Plover – *Charadrius alexandrinus* :

- Ter, Cabo da Praia : c.30 ex.

25. Grey Plover – *Pluvialis squatarola* :

- Ter, Cabo da Praia : jusqu'à 5 ex.

26. Red Knot – *Calidris canutus* :

- Ter, Cabo da Praia : 1 adulte en mue.

27.Sanderling – *Calidris alba* :

- Ter, Cabo da Praia : jusqu'à **80** ex.
- Ter, Porto Martins : c.20 ex.
- Flo, Ponta Delgada, terrain de football : 1 ex.

28.Semipalmated Sandpiper – *Calidris pusilla* :

- Ter, Cabo da Praia, 05 → 07-10 : 2 juvéniles. Plumage gris typiquement bien écaillé et bec épais à la base au bout arrondi. Migrateur néarctique rare mais très régulier dans les Açores.

29.Little Stint – *Calidris minuta* :

- Ter, Cabo da Praia : 1 puis 2 juvéniles (3 ?), parfois en compagnie des Bécasseaux semipalmés pour la comparaison.

30.White-rumped Sandpiper – *Calidris fuscicollis* :

- Ter, Cabo da Praia, 05 → 07-10 : arrivées progressives : d'abord 1 ex., ensuite 4 ex. puis jusqu'à **10** ex. (3 adultes et 7 juvéniles). 26-10 : 2 juvéniles dont un déjà bien avancé dans sa mue.
- Ter, Cabo da Praia, port, 06-10 : 2 juvéniles approchables à deux mètres se nourrissant dans des mares sur l'asphalte de la route !
- Flo, Ponta Delgada, terrain de football, 23-10 : 1 adulte se nourrissant à trois mètres des observateurs en compagnie d'un Bécasseau sanderling.
- Flo, aéroport, 23-10 : 1 juvénile se nourrissant dans l'herbe en compagnie d'étourneaux dans l'herbe à côté de la piste.
Il s'agit du limicole migrateur d'origine néarctique le plus commun dans les Açores. On ne peut certainement pas le qualifier d'accidentel dans l'archipel.



31. Pectoral Sandpiper – *Calidris melanotos* :

- Ter, Cabo da Praia, 06-10 : 1 juvénile.
Migrateur néarctique rare mais très régulier dans les Açores.

32. Curlew Sandpiper – *Calidris ferruginea* :

- Ter, Cabo da Praia : 5 ou 6 ex. en début de mois, 4 ex. en fin de mois.

33. Dunlin – *Calidris alpina* :

- Ter, Cabo da Praia, 05 → 07-10, 26-10 : respectivement 1 ex. en plumage de transition et 3 ex. (1 juvénile, 1 ex. en plumage de transition et 1 ex. en plumage d'hiver).

34. Buff-breasted Sandpiper – *Tryngites subruficollis* :

- Corvo, pentes herbeuses près du réservoir, 09-10 : 1 juvénile assez farouche, se déplaçant souvent en compagnie de tournepierres mais finalement approché à une vingtaine de mètres.
Migrateur néarctique rare mais régulier en très petit nombre dans les Açores (41 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).

35. Ruff – *Philomachus pugnax* :

- Ter, Cabo da Praia : 4 juvéniles en début de mois et 1 juvénile en fin de mois.

36. Common Snipe – *Gallinago gallinago* :

- Ter, Cabo da Praia : 1 ex.
- Corvo : 1 ou 2 ex. certains jours.

37. Short-billed Dowitcher – *Limnodromus griseus* :

- Ter, Cabo da Praia, 05 → 07-10, 26-10 : 1 juvénile en mue vers premier hiver superbement vu parfois à une dizaine de mètres, souvent en compagnie d'autres limicoles néarctiques.



Le Bécassin à bec court est un migrateur néarctique rare dans les Açores mais on y a déjà enregistré 24 ex. jusqu'au 31-12-2011 alors qu'il reste vraiment exceptionnel en Europe continentale.

38. Eurasian Woodcock – *Scolopax rusticola* :

- Corvo : 1-3 ex. levés dans les ribeiras et prairies certains jours.

39. Black-tailed Godwit – *Limosa limosa* :

- Ter, Cabo da Praia : jusqu'à 9 ex. en début de mois et 12 ex. en fin de mois (juvéniles).

40. Whimbrel – *Numenius phaeopus* :

- Ter, Cabo da Praia : 5-6 ex. *phaeopus* et 1 ex. *hudsonicus* (le 06-10). Très belle observation de l'individu de la sous-espèce néarctique *hudsonicus* se nourrissant, se nettoyant les plumes et survolant plusieurs fois le site. Tous critères bien vus.



- Corvo, au-dessus de l'aéroport : 1 ex. en vol (*phaeopus*).
- Flo, Santa Cruz das Flores : 2 ex. dans l'herbe au bord de la piste de l'aéroport (*phaeopus*).
- Flo, Ponta Delgada : 1 ex. (*phaeopus*).
Le taxon *hudsonicus* est un migrateur néarctique rare mais régulier en très petit nombre dans les Açores (41 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).
- Ter, entre Praia da Vitoria et Cabo da Praia : 1 ex. dans une prairie en bord de route.

41. Common Redshank – *Tringa totanus* :

- Ter, Cabo da Praia, 05 → 07-10, 26-10 : 1 ex.

Le Chevalier gambette est un migrateur paléarctique étonnamment rare dans les Açores (seulement 42 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).

42. Lesser Yellowlegs – *Tringa flavipes* :

- Ter, Cabo da Praia, 05 → 07-10, 26-10 : respectivement 3 ex. (1 adulte et 2 juvéniles) et 1 juvénile.

Migrateur néarctique rare mais très régulier dans les Açores.

43. Spotted Sandpiper – *Actitis macularia* :

- Ter, Cabo da Praia, 05-10 : 1 juvénile.
- Corvo, côte sud, 20-10 : 1 ex. indéterminé (*Actitis* sp.) vu seulement brièvement en vol.

Migrateur néarctique rare mais très régulier dans les Açores.

44. Ruddy Turnstone – *Arenaria interpres* :

- Ter, Cabo da Praia : jusqu'à 70 ex.
- Ter, Porto Martins, c.10 ex.
- Corvo, aéroport & environs : au moins 12 ex.
- Corvo, pentes herbeuses en-dessous du réservoir : jusqu'à 19 ex.
- Flo, Lajes das Flores, port : 1 ex.
- Flo, Faja Grande : 4 ex. en vol.

45. Black-headed Gull – *Larus ridibundus* :

- Ter, Cabo da Praia : 6 ex.
- Corvo, côte sud-ouest & aéroport: 1 ou 2 ex. certains jours.
- Flo, Faja Grande : 5 ex. en mer.
- Ter, Baie de Praia da Vitoria : dortoir de 42 ex.

46. Yellow-legged Gull – *Larus michahellis* :

- Commun partout ; p. ex. des 100aines de loin dans le port de Cabo da Praia (Ter) et 80 ex. au port de Lajes das Flores (Flo).

47. Lesser Black-backed Gull – *Larus fuscus* :

- Flo, Lajes das Flores, 23-10 : 2 ex. (dont au moins un subadulte) de la sous-espèce *graellsii* parmi les Goélands leucophées.
- Ter, Baie de Praia da Vitoria : au moins 31 ex.
- Ter, près des antennes américaines : au moins 20 ex.

48. Great Black-backed Gull – *Larus marinus* :

- Ter, Cabo da Praia, port, 06-10 : 1 immature de premier hiver posé sur un appontement.
- Corvo, côte est à hauteur de « Lighthouse Valley », 08-10 : 1 adulte en vol en mer.
- Flo, Lajes das Flores, port, 23-10 : 1 immature de premier hiver posé dans les rochers.

49. Caspian Tern – *Hydroprogne caspia* :

- Flo, Lajes das Flores, port, 23-10 : 1 ex. de premier hiver passe deux fois devant la jetée du port vers 15h20, d'abord vers le sud puis vers le nord.

Il s'agit de la troisième observation pour les Açores de cette espèce migratrice et/ou néarctique très rare dans l'archipel (observations antérieures en octobre 2005 à Terceira et septembre-octobre 2006 à Flores). Probablement ce même oiseau fut revu le 26-10 à Santa Cruz (v. <http://azoresbs.weebly.com/latest-sightings.html>).

50. Common Tern – *Sterna hirundo* :

- Commune presque partout sur les côtes ; maxima de **102** ex. sur la côte sud de Corvo et **180** ex. au soir dans la Baie de Praia da Vitoria (Terceira). Le nourrissage des jeunes est toujours en cours.

51. Sandwich Tern – *Thalasseus sandvicensis* :

- Ter, Baie de Praia da Vitoria, 25-10 : 1 ex. parmi les Sternes pierregarins.
Migrateur paléarctique et/ou néarctique rare mais régulier en petit nombre (plus de 100 ex.).

52. Rock Dove – *Columba livia* :

- Commun partout ; p. ex. des 10aines (tous types de coloration) dans les rochers à Corvo ou dans les prairies à Ponta do Albarnaz (Flores).

53. Woodpigeon – *Columba palumbus* :

- Très peu nombreux sur Corvo et Flores avec aucune observation de plus de 2 ex. mais commun sur Terceira avec p. ex. 50 ex. dans des arbres au long de l'autoroute vers Angra le 25-10.

54. Eurasian Collared-Dove – *Streptopelia decaocto* :

- Ter, Cabo da Praia : 6 ex. en vol à la carrière, un chanteur dans la zone industrielle et quelques-unes en vol çà et là dans la zone du village.

55. Mourning Dove – *Zenaida macroura* :

- Corvo, Vila Nova do Corvo, 13 et 15-10 : 1 ex. longuement observé se nourrissant très calmement dans des graminées dans l'ancien village. Quatrième observation pour les Açores (un oiseau était aussi présent au même moment sur l'île de Flores).



56. Peregrine – *Falco peregrinus* :

- Corvo, Vila Nova do Corvo, 15-10 : 1 immature en vol (vu par Kris).
Migrateur paléarctique et/ou néarctique rare dans les Açores (38 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).

57. Goldcrest – *Regulus regulus* :

- Flo : commun partout ; 1-2 ex. par observation à de nombreux endroits. Apprécie tout type de végétation.

58. Cliff Swallow – *Petrochelidon pyrrhonota* :

- Corvo, Lighthouse Valley, 08-10 : 1 ex. de premier hiver survole longuement le bas de la vallée, les prairies et le haut de la falaise



- Corvo, au-dessus de la station électrique, 08-10 : 1 ex. de premier hiver différent du précédent (front pâle plus marqué mais collier sur la nuque moins net). L'oiseau est très démonstratif, passant en vol très près des observateurs. Les 2 ex. ensemble seront observés ultérieurement par d'autres observateurs au premier endroit.

- Ter, Cabo da Praia, 26-10 : belle découverte d'un oiseau adulte qui sera observé toute la matinée chassant continuellement les insectes au-dessus de la carrière. Il s'agit d'un individu avec des contrastes de mue dans la queue et les rémiges beaucoup plus coloré que les deux oiseaux vus à Corvo (gorge plus foncée bordée de rouge sur sa limite inférieure, croupion d'un beau roux pâle). V. photos de Petri Kuhno. Très beau résultat que ces 3 ex. en un seul voyage pour cette espèce néarctique très rare dans les Açores (5 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).

59. Common House-Martin – *Delichon urbicum* :

- Corvo, Lighthouse Valley, 08-10 : 1 ex. avec l'Hirondelle à front blanc.
- Corvo, Ribeira do Fojo, 11-10 : 1 ex. passant brièvement en vol, peut-être la même que ci-dessus.

60. Grey Wagtail – *Motacilla cinerea* :

- Commune partout, dans tout type de biotope, en particulier à Flores où elle est omniprésente.

61. Cedar Waxwing – *Bombycilla cedrorum* :

- Corvo, Vila Nova, champs et jardins du village, 12-10 : 1 immature de premier hiver se nourrissant de baies d'une plante commune. Extrêmement confiant et/ou fatigué, cet oiseau se laisse observer à deux mètres !

Deuxième ou troisième observation pour les Açores (selon qu'un oiseau vu en 2010 à Corvo est considéré ou non comme le même que celui vu la même année à Flores).



62. European Robin – *Erithacus rubecula* :

- Ter, Cabo da Praia : 1 ou 2 ex. vus et chant entendu.
- Faial, aéroport d'Horta : un chanteur entendu.
- Ter, Paul da Praia : 1 ex.

63. Northern Wheatear – *Oenanthe oenanthe* :

- Corvo, autour du réservoir, 09-10 : 5 ex. dispersés.
- Corvo, route vers la caldeira, 12-10 : 1 ex.
- Corvo, Vila Nova (centre-village), 14-10 : 1 ex.
- Corvo, en-dessous du réservoir, 19-10 : 1 ex.

64. Common Blackbird – *Turdus merula* :

- Très commun à abondant partout.

65. Eurasian Blackcap – *Sylvia atricapilla* :

- Très commune à abondante partout.

66. Willow Warbler – *Phylloscopus trochilus* :

- Corvo, tamaris au sud-ouest de l'aéroport, 09 et 11-10 : 1 ex. (chantant parfois). Combinaison étonnante que celle de ce Fitis et d'une Paruline à collier dans le même massif de tamaris !
Migrateur paléarctique rare mais régulier en très petit nombre dans les Açores (35 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).

67. Common Starling – *Sturnus vulgaris* :

- Très commun à abondant partout.

68. House Sparrow – *Passer domesticus* :

- Très commun partout. Jusqu'à 130 ex. autour de l'aéroport de Corvo.

69. Common Waxbill – *Estrilda astrild* :

- Ter, Cabo da Praia : maximum de 5 ex.

70. Philadelphia Vireo – *Vireo philadelphicus* :

- Corvo, Ribeira do Fojo, 10-10 : 1 ex. se déplaçant calmement dans les lauriers.
Migrateur néarctique très rare dans les Açores (5 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).



71. Red-eyed Vireo – *Vireo olivaceus* :

- Corvo, tamaris au sud-ouest de l'aéroport, 09-10 : 1 ex. brièvement (par Guy).
 - Corvo, Vila Nova, tamaris au-dessus des champs du village, 12-10 : 1 ex. très brièvement à la fin de la première observation des goglus.
 - Corvo, Ribeira do Poço de Agua, 14-10 : 1 ex. brièvement (par Kris).
- Le Viréo aux yeux rouges est le passereau migrateur néarctique le plus régulièrement observé dans les Açores (au moins 30 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).

72. Common Chaffinch – *Fringilla coelebs* :

- Très commun à abondant Corvo. Occupe tout type d'habitat.

73. Atlantic Canary – *Serinus canaria* :

- Très commun à abondant partout ; p. ex. des 100aines dans les champs à Cabo da Praia (Terceira). Encore du nourrissage de juvéniles le 15-10 sur Corvo.

74. European Goldfinch – *Carduelis carduelis* :

- Ter, Cabo da Praia : jusqu'à 30 ex. dans les champs et c.10 ex. dans la carrière.
- Corvo : pas plus de 4 ex. certains jours.
- Flo : pas plus de 3 ex.
- Ter, Paul da Praia : un groupe de 19 ex.

75. Black-and-white Warbler – *Mniotilta varia* :

- Corvo, Lighthouse Valley, 10-10 : 1 ex. très démonstratif se nourrissant très bas ou au niveau des yeux dans de petits arbres.



Comportement caractéristique de déplacements sur les troncs et branches, souvent tête en bas comme une sittelle. Un individu différent (lignes et taches noires moins prononcées) avait été observé dans la Ribeira do Cantinho un peu avant notre arrivée sur l'île. Espèce néarctique très rare dans les Açores (3 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).

76. Northern Parula – *Setophaga americana* :

- Corvo, tamaris au sud-ouest de l'aéroport, 10 et 11-10 : 1 ex. très peu farouche se déplaçant à quelques mètres des observateurs, souvent au niveau des yeux ou plus bas.

Espèce néarctique très rare dans les Açores (7 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).



77. Common Yellowthroat – *Geothlypis trichas* :

- Corvo, tamaris devant l'aéroport, 16-10 : 1 mâle aperçu (par Guy).
- Corvo, Vila Nova, tamaris au-dessus des champs du village, 19-10 : 1 femelle de premier hiver bien mais brièvement vue dans des tamaris. Avec 12 ex. enregistrés dans les Açores jusqu'au 31-12-2011, il s'agit de la paruline la plus régulièrement observée dans l'archipel.

78. American Redstart – *Setophaga ruticilla* :

- Corvo, Ribeira da Ponte, 08-10 : 1 ex. femelle de premier hiver très actif dans les lauriers. Belle observation.
Espèce néarctique très rare dans les Açores (9 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).



79. Black-throated Blue Warbler – *Setophaga caerulescens* :

- Corvo, Ribeira do Cantinho, 15-10 : 1 mâle magnifique très bien observé trois fois en 02h30. L'oiseau se déplace souvent très bas et fournit donc de superbes observations à courte distance. L'oiseau avait « disparu » du site pendant neuf jours, avant d'être retrouvé



pour le plus grand bonheur des observateurs qui pensaient l'avoir définitivement raté !

Il s'agit de la quatrième observation pour les Açores de cette espèce néarctique d'apparition très rare dans l'archipel.

80. Yellow-throated Warbler – *Setophaga dominica* :

- Corvo, Ribeira do Poço de Agua (partie supérieure), 16 et 17-10 : 1 ex. observé se nourrissant dans une zone de genévriers dans la partie haute du vallon, parfois à seulement trois mètres des observateurs. Première observation pour les Açores et pour le Paléarctique Occidental de cette paruline à répartition méridionale en Amérique du Nord !



81. Rose-breasted Grosbeak – *Pheucticus ludovicianus* :

- Corvo, près de Ribeira do Fojo, 11-10 : 1 ex. mâle de premier hiver se nourrissant de grains de maïs dans un petit champ. Très confiant, l'oiseau décortique calmement et méthodiquement ces graines au sol à trois mètres des observateurs. Bel individu présentant des taches rouges sur la poitrine et aux couvertures sous-alaires. Avec 16 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011, il s'agit d'un des passereaux néarctiques les plus réguliers dans les Açores.



82. Lapland Bunting – *Calcarius lapponicus* :

- Corvo, près du réservoir, 09-10 : 2 (ou 3) ex. très mobiles. Migrateur néarctique et/ou paléarctique rare mais régulier ces dernières années dans les Açores (17 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011).



83. White-crowned Sparrow – *Zonotrichia leucophrys* :

- Corvo, au-dessus des champs du village, 20 et 21-10 : 1 ex. vu brièvement posé au sol et plusieurs fois en vol (par Guy). Domage que cet oiseau n'ait pas été mieux vu car il s'agit seulement de la quatrième observation pour les Açores de ce migrateur néarctique très rare.

84. White-throated Sparrow – *Zonotrichia albicollis* :

- Corvo, versant herbeux entre le bord de la caldeira et Ribeira do Poço de Agua, 16-10 : 1 juvénile se nourrissant à cinq mètres des observateurs. L'oiseau capture notamment un petit coléoptère et présente un très beau plumage très frais. Belle découverte de Kris !



Etonnamment, il s'agit seulement de la première observation pour les Açores de ce migrateur qui est pourtant un des passereaux d'origine néarctique les plus souvent observés en Europe continentale (surtout en UK).

85. Bobolink – *Dolichonyx oryzivorus* :

- Corvo, zones herbeuses au-dessus des champs du village (vers la décharge), 12-10 : 2 ex. de premier hiver se nourrissant de graminées à 3,5 mètres des observateurs, vus deux fois (début d'après-midi et début de soirée). Ils baissent chaque tige avec le bec pour atteindre les graines de l'extrémité qu'ils extraient alors méthodiquement. Un de ces oiseaux présente une coloration général beaucoup plus jaune que l'autre qui est plutôt de couleur paille.
Avec 21 ex. enregistrés jusqu'au 31-12-2011, il s'agit d'un des passereaux néarctiques les plus réguliers dans les Açores.





Cliff Swallow – *Petrochelidon pyrrhonota* – Cabo da Praia – 26-10-2013 – Petri Kuhno