

Compte-rendu d'observations Ornithologiques
TUNISIE
13 au 23 février 2008

Bernard et Catherine Recorbet
ALATA- Corse - France



Généralités sur l'objet et l'organisation et du voyage :

Le voyage était orienté vers plusieurs pôles d'intérêt, visite à une cousine et son compagnon tunisien, visite des sites archéologiques, de sites remarquables du sud tunisien et prospections ornithologiques rapides sur tous les sites concernés + quelques visites sur des petites zones humides.

Concernant les observations ornithologiques, nous nous sommes informés principalement avec les documents suivants:

- Oiseaux de Tunisie Paul Isenmann, Thierry Gaultier, Ali El hili, Hichem Azafzaf, Habib Dlensi et Michael Smart, SEOF et Muséum National d'Histoire Naturelle, 2005

Indispensable

-site internet de Bird Life concernant les Zones importantes pour la conservation des Oiseaux en Tunisie (46 sites) ; très utile

-le compte rendu ornithologique d'E. et B. Veillet (voyage du 26/11 au 3/12 2006 dans le sud tunisien) ; il nous a été indispensable dans la préparation du voyage et la découverte des zones humides,

-les comptes rendus ornithologiques d'Hichem Azafzaf,

- Oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Hermann Heinzel, Richard Fitter, John Parslow, Delachaux et Niestlé (à notre avis plus pratique que le précédent pour les oiseaux d'Afrique du nord).

-Le guide du routard, Edition 2008

-Le petit futé édition 207-2008

-Carte Michelin 744 Tunisie 1/800 000

Remerciements :

Nous remercions chaleureusement E. et B. Veillet dont le compte rendu fut très utile, notamment pour la forme dont nous nous sommes inspirés.

Hichem Azafzaf, contacté directement après le séjour mais dont les comptes-rendus nous furent précieux.

Josiane (notre cousine) et Fehri, son compagnon, qui nous ont accueilli pendant 3 jours à Nabeul avant le départ vers le sud et qui nous ont fait visiter une partie du Cap Bon ; nous leur avons légué la bible sur les oiseaux de Tunisie et le Heinzel car ils s'intéressent maintenant aux oiseaux de très près (il leur reste à acquérir une bonne paire de jumelles mais cela ne saurait tarder !)

Christophe Germain (fondation Tour du Valat) qui a très rapidement fait circuler les données de Flamants bagués recueillies, dans le réseau européen.

13 février 2008 fin d'après midi

Lagune de Tazerka près de Nabeul :

Site aménagé avec observatoires mais des remblaiements sont en cours dans la partie nord.
Entre les lagunes et la mer, petites sanskrites, dunes.

Grande diversité d'oiseaux d'eau notée malgré une prospection très rapide et un comptage très partiel :

Vasières, sansouires, lagune, terrasse sableuse, mer et grau reliant la lagune à la mer :

- Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) , >10 en vol en mer remontant vers le nord
- 1 Héron cendré (*Ardea cinerea*)
- environ 300 Flamants roses (*Phoenicopterus ruber*) (8 individus bagués notés nés en Italie continentale au sud de Venise, Sardaigne, Andalousie et Catalogne.).
- 1 Canard colvert mâle (*Anas platyrhynchos*)
- 2 Canards souchets (*Anas clypeata*)
- + de 150 Foulques (*Fulica atra*)
- > 20 Echasses blanches (*Himantopus himantopus*)
- 1 Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)
- >10 Gravelots à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)
- 1 Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)
- >10 Pluviers argentés (*Pluvialis squatarola*)
- 2 Bécasseaux minutes (*Calidris minuta*) minimum
- >20 Bécasseaux cocorlis (*Calidris ferruginea*)
- >20 Bécasseaux variables (*Calidris alpina*)
- 2 Bécassines sourdes (*Limnocryptes minimus*), levées par hasard dans la sansouire et probablement plus abondante,
- 2 Courlis cendrés (*Numenius arquata*)
- 3-4 Chevaliers arlequins (*Tringa erythropus*)
- Chevalier gambette (*Tringa totanus*) nombre non noté
- 2 Chevaliers aboyeurs (*Tringa nebularia*)
- >150 Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)
- Goéland leucophée (*Larus michaellis*)
- > 20 Sternes caugeks (*Sterna sandvicensis*)
- Cochevis huppé (*Galerida cristata*) ; plus noté dans le compte rendu par la suite car très commun
- Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)
- Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)

14 février 2008 Nabeul-Kelibia-Kerkouane-Cap Bon puis retour par Grombalia

Beau temps

Port de Kelibia (observations partielles) :

- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) >300
- Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*) >30
- Goéland leucophée (*Larus michaellis*) : nbx
- Martinet des maisons (*Apus affinis*) : 1 individu sort des installations portuaires et file vers le fortin (cette espèce ne fut pas revue durant le séjour)
- Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*) commune comme du reste pendant le reste du voyage (plus notée dans le compte rendu par la suite)

Cité antique de Kerkouane Durant la visite :

- Tchagra à tête noire (*Tchagra senegala*) : 1 à proximité d'une tamaricaie qu'il regagne rapidement
- Etourneau unicolore : plusieurs en compagnie du Tchagra ; commun à Nabeul, le Cap Bon et Grombalia
- Mésange maghrébine (*Parus teneriffae*) 2 individus dont 1 chanteur

A noter 2 tortues grecques (*Testudo greaca*) en insolation (un mâle et une femelle)

Entre Soliman et Grombalia :

1 Elanion blanc (*Elanus caeruleus*) près d'un hameau , en chasse

Par ailleurs :

- Pie Grièche méridionale (*Lanius meridionalis*) ; 5 vues dans la journée lors du circuit accompli (sous espèce non notée)
 - Héron garde bœuf (*Bubulcus ibis*) : 2-3 notés avec du bétail près de Grombalia
 - Moineau domestiques (*Passer domesticus*) : commun
 - Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*) ; sous espèce d' Afrique ; vu à plusieurs reprises ; je note le cri différent et le plumage plus clair.
- Au retour, 2 chouettes chevêches dont une dans les faubourgs de Nabeul

Le faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) est commun comme tout au long du séjour

15 février 2008 ; Nabeul et sa région

temps maussade et doux

Nabeul/littoral : coup de vent assez fort

Vu en mer :

-Fou de Bassan (*Sula bassana*) : 2 adultes en vol vers le nord

-Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) : 110 venant des terres (?) et volant vers la mer

Quelques sternes caugeks

10 km au sud du Masri réservoir (accès impossible au plan d'eau , zone militaire)

1 Elanion blanc (*Elanus caeruleus*) perché puis en chasse à proximité des caves du vin 'Magon'

1 Buse féroce (*Buteo rufinus*) même lieu, en vol



16 février 2008 Nabeul –Matmata (avec visites de Monastir, El Jem)

temps maussade et pluvieux , vent violent sur le littoral

Lagune à l'entrée de Monastir

-1 grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)

- 45 Grandes Aigrettes (*Ardea alba*) !!

->30 Mouettes mélanocéphales (*Larus melanocephalus*)

-10 Goélands railleurs (*Larus genei*)

+ Mouette rieuse, Bécasseau minute et Aigrette garzette

En mer, vu encore un Fou de Bassan

A 30 km au nord de Monastir, 3 Grues cendrées (*Grus grus*)

17 février 2008 Matmata- Douz avec détour par Bir Soltane

temps froid, vent glacial (10 ° à midi) mais ciel dégagé

Le matin ballade autour de Matmata

Près de l'hôtel Diar el barbar :

- un couple deTraquet rieur (*Oenanthe leucura*) à l'hôtel
- 6 Perdrix gambras (*Alectoris barbara*) (2 + 4)
- 1 Roselin githagine immature (*Rhodopechys githaginea*)
- 2 Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*), bord d'un oued
- 1 Buse féroce (*Buteo rufinus*) même lieu
- Grive musicienne, Tourterelle maillée, Pigeon biset, Verdier, Moineau espagnol, Fauvette mélanocéphale, Cochevis huppé

3 km sortie nord de Matmata, petite randonnée (2 heures) dans les anciens habitats troglodytes :

Pas grand chose de plus sinon l'abondance de la Perdrix gabra (toutes en couples, 6-7 couples), Tarier pâtre (*Saxicola torquata*), Aigle royal (*Aquila chrysaetos*), 1 individu, déjà vu la veille au même endroit, Gand corbeau (*Corvus corax*), Couette chevêche (*Athene noctua*), 1 couple, Traquet rieur au moins 3 couples, Cochevis huppé, commun.

Fin de matinée et AM, route de Bir Soltane et Bir soltane :

La route est goudronnée, en très bon état même si un endroit le sable en recouvre une partie.

- 6 Grands Corbeaux (*Corvus corax*) vus le long de la route

Arrêt dans un reg, zone sub-désertique avec végétation basse éparse 10 km avant Bir Soltane (2 heures de ballade):

Traces d'élevage et d'un enclos utilisé (troupeaux ovins notés peu avant)

- 2 chouettes chevêches (*Athene noctua*)
- 2 alouettes pispolettes (*Calendrella rufescens*)
- 1 Alouette bilophe (*Eremophila bilopha*)
- 1 Sirli du désert (*Alaemon alaudipes*)
- 1 Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)
- 1 mâle de Traquet du désert (*Oenanthe desertii*)
- 1 mâle de Traquet deuil (*Oenanthe lugens*)

Un peu plus loin à 3 km environ :

1 couple de Traquets à tête grise (*Oenanthe moesta*)

Pique nique à Bir Soltane : abreuvoir en eau, floraison de quelques plantes (1 h 30 d'arrêt)

- 2 Ammomanes élégantes (*Ammomanes cincturus*)
- 2 Sirlis du désert (*Alaemon alaudipes*) dans les dunes
- 10 Roselins githagine (*Rhodopechys githaginea*) en plumage nuptial viennent boire
- plus de 260 Moineaux espagnols (*Passer hispanolensis*) au point d'eau
- vu aussi Bergeronnette grise, Faucon crécerelle, Tourterelle maillée, à l'unité

18 février 2008 Douz et environs jusqu'à El Faouar

2 nuits à l'Hôtel Medina, à proximité immédiate de la palmeraie. Beau temps frais la nuit.

Le Bruant striolé (*Emberiza striolata*) est commun autour de l'hôtel (4-5 chanteurs).

Dans la palmeraie :

- Tourterelle turque (*Streptopelia turtur*), quelques unes
- Tourterelle maillée, abondante
- 1 Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*)
- Bergeronnette grise (*Motacilla alba*), plusieurs
- Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) au moins 20
- Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*)
- Rouge gorge (*Erithacus rubecula*)
- Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*), au moins 25

Zone humide à la sortie ouest de Douz, route d'El Faouar/Bechini :

- 20 Aigrettes garzettes (*Egretta garzetta*)
 - 140 Canards souchets (*Anas clypeata*)
 - 150 sarcelles marbrées (*Marmaronetta augustirostris*)
- présence du Cisticole des joncs, des Hirondelles rustiques et de fenêtre
- Route de Bechini, en chemin 2 arrêts :
- 1 Fauvette de l'Atlas (*Sylvia deserticola*)
 - 2 Traquets isabelles (*Oenanthe isabellina*)
 - 1 Rubiette de moussier (*Phoenicurus moussieri*)
 - 1 Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*) sur une zone humide presque asséchée avec des Bécasseaux minutes (*Calidris minuta*)
- noté aussi 1 Buse féroce et du faucon crécerelle et présence régulière de la Pie grièche méridionale (*Lanius meridionalis*)

Proximité d'El Sabria :

- 2 Corbeaux bruns (*Corvus ruficollis*) posés et en vol en bordure de palmeraie ; les cris facilitent l'identification (3 autres vus à l'entrée d'El Faouar).
- 1 Fauvette de l'Atlas (*Sylvia deserticola*)
- Chant Huppe fasciée (*Upupa epops*)
- Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephalus*)

Plan d'eau de Ghidma (recensement partiel) :

- au moins 1 Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)
- 5 Canards siffleurs (*Anas penelope*)
- > 15 Canards chipeaux (*Anas strepera*)
- 160-180 Canards souchets (*Anas clypeata*)
- > 20 sarcelles d'hiver (*Anas crecca*)
- 1 mâle de Sarcelles d'été (*Anas querquedula*)
- 25 à 30 Sarcelles marbrées (*Marmaronetta augustirostris*)
- 1 mâle de Fuligule nyroca
- au moins 10 Foulques macroules (*fulica atra*)
- 1 busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)

A noter 4 sangliers (*Sus scrofa*), tués par des chasseurs et dont les cadavres gisent près de l'étang (les jeunes du village nous les ont montrés)

19 février 2008 Douz-Tozeur avec traversée du chott el Jerid

nuit encore fraîche à Douz (chambre non chauffée mais journée agréable, sans vent)
6 Bruants striolés autour de l'hôtel

1 er Arrêt, zone humide de Jemna (dénombrement des anatidés partiel) :

A noter le dépôt volontaire des ordures municipales à proximité immédiate du plan d'eau...

- 5 hérons cendrés (*Ardea cinerea*)
- 1 Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)
- 2 Flamants roses (*Phoenicopterus ruber*)
- 28 Tadornes casarcas (*Tadorna ferruginea*), tous accouplés
- 193 tadornes de Belon (*Tadorna tadorna*)

Environ 1100 canards de surface dont :

- >100 Canards siffleurs (*Anas penelope*)
- Canards chipeaux (*Anas strepera*)
- Canards souchets (*Anas clypeata*)
- Canards pilet (*Anas acuta*)
- > 300 sarcelles d'hiver (*Anas crecca*)
- 1 mâle de Sarcelles d'été (*Anas querquedula*)
- environ 100 Sarcelles marbrées (*Marmaronetta augustirostris*)

Parmi les canards l'un d'eux attire notre attention lors de son envol bref ; en effet il offre un large miroir alaire blanc ; posé il présente des flancs orangés puis blancs sur la partie visible du ventre ; la tête est grise avec un front clair, bas ventre blanc sous caudales blanches, dos clair ; sa taille est semblable au siffleur.

A notre retour en France, la description nous a conduit à déterminer une espèce américaine, dans un premier temps *Anas americana*, mais les critères des sous caudales et des flancs

amènent sans ambiguïté à identifier *Anas sibilatrix*, le canard siffleur du Chili ; une femelle adulte ou un jeune mâle en train de prendre son plumage nuptial.

Compte tenu de la chorologie de l'espèce (distribution extrême sud-américaine), il est très probable qu'il s'agisse d'un oiseau issu de captivité (espèce souvent détenue en captivité comme en atteste les sites internet)

- 1 Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)
- 3 Avocettes élégantes (*Recurvirostra avosetta*)
- 1 Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)
- 1 Traquet oreillard mâle (*Oenanthe hispanica*)

Petite zone humide à moins de 2 km de Jemna :

Environ 32 Echasses blanches (*Himantopus himantopus*)

Au nord du Chott el Jerid, jebel près de Sidi Boulell direction Gdamen :

Très beau site avec 2 lieux de prières tenue par des Marabouts, encadrant l'entrée d'un canyon. Ballade dans le jebel (2 heures) :

- 3 à 4 couples de Traquet à tête blanche (*Oenanthe leucopyga*), piémont
- 6 Roselins githagines (*Rhodopechys githaginea*)
- 1 traquet motteux, (*Oenanthe oenanthe subsp. Seebohmi*)
- 1 Monticole bleu (*Monticola solitarius*), gorge
- 1 Hirondelle de Rochers (*Hirundo rupestris*), gorge
- 1 Buse féroce (*Buteo rufinus*)
- plusieurs Ammomanes élégantes au pied du jebel

Par ailleurs, nous avons vu plusieurs goundis (*Ctenodactylus gundi*) alors qu'à Matmata nous n'avions vu que les terriers.



20 février 2008 Tozeur-Metloui

Visite de la Medina de Tozeur ; le Bruant striolé est bien représenté.

Environs de Chebika :

semi désert pierreux pâturé par les dromadaires ;
-2 Traquets à tête blanche (*Oenanthe leucopyga*),
-1 de Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*) mâle

à Chebika :

Tourterelle turque et Bruant striolé

2 km au nord du village, pique nique au pied du jebel :

-1 Aigle de Bonelli posé sur un piton pendant plus de 30 minutes puis s'envole et se repose dans le même lieu.
-> 30 Roselins githagines (*Rhodopechys githaginea*), près de l'oued
- 1 traquet rieur mâle (*Oenanthe leucura*), oued
- 2 Ammomanne isabelline (*Ammomanes iasbellina*) coté plaine

Gorges de Tamerza et abords (passage éclair)

-Nombreux Pigeons bisets (*Colomba livia*)
-1 Traquer deuil (*Oenanthe lugens*) et 1 autre près de Redeyef

21 février 2008 Metloui- Sbeitla

Nous avons pris le Lézard rouge pour la visite touristique classique.

-Pigeons bisets (*Colomba livia*)
-1 Traquer deuil (*Oenanthe lugens*)
- Cochevis sp.

Présence d'un Crapaud vert (*Bufo viridis*) égaré dans le torrent qui paraît très pollué.

Ensuite nous continuons vers le nord ; pique nique au bord d'un lac naturel (Lac Lafiel) au nord de Feriana ; belle zone humide dont le niveau est très bas.

- 15 Gangas sp. En vol vus trop loin (les seuls du voyage... alors que 4 espèces sont signalées en Tunisie)
- 130 Flamants roses (*Phoenicopterus ruber*)
- 70 Tadornes de Belon (*Tadorna tadorna*)
- > 600 Canards dont Pilets, souchets, Sarcelles d'hiver et Canard colvert + Foulques
- 2 Chevaliers cul blancs (*Tringa Ochroopus*)
- 1 Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*) mâle

Il y a certainement) plus de choses et il s'agit d'un comptage très partiel (surtout pour les limicoles mais nous sommes hélas pressés.

22 février 2008 Sbeitla-Nabeul

lors de la visite du site antique de Sbeitla :

- 3 Traquets riens (*Oenanthe leucura*),
 - 10 Moineaux soulcie (*Petronia petronia*)
 - >10 bruants striolés (*Emberiza striolata*)
- ainsi que Moineau espagnol, Etourneau unicolore, Cochevis huppé, Serin cini, Verdier d'Europe, Rouge queue noir, Pigeon biset, Tourterelle maillée, Pie grièche méridionale, et Tarier pâtre.

Ensuite nous décidons, pour terminer, de pique niquer au barrage El Houareb.

Dans les falaises avant le barrage (1 km) et à proximité :

- 1 couple de Faucons laniers (*Falco biarmicus*) observé posés dans les falaises et en vol ; un accouplement noté + cris du mâle ; belle observation
- 1 couple de Grands corbeaux (*Corvus corax*) en vol (virés par les Faucons ?)

Plan d'eau du barrage coté barrage (pas de comptage sur la partie amont, de toute façon peu attractive compte tenu d'un niveau d'eau dramatiquement faible) :

- 10 Grèbes castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)
- au moins 25 hérons cendrés (*Ardea cinerea*)
- 15 Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)
- 18 Grandes Aigrettes (*Ardea alba*)
- 2 Ibis falcinnelle (*Plegadis falcinellus*)
- 77 Spatules blanches ! (*Platalea leucorodia*)
- 71 Tadornes de Belon (*Tadorna tadorna*)
- 150 Sarcelles d'hiver (*Anas crecca*)
- > 50 Canards pilets (*Anas acuta*)

- 10 canards colverts (*Anas platyrinchos*)
- >100 Canards siffleurs (*Anas penelope*)
- Canards chipeaux (*Anas strepera*)
- > 100 Canards souchets (*Anas clypeata*)
- > 20 Foulques (*Fulica atra*)
- 10 vanneaux huppés (*Vanellus vanellus*)
- 10 Avocettes (*Recurvirostra avosetta*)
- 30 Bécasseaux minutes (*Calidris minuta*)
- 28 Barges à Queue noire (*Limosa limosa*)
- Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)
- Combattant varié (*Philomachus pugnax*)
- 1 Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) femelle

et 1 Grébe huppé (*Podiceps cristata*) sur un petit plan d'eau à proximité du barrage

Pour les limicoles le comptage est incomplet. En tout cas, le site est sympa.

Ensuite poursuite de notre route vers le nord :

-à Enfida, 5 nids de Cigognes blanches (*Ciconia ciconia*) aménagés sur des pylônes HT, occupés

Auparavant, nous avons longé le sebkhet Kelbia qui paraît à sec et au nord de Kairouan, nous longeons des sansouires où nous notons :

- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)
- Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)
- 1 Tourterelle des bois, précoce (*Streptopelia turtur*)

Bilan du voyage

La Tunisie présente une grande diversité de biotopes sur une surface modeste. Les zones humides sont nombreuses et remarquables. Les sites semi- désertiques et désertiques sont à la fois somptueux et mystérieux quand on les découvre pour la première fois. Le littoral avec ses grandes lagunes, les vasières et la pleine mer sont particulièrement vivants en hiver. En peu de temps, et sur de faibles surfaces, on peut donc voir une grande diversité d'oiseaux. Les gens sont accueillants et les accès relativement aisés aux sites d'intérêt ornithologique.

En quelques jours nous avons noté une centaine d'espèces sachant que le voyage n'était pas uniquement à vocation naturaliste. Concernant la conservation des zones humides (lagunes, marais...) nous avons hélas noté des problèmes de destruction ou tout au moins des débuts de comblements. Ceci dit, en France, nous n'avons pas non plus régler ce type de problème. Nous avons aussi constaté des efforts en matière de conservation (lagunes au nord de Nabeul, pylônes aménagés pour les Cigognes...).

Dans la mesure où nous n'avons pas tout vu (certaines alouettes, les gangas...) et sommes passé beaucoup trop vite dans certaines régions, nous y retournerons, d'autant que Josiane et Ferhi seront ravis de nous revoir . Participer à la recherche de certaines espèces et à des comptages des oiseaux en hiver avec les ornithologues locaux serait sympa mais peut être va t-il falloir attendre la retraite !!

Bref, nous recommandons vivement la Tunisie à tous les amoureux de paysages et de nature.