

Compte-rendu d'un voyage en Turquie du 5 au 12 juin 2009.

Par Thiery Louvel (rédacteur), Alain Moussu & Benjamin Kabouche

Contact : LPO PACA, 6, rue Jean Jaurès – 83400 Hyères-les-Palmiers

thiery.louvel@free.fr

alainmoussu@wanadoo.fr

Benjamin.kabouche@lpo.fr

Réf. Thiery Louvel, Alain Moussu & Benjamin Kabouche (2009).- Compte-rendu d'un voyage en Turquie du 5 au 12 juin 2009. Rapport LPO PACA, Hyères : 29p.

Résumé :

Parmi les 169 espèces contactées pendant le voyage, nous avons eu la chance d'observer la majorité des espèces spécifiques (notamment toutes les espèces d'alouettes) présentes dans la zone visitée. Une partie d'entre-elles nous a cependant échappé (Erismature à tête blanche, Martin-chasseur de Smyrne, Pic à dos blanc, Hypolaïs des oliviers), ce qui constitue une bonne raison de retourner un jour dans ce superbe pays (en poussant peut-être plus à l'est...).

En ce début du mois de juin, la migration pré-nuptiale est pratiquement terminée : les marais côtiers ont été désertés par la plupart des limicoles, et les passereaux migrateurs (tels que les gobemouches) ont déjà regagné leur aire de reproduction située plus au nord. Par contre, la période est idéale pour l'observation de plusieurs spécialités en pleine phase de reproduction : Tadorne casarca, Sarcelle marbrée, Vanneau éperonné, et divers passereaux. Le moment fort de notre excursion réside peut-être dans la découverte de la probable reproduction (il nous restait à découvrir un nid...) de la Bergeronnette citrine sur deux sites du littoral méridional de la Turquie (marais d'Adana et delta du Göksü). Ceci constitue une preuve supplémentaire de l'avancée de l'espèce en tant que nicheuse vers l'ouest, et même dans le cas de la Turquie vers le sud-ouest, puisque la reproduction de celle-ci n'est signalée que depuis peu dans l'extrême est du pays. Petite déception toutefois sur le front de la Talève sultane, dont nous devons nous contenter d'une brève observation sur la zone humide d'Akgöl, pourtant réputée accueillir un bel effectif. A noter également l'absence d'observation de Pie-grièche à poitrine rose (serait-elle rare au moins dans la zone visitée ?).

Et il n'y a pas eu que des oiseaux ! Mention particulière pour cette fantastique rencontre avec le Phoque moine (une espèce menacée de disparition au niveau mondial), dont 2 individus nous ont fait le plaisir de pointer leur grosse tête au-dessus des flots, et ce à seulement quelques dizaines de mètres du rivage (delta du Göksü).

Déroulement du séjour :

Vendredi 5 juin 2009

Arrivée à l'aéroport d'Antalya à 15h00.

Récupération de notre véhicule (Renault Clio) et premières observations autour de l'aéroport. Nous prenons la route pour Akseki, que nous atteignons en fin d'après-midi. Petite balade autour du village, avant la tombée de la nuit.

Samedi 6 juin 2009

Nous quittons notre hôtel tôt le matin pour une randonnée à travers la campagne d'Akseki. Nous empruntons un chemin qui serpente d'abord à travers champs et pâturages, puis qui s'élève tranquillement dans la montagne. Durant la montée, nous traversons une belle cédraie, alors qu'une végétation méditerranéenne familière couvre les pentes, à la différence que chênes kermès, genévriers et autres essences atteignent une taille inconnue chez nous (cf dernière photo p 29) !



Maquis d'Akseki



Chaîne du Taurus

Nous quittons Akseki en début d'après-midi et prenons la route pour la ville d'Eregli. Bref arrêt à un col (altitude 1825 mètres) surplombant la ville de Seydisehir ; depuis le col, nous apercevons un vaste plan d'eau, le Sugla Gölü.

Arrêt sur les berges du Sugla Gölü (lagune située entre les villes de Seydisehir et Bozkir).

Entre les villes de Bozkir et Karaman, nous traversons une vaste plaine, où alternent cultures et prairies. Entre les villes de Karaman et Eregli, nous traversons une vaste steppe qui n'est pas sans nous rappeler la Crau... les cailloux en moins !

Dimanche 7 juin 2009

Nous quittons notre hôtel tôt le matin destination Bogecik, une localité au nord de laquelle nous espérons découvrir une trace de la zone humide d'Akgöl : nous ne trouverons pas même une mare... Cependant, pendant nos recherches, nous traversons deux villages typiques (aux maisons de torchis), Adabag et Tatlikuyu, qui valent le détour (et pas seulement pour les oiseaux !). Nous prenons ensuite la direction de Nigde ; en chemin, bref arrêt au Kolsuz Geçidi (un col situé à 1490 mètres d'altitude). Arrivée en milieu de journée au barrage d'Akkaya, situé au sud de Nigde. Balade sur la rive orientale du lac de retenue.

Départ pour Demirkazik via Kilavuz ; la petite route que nous empruntons traverse un paysage sauvage et vallonné. Au passage d'un col, nous découvrons un panorama époustouflant, avec les montagnes du Taurus en toile de fond. Arrivée en fin d'après-midi dans le village de Çukurbag, où nous rencontrons rapidement un guide (et propriétaire d'une petite pension ozsafak.hypermat.net) qui se révélera être fort utile pour l'organisation et la réussite de notre randonnée prévue pour le lendemain. Il nous reste suffisamment de temps avant la nuit pour nous balader autour de Çukurbag et le long du torrent qui traverse la petite localité.

Lundi 8 juin 2009

La journée démarre à 3h00 du matin ! Après un frugal petit-déjeuner, nous prenons place dans un véhicule qui nous dépose, après environ 2h00 d'ascension par une ancienne piste minière, à 3000 mètres d'altitude, au pied des plus hauts sommets de la chaîne d'Aladag (culminant vers 3700 m), dans les monts Taurus. C'est à pied que nous arrivons à la limite des neiges... et logiquement dans l'habitat du Tétraoagalle de Perse !

Il nous faudra attendre le milieu de la matinée, alors que nous entamons notre descente (qui se fera à pied jusqu'à notre pension, soit un dénivelé de 1700 mètres), pour que le tétraoagalle daigne se manifester. Muet jusque vers 10h00, plusieurs oiseaux se manifestent enfin ; nous finissons par repérer un mâle posté sur un éperon rocheux, depuis lequel il lance son cri extraordinaire, qui se répercute à l'infini contre les parois rocheuses. Assurément, un des moments forts de notre voyage. Lente descente vers Demirkazik, puis Çukurbag, pendant laquelle nous traversons plusieurs milieux (notamment des pelouses alpines) avec leur cortège de nouvelles espèces.

Mardi 9 juin 2009

En route vers Adana.

Nous consacrons notre matinée à la recherche de bons spots autour des lacs de retenue des barrages de Çatalan et de Seyhan, situés au nord d'Adana : beaucoup de détours pour un résultat final plutôt moyen.

Nous partons ensuite pour la lagune de Tuzla Gölü, située au sud-ouest d'Adana et séparée de la mer par un cordon dunaire. Deux bonnes heures seront nécessaires pour atteindre notre objectif ; les petites routes que nous empruntons, poussiéreuses et en mauvais état, traversent une vaste et monotone plaine cultivée (essentiellement des pastèques et des melons). Enfin, après moult errements et vagabondages, nous dénichons une lagune cernée de toute part par des cultures.... Je ne sais pas ce qui reste aujourd'hui des immenses marais d'Adana (ou de Cukurova), mais la situation, au moins dans leur partie sud-ouest, nous inspire quelque inquiétude et ne laisse rien augurer de bon pour l'avenir ! Le secteur n'invite pas vraiment le voyageur à jouer les prolongations, et ce malgré le fort potentiel du site ; aussi, après une paire d'heures consacrée à une promenade sur la rive sud-ouest de la lagune, nous décidons de rejoindre sans tarder la ville de Silifke, où nous espérons trouver une zone humide plus attractive...

Mercredi 10 juin 2009

Journée consacrée à la visite de l'immense zone humide d'Akgöl, située dans le delta du Göksü, et séparée de la mer par un cordon dunaire plus ou moins végétalisé. Début de notre randonnée, tôt le matin, à partir d'une zone résidentielle située au sud-ouest du delta (à une demi-dizaine de kilomètres de Taşucu), et retour par la plage.

Jeudi 11 juin 2009

Le matin, randonnée jusqu'à l'embouchure du Göksü (à partir de Dalyan). Le long de la plage, nous relevons une demi-dizaine de traces indiquant que des tortues marines sont récemment venues pondre.

Dans l'après-midi, nous rejoignons le village de Uzuncaburç, situé dans la montagne (à 1200 mètres d'altitude), à une trentaine de kilomètres au nord de Silifke.

Repas en soirée à Silifke, avant de rejoindre Antalya.

Vendredi 12 juin 2009

Décollage d'Antalya à 7h00, et arrivée à Marseille vers 9h30.

Remarques diverses


Carte des principaux sites visités



Météo : Bonnes conditions météo pendant tout le voyage, avec des températures dépassant parfois largement les 30°C, notamment sur la frange côtière. Même en altitude, à plus de 3000 mètres dans la chaîne d'Aladag, nous nous sommes rapidement débarrassés de nos polaires !

La documentation :

- Le Guide Ornitho, K. Mullarney *et al.*, Delachaux & Niestlé, 1999.
- Compte-rendu d'un voyage en Turquie en avril 2004, Eric Durand (dont nous nous sommes largement inspirés !).



Paysage de plaine entre Akseki et Seydisehir.

Liste commentée des oiseaux contactés pendant le voyage

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)

Le 6/06, quelques observations sur la partie occidentale du Sugla Golü.

Le 7/06, une demi-dizaine d'observations au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 10/06, une trentaine d'individus stationnent sur la zone humide d'Akgöl/Silifke; parmi ceux-ci, un adulte avec 2 jeunes, et des oiseaux nicheurs.

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)

Le 7/06, 2 individus au barrage d'Akkaya/Nigde.

Pélican blanc (*Pelecanus onocrotalus*)

Le 10/06, une probable observation de cette espèce (mais sujet très éloigné) sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Fou de Bassan (*Morus bassanus*)

Le 10/06, 2 observations au large du delta du Göksü/Silifke.

Cormoran pygmée (*Phalacrocorax pygmeus*)

Le 9/06, au moins 6 individus stationnent sur les berges boisées d'un cours d'eau, au sud du barrage de Çatalan/Adana.

Héron cendré (*Ardea cinerea*)

Le 6/06, une observation au Sugla Golü.

Le 7/06, 2 observations (dont un juvénile) au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 9/06, une observation au sud du barrage de Çatalan, et 5 observations autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana.

Le 10/06, 3 observations sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Le 11/06, 2 observations à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Héron pourpré (*Ardea purpurea*)

Le 7/06, une observation au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 10/06, une dizaine d'observations sur la zone humide d'Akgöl/Silifke (où l'espèce semble commune et probablement nicheuse).

Le 11/06, une observation à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Grande Aigrette (*Ardea alba*)

Le 11/06, 2 individus (à bec jaune) sont observés à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)

Le 7/06, 3 individus au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 9/06, un rassemblement d'environ 65 individus au sud du barrage de Çatalan/Adana; commune le long de la rivière Seyhan/marais d'Adana.

Le 10/06, quelques observations sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Héron garde-boeufs (*Bubulcus ibis*)

Le 9/06, une douzaine d'observations autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana.

Le 11/06, 5 individus sur une zone cultivée du delta du Göksü/Silifke.

Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*)

Le 9/06, 2 observations le long de la rivière Seyhan, et 2 observations sur la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana.

Le 10/06, plus d'une quarantaine d'observations (dont un groupe de 30 ind. en vol) sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)

Le 9/06, au moins 11 individus stationnent sur les berges boisées d'un cours d'eau, au sud du barrage de Çatalan/Adana.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*)

Le 6/06, 3 individus en vol nord (en migration ?) franchissent un col entre Akseki et Seydisehir.

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)

Le 5/06, une demi-dizaine d'observations autour de Side; des nids occupés.

Le 6/06, une observation à proximité de Seydisehir; une cinquantaine d'individus stationne sur les prairies autour du Sugla Gölü.

Le 7/06, un groupe de 45 individus dans un champ à la périphérie d'Eregli; une demi-dizaine d'observations à Adabag, et un nid occupé à Tatlikuyu; 2 individus au Kolsuz Geçidi; 5 individus au barrage d'Akkaya/Nigde; 3 individus observés pendant le trajet Nigde/Demirkazik (autour d'une grande flaque d'eau).

Le 9/06, une dizaine de nids installés au sommet de pylônes, autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana (avec des jeunes).

Le 10/06, présente (et nicheuse) à Taşucu; une quinzaine d'observations dans le delta du Göksü/Silifke.

Le 11/06, une dizaine d'observations sur des parties cultivées le long de la rivière Göksü/Silifke.

Flamant rose (*Phoenicopterus roseus*)

Le 7/06, environ 90 individus au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 9/06, 8 individus stationnent sur la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana.

Le 10/06, un individu sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*)

Le 6/06, un couple + 5 canetons sont observés dans le quart nord-ouest du Sugla Gölü.

Le 7/06, une vingtaine d'observations (dont un couple avec 7 canetons) au barrage d'Akkaya/Nigde; les oiseaux se tiennent principalement dans le nord du lac de retenue.

Le 10/06, 2 couples (avec respectivement 4 et 2 poussins) présents sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)

Le 7/06, un couple observé au barrage d'Akkaya/Nigde.

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)

Le 10/06, une dizaine d'individus stationne sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Canard souchet (*Anas clypeata*)

Le 7/06, 4 individus (3m1f) observés au barrage d'Akkaya/Nigde (partie nord).

Sarcelle marbrée (*Marmaronetta angustirostris*)

Le 11/06, un adulte + 6 canetons sont observés sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Nette rousse (*Netta rufina*)

Le 7/06, 9 mâles observés au barrage d'Akkaya/Nigde (partie nord).

Le 10/06, 6 mâles observés sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Fuligule milouin (*Aythya ferina*)

Le 6/06, un couple stationne dans le quart nord-ouest du Sugla Golü.

Le 7/06, une centaine d'oiseaux stationne sur le lac de retenue du barrage d'Akkaya/Nigde (principalement dans sa partie nord).

Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)

Le 10/06, 3 individus sont observés sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)

Le 7/06, 3 mâles observés au barrage d'Akkaya/Nigde (partie nord).

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)

Le 6/06, 2 individus (très pâles) sont observés sur les hauteurs d'Akseki.

Milan noir (*Milvus migrans*)

Le 7/06, une observation au niveau du Kolsuz Geçidi (à 1490 m. d'altitude); peut-être un migrateur.

Vautour fauve (*Gyps fulvus*)

Le 8/06, un individu survole la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik.

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*)

Le 6/06, 3 observations sur les contreforts autour d'Akseki; une observation au niveau d'un col (altitude 1825 m.) entre Akseki et Seydisehir.

Le 9/06, une observation autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana.

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)

Le 7/06, un oiseau immature est observé entre les localités d'Adabag et de Tatlikuyu.

Le 10/06, 3 observations (oiseaux de type femelle) sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Buse des steppes (*Buteo buteo vulpinus*)

Le 11/06, un individu est observé dans des gorges, entre Silifke et Demircili.

Buse féroce (*Buteo rufinus*)

Remarque : en Turquie, on rencontre la sous-espèce nominale.

Le 6/06, une observation autour du Sugla Golü; une observation à l'entrée de Bozkir et une seconde pendant le trajet Bozkir/Karaman; 5 individus posés en fin de journée sur les poteaux d'une ligne électrique traversant la steppe entre Karaman et Ereğli.

Le 7/06, une observation à Adabag; 3 observations pendant le trajet Eregli/Nigde, dont un oiseau au niveau du Kolsuz Geçidi (à 1490 m. d'altitude); 3 observations pendant le trajet Nigde/Demirkazik.
Le 8/06, une observation sur les contreforts au-dessus de Demirkazik (à environ 2000 m. d'altitude).
Soit 16 individus au total.

Aigle royal (*Aquila chrysaetos*)

Le 8/06, 2 observations (peut-être d'un même individu) sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik; l'un des oiseaux est posé sur une barre rocheuse (à 5h30), à plus de 3000 m. d'altitude.

Aigle botté (*Hieraetus pennatus*)

Le 7/06, un adulte de morphe sombre de passage (en migration ?) au Kolsuz Geçidi (à 1490 m. d'altitude).

Faucon crécerellette (*Falco naumanni*)

Le 7/06, une colonie de reproduction (avec au moins une cinquantaine d'oiseaux présents le matin au lever du jour) à Adabag; une dizaine d'observations à Tatlikuyu; et des oiseaux éparpillés sur la steppe alentour.

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)

Le 6/06, 2 observations dans la campagne autour d'Akseki; une observation à proximité de Karaman.
Le 7/06, 2 observations à Tatlikuyu.
Le 8/06, une observation sous la crête sommitale de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik (à plus de 3000 m. d'altitude); une observation dans un canyon (où il niche probablement) au-dessus de Demirkazik.
Le 9/06, une observation au sud du barrage de Çatalan/Adana.

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)

Le 7/06, un couple (probablement nicheur) observé dans une ripisylve à Çukurbag.
Le 10/06, une observation sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Faucon sacre (*Falco cherrug*)

Le 8/06, un adulte est observé dans la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik; à notre arrivée sur place, l'oiseau survole les crêtes (altitude 3600 mètres), puis se pose sur celles-ci pour y demeurer pendant les 2 heures que dure notre stationnement sur la zone.

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)

Le 11/06, un adulte est observé (posé sur un labour) dans le delta du Göksü/Silifke.

Tétraogalle de Perse (*Tetraogallus caspius*)

Le 8/06, au moins 5 individus sont contactés dans un cirque situé sous les crêtes sommitales de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik (à plus de 3000 m. d'altitude). Un mâle chanteur finit par être localisé sur un piton rocheux ; la femelle se tient juste au-dessus de lui (les deux oiseaux finiront par s'envoler).

Perdrix choukar (*Alectoris chukar*)

Le 8/06, 7 observations sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik, jusqu'à environ 3000 m. d'altitude.
Le 9/06, 2 observations et des contacts sur les contreforts au-dessus de Çukurbag.

Francolin noir (*Francolinus francolinus*)

Le 9/06, un chanteur est contacté au sud du barrage de Çatalan/Adana.
Le 10/06, 2 chanteurs sont contactés dans la partie sud-ouest de la zone humide d'Akgöl/Silifke; l'un des oiseaux est assez bien observé, posté sur un buisson (myrte ?).
Le 11/06, 4 chanteurs sont contactés dans la partie sud-ouest de la zone humide d'Akgöl (l'un d'eux est vu dans de très bonnes conditions), et un chanteur est posté sur un arbuste dans le secteur de l'embouchure du Göksü/Silifke.



Gorge dans le massif de Demirkazik avec le Martinet noir nicheur

Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)

Le 9/06, un contact est obtenu le long d'un fossé, autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana ; quel est le statut de l'espèce en Turquie, début juin paraissant bien tardif pour le passage prénuptial !

Talève sultane (*Porphyrio porphyrio*)

Remarque : en Turquie, on rencontre la sous-espèce *caspius* (à tête gris bleu pâle).

Le 10/06, l'un d'entre-nous réalise l'unique et brève observation d'un individu sur la zone humide d'Akgöl/Silifke (pourtant réputée accueillir une population substantielle...).

Foulque macroule (*Fulica atra*)

Le 6/06, plusieurs dizaines d'individus (dont des juvéniles) stationnent sur le quart nord-ouest du Sugla Golü.

Le 7/06, quelques centaines d'individus stationnent sur le lac de retenue du barrage d'Akkaya/Nigde (principalement dans sa partie nord).

Le 9/06, une vingtaine d'individus sur le lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana.

Le 10/06, 150⁺ individus présents sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Huïtrier pie (*Haematopus ostralegus*)

Le 9/06, 4 individus stationnent sur la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana.

Le 11/06, 2 individus observés à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*)

Le 6/06, 3 individus sur le Sugla Golü.

Le 7/06, une dizaine d'individus au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 9/06, 2 individus autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana; 2 individus le long de la rivière Seyhan et plusieurs dizaines de couples nicheurs sur la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana.

Le 10/06, 8 individus sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*)

Le 7/06, un chanteur contacté au niveau du Kolsuz Geçidi (à 1490 m. d'altitude).

Glaréole à collier (*Glareola pratincola*)

Le 9/06, une douzaine d'individus sont observés, à l'occasion dans de très bonnes conditions, sur la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana, où l'espèce est probablement nicheuse.

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)

Le 6/06, 6 individus autour du Sugla Golü.

Le 7/06, 6 individus au barrage d'Akkaya/Nigde.

Vanneau éperonné (*Vanellus spinosus*)

Le 7/06, au moins 3 couples (nicheurs probables) présents au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 9/06, une observation le long de la rivière Seyhan, et 20+ observations sur la lagune de Tuzla Golü/marais d'Adana (où l'espèce est probablement nicheuse).

Le 10/06, au moins une douzaine de couples nicheurs cantonnés dans la partie sud de l'Akgöl/Silifke; les adultes alarment, et quelques poussins sont observés.

Le 11/06, un couple alarme au niveau de l'embouchure du Göksü/Silifke.

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)

Le 11/06, un oiseau en plumage internuptial est observé à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)

Le 7/06, un groupe de 4 individus au barrage d'Akkaya/Nigde.

Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)

Le 7/06, un couple au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 9/06, quelques couples (nicheurs probables) sur la lagune de Tuzla Golü/marais d'Adana.

Le 10/06, une dizaine d'observations sur la zone humide d'Akgöl, et une vingtaine (oiseaux souvent en couples) pendant notre retour le long de la plage/Silifke.

Le 11/06, plusieurs dizaines d'observations (dont un groupe de 30 oiseaux autour d'une mare) à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Gravelot de Leschenault (*Charadrius leschenaultii*)

Remarque : la sous-espèce *columbinus* se reproduit en Turquie ; cependant, la sous-espèce *crassirostris* ne peut pas être écartée, le bec des oiseaux observés nous ayant paru fort et plutôt long...

Une des bonnes surprises de ce voyage !

Le 7/06, 8 individus sont découverts à une centaine de mètres à l'est du lac de retenue du barrage d'Akkaya/Nigde, sur une zone steppique ; les oiseaux sont à différents stades de la mue pré-nuptiale (certains quasi-nuptiaux).

Courlis cendré (*Numenius arquata*)

Le 11/06, une observation à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Chevalier gambette (*Tringa totanus*)

Le 7/06, 4 individus observés au barrage d'Akkaya/Nigde.

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)

Le 6/06, une observation sur le Sugla Golü.

Le 7/06, une observation au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 9/06, 2 individus observés sur la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana.

Le 10/06, 2 individus observés sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)

Le 6/06, 9 observations au total sur le Sugla Golü.

Le 7/06, une dizaine d'individus présents au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 10/06, 2 individus observés sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Chevalier guignette (*Tringa hypoleucos*)

Le 7/06, 4 observations au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 9/06, une observation au barrage de Seyhan/Adana.

Combattant varié (*Philomachus pugnax*)

Le 9/06, une observation (femelle blessée) autour de la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana.

Le 10/06, une observation sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Goéland d'Audouin (*Larus audouinii*)

Le 9/06, une observation sur les rives du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana.

Le 11/06, 9 individus stationnent sur un banc de sable, à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Goéland leucophée (*Larus michahellis*)

En général, présent en petits nombres sur le littoral (Antalya, Silifke, Adana).

Le 6/06, une observation sur le Sugla Golü (l'unique contact dans l'intérieur).

Le 11/06, une soixantaine d'individus stationne à l'embouchure du Göksü (notre plus grosse bande).

Remarque : un possible **Goéland pontique** (*L. cachinnans*) immature dans le delta du Göksü (11/06).

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)

Le 6/06, une dizaine d'observations sur le quart nord-ouest du Sugla Golü.

Le 7/06, 8 individus au barrage d'Akkaya/Nigde.

Goéland railleur (*Larus genei*)

Le 10/06, 3 individus survolent la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Sterne hansel (*Sterna nilotica*)

Le 9/06, une observation sur la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana.

Le 11/06, 2 individus sont observés sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Sterne caspienne (*Sterna caspia*)

Le 9/06, 2 individus sont observés en vol au-dessus de la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana.

Sterne caugék (*Sterna sandvicensis*)

Le 11/06, 3 individus sont observés à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)

Le 6/06, quelques observations sur le quart nord-ouest du Sugla Golü.

Le 9/06, une observation au barrage de Seyhan/Adana; 2 couples (nicheurs probables) observés sur la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana.

Le 10/06, quelques dizaines d'observations sur la zone humide d'Akgöl/Silifke; des adultes font des allers-retours entre la mer et la lagune, et une petite colonie de reproduction (avec quelques poussins) est découverte en bordure de roselière.

Le 11/06, 3 individus stationnent à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Sterne naine (*Sterna albifrons*)

Le 6/06, plusieurs dizaines d'oiseaux sont observées sur le quart nord-ouest du Sugla Golü; plus au large (toujours dans la partie occidentale), présence probable d'une importante colonie de reproduction, sur "îlot" végétal (en compagnie de l'espèce suivante).

Le 9/06, commune (70⁺ observations) sur la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana; l'espèce y est nicheuse.

Le 11/06, 2 observations à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*)

Le 6/06, quelques observations dans le quart nord-ouest du Sugla Golü; plus au large, présence probable d'une colonie de reproduction, sur "îlot" végétal (en compagnie de l'espèce précédente).

Le 7/06, 3 individus (adultes en PN) au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 10/06, 7 individus (adultes en PN) sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Ganga unibande (*Pterocles orientalis*)

Le 7/06, un membre du groupe observe un vol possible de cette espèce au barrage d'Akkaya/Nigde.

Pigeon biset (*Columba livia*)

En dehors des oiseaux domestiques nombreux dans toutes les localités...

Le 8/06, un couple nicheur probablement sauvage cantonné à l'entrée d'un canyon, au-dessus de Demirkazik (et sans doute beaucoup d'autres oiseaux sauvages au moins dans ce secteur !).

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)

Le 6/06, 3 contacts (dont un chanteur) dans la campagne autour d'Akseki.

Le 9/06, 2 observations sur les contreforts de la chaîne d'Aladag, au-dessus de Çukurbag.

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)

Espèce observée quotidiennement pendant tout notre séjour.

Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)

Le 9/06, l'espèce est observée dans les villages à travers les Marais d'Adana; elle est même commune dans la banlieue d'Adana.

Le 10/06, l'espèce est présente à Silifke et à Taşucu, poursuivant ainsi son expansion vers l'ouest !

Coucou geai (*Clamator glandarius*)

Le 6/06, une observation dans la campagne autour d'Akseki.

Coucou gris (*Cuculus canorus*)

Le 6/06, un chanteur contacté dans la campagne autour d'Akseki.

Le 9/06, un chanteur contacté sur les contreforts de la chaîne d'Aladag, au-dessus de Çukurbag.

Petit-duc scops (*Otus scops*)

Le 7/06, un chanteur contacté en soirée à Çukurbag.

Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)

Le 6/06, une observation dans une zone industrielle située en périphérie de Karaman.

Le 7/06, 2 observations à Adabag; 2 observations à Tatlikuyu (un oiseau se tient sur une ligne aérienne); une observation au niveau du Kolsuz Geçidi (à 1490 m. d'altitude).

Le 11/06, une observation dans le delta du Göksü (dans un bâtiment à l'abandon), et une observation à Daylan (l'oiseau se tient dans un eucalyptus), à l'embouchure du Göksü/Silifke; 2 observations à Demircili; une observation sur le site antique d'Uzuncaburç.

Chouette hulotte (*Strix aluco*)

Le 6/06, un chanteur au lever du jour dans la localité d'Akseki.

Martinet à ventre blanc (*Tachymarptis melba*)

Le 7/06, 2 observations sur les contreforts au-dessus de Çukurbag.

Le 8/06, 3 observations sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik.

Martinet noir (*Apus apus*)

Espèce observée quotidiennement pendant tout notre séjour (principalement au-dessus des localités, où elle est parfois abondante).

Le 6/06, plusieurs centaines d'individus se rassemblent en soirée au-dessus du Sugla Golü.

Le 8/06, quelques individus sont observés dans un canyon situé au-dessus de Demirkazik (à environ 2000 m. d'altitude) ; l'espèce y est manifestement nicheuse... en milieu naturel !

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)

Le 5/06, quelques observations pendant le trajet Antalya/Side : ceci constitue le seul contact avec cette espèce pendant tout notre périple !

Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*)

Le 6/06, 2 couples nicheurs sont découverts dans une carrière, dans la campagne d'Akseki (à plusieurs reprises, des oiseaux s'introduisent dans des cavités situées dans la partie sommitale de la carrière); une observation à proximité de Karaman.

Le 7/06, 2 observations à Adabag.

Le 9/06, 2 observations au sud du barrage de Çatalan/Adana.

Huppe fasciée (*Upupa epops*)

Le 6/06, un chanteur contacté dans la campagne autour d'Akseki; une observation à proximité de Bozkir; 4 observations pendant le trajet Bozkir/Karaman.

Le 7/06, 3 contacts (dont un chanteur) à Adabag; 3 observations à Tatlikuyu; une observation au barrage d'Akkaya/Nigde; un chanteur dans la ripisylve à Çukurbag.

Le 9/06, un chanteur contacté sur les contreforts de la chaîne d'Aladag, au-dessus de Çukurbag.

Le 11/06, une observation sur le site antique d'Olha.

Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)

Le 7/06, une femelle observée Çukurbag; le bec chargé de nourriture, elle s'introduit dans un trou creusé dans le tronc d'un arbre fruitier (à une hauteur d'environ 2 mètres).

Le 11/06, une femelle est observée sur le site antique d'Olha.

Pic syriaque (*Dendrocopos syriacus*)

Le 6/06, 2 individus (un couple ?) sont observés dans un hameau, sur les contreforts autour d'Akseki.

Le 7/06, très belle observation d'un mâle dans un verger, à Çamardi; un mâle observé dans un verger à Çukurbag.

Pic vert (*Picus viridis*)

Le 6/06, un contact dans la localité d'Akseki.

Alouette calandre (*Melanocorypha calandra*)

Le 6/06, une trentaine d'observations pendant la traversée d'une grande plaine, entre Bozkir et Karaman; les oiseaux se tiennent parfois sur la route !

Le 7/06, une observation à Adabag; 10⁺ individus (surtout des chanteurs) sont contactés au niveau du Kolsuz Geçidi (à 1490 m. d'altitude); une demi-dizaine d'observations au barrage d'Akkaya.

Le 11/06, un couple nourrit, sur une zone cultivée dans le delta du Göksü/Silifke.

Alouette monticole (*Melanocorypha bimaçulata*)

Remarque : cette espèce occupe un milieu analogue à celui de la précédente, mais elle a été rencontrée à des altitudes plus élevées (au-dessus de 1500 m.).

Le 7/06, une demi-dizaine d'observations pendant le trajet Nigde/Demirkazik; les oiseaux sont peu farouches, et les critères d'identification faciles à enregistrer !

Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*)

Le 6/06, commune (avec des groupes familiaux) autour du Sugla Golü.

Le 9/06, une observation sur les contreforts de la chaîne d'Aladag, au-dessus de Çukurbag (à près de 2000 m. d'altitude).

Les 10-11/06, communément observées (y compris des jeunes) sur les secteurs salés (à salicornes...) entre Akgöl et la mer, et sur les zones cultivées dans le delta du Göksü/Silifke.

Alouette piskolette (*Calandrella rufescens*)

Remarque : en Turquie, on rencontre la sous-espèce *aharonii* (oiseaux de grande taille, à gros bec, à poitrine plus finement striée et au plumage plus gris que les oiseaux d'Espagne).

Le 7/06, communément observée autour des localités d'Adabag et de Tatlikuyu; nombreux chanteurs et oiseaux qui parquent (et une belle occasion nous est offerte pour enregistrer les cris typiques de l'espèce); commune au barrage d'Akkaya/Nigde.

Alouette haussecol (*Eremophila alpestris*)

Remarque : en Turquie, on rencontre la sous-espèce *penicillata* (oiseaux beaucoup plus pâles et gris que chez les races d'Europe du Nord).

Le 7/06, une demi-dizaine d'observations pendant le trajet Nigde/Demirkazik, dont 3 individus sur un champ fraîchement labouré; une observation sur les contreforts au-dessus de Çukurbag.

Le 8/06, communément observée (densité remarquable !) sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik, jusque sous la crête sommitale à plus de 3200 m. d'altitude. Observation d'un juvénile.

Cochevis huppé (*Galerida cristata*)

Le 5/06, communément observé autour de l'aéroport d'Antalya.

Le 6/06, communément observé à Akseki; présent autour du Sugla Golü.

Le 7/06, présent au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 9/06, présent autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana; des observations à travers les Marais d'Adana.

Le 10/06, présent dans le delta du Göksü/Silifke.

Le 11/06, observé à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Alouette des champs (*Alauda arvensis*)

Le 6/06, communément contactée sur la grande plaine que nous traversons, entre Bozkir et Karaman.

Le 7/06, présente autour d'Eregli (Adabag...); quelques chanteurs au barrage d'Akkaya/Nigde.

Alouette lulu (*Lullula arborea*)

Le 6/06, 2 contacts (dont un chanteur) sur les contreforts autour d'Akseki.

Le 8/06, un chanteur sur les contreforts au-dessus de Demirkazik (à environ 2000 m. d'altitude).

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)

Le 7/06, une observation au niveau du Kolsuz Geçidi (à 1490 m. d'altitude).

Le 9/06, quelques observations autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana; plusieurs dizaines d'individus présents au-dessus de la lagune de Tuzla Golü/marais d'Adana.

Le 10/06, une colonie active (avec une cinquantaine de terriers creusés dans une digue) dans la partie orientale de la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Le 11/06, une colonie avec plusieurs centaines de terriers creusés dans une digue (~ 400), mais quasi-désertée (seulement quelques individus présents) à Dalyan, embouchure du Göksü/Silifke.

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)

Espèce observée quotidiennement pendant tout notre séjour.

Hirondelle de rochers (*Pyonoprogne rupestris*)

Le 6/06, 2 observations pendant le trajet Akseki/Seydisehir.

Le 8/06, une dizaine d'observations à plus de 3000 m. d'altitude, sous la crête sommitale de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik; quelques oiseaux (probablement nicheurs) présents dans un canyon au-dessus de Demirkazik.

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)

Le 5/06, trouvée nicheuse à l'aéroport d'Antalya.

Le 8/06, une demi-dizaine d'observations sous la crête sommitale de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik (à environ 3000 m. d'altitude).

Le 9/06, quelques observations autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana.

Le 10/06, trouvée nicheuse à Taşucu, présente dans le delta du Göksü/Silifke.

Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica*)

Le 5/06, quelques observations pendant le trajet Antalya/Side.

Le 9/06, 4 observations (2 couples) autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana; un couple le long de la rivière Seyhan/Marais d'Adana.

Le 11/06, une observation à Silifke; un couple nicheur dans une falaise, sur le site antique d'Olha; un nid inoccupé au sommet d'une tour, sur le site antique d'Uzuncaburç.

Pipit rousseline (*Anthus campestris*)

Le 8/06, un chanteur contacté sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik.

Le 9/06, une observation autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana.

Bergeronnette des Balkans (*Motacilla feldegg*)

Remarque : souvent considérée comme une sous-espèce de la Bergeronnette printanière (*M. flava*).

Le 6/06, communément observée autour du Sugla Gölü.

Le 7/06, quelques observations au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 9/06, quelques observations à travers les marais d'Adana; sur le Tuzla Gölü, des adultes nourrissent.

Le 10/06, communément observée sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Le 11/06, commune à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Bergeronnette citrine (*Motacilla citreola*)

Remarque : chez les mâles, la tête est jaune citron et le collier nuchal noir est bien marqué, ce qui correspond mieux à la description d'un oiseau appartenant à la sous-espèce *citreola*, qu'à *werae*, pourtant plus prévisible dans ce pays !

La bonne surprise de ce voyage !

Le 9/06, un mâle est découvert dans un secteur de sansouïres partiellement inondé, dans la partie ouest de la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana. L'oiseau a le bec chargé de proies, ce qui constitue un signe probable de reproduction sur ce site (nourrissage de jeunes).

Le 10/06, découverte d'un couple dans une zone de sansouïres, dans la partie sud de la zone humide d'Akgöl/Silifke. Ce couple, manifestement cantonné, alarme pendant toute la durée de notre stationnement : une nouvelle donnée d'une probable reproduction s'ajoute donc à la précédente !

Le 11/06, la femelle du couple découvert la veille est de nouveau observée exactement au même endroit.



Zone humide de Silifke

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)

Le 6/06, une observation dans la campagne autour d'Akseki; quelques observations autour du Sugla Golü.

Le 7/06, quelques observations au barrage d'Akkaya/Nigde.

Le 9/06, une observation au sud du barrage de Çatalan, et une seconde au barrage de Seyhan/Adana.

Bulbul d'Arabie (*Pycnonotus xanthopygos*)

Le 5/06, quelques observations pendant le trajet Antalya/Side.

Le 9/06, communément observé dans les villages à travers les Marais d'Adana.


Le 10/06, présent à Taşucu; des observations dans le delta du Göksü/Silifke.

Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)

Le 8/06, un chanteur à l'entrée d'un canyon situé au-dessus de Demirkazik.

Accenteur de Radde (*Prunella ocularis*)

Le 8/06, très belle observation dans un pierrier, à environ 3000 m. d'altitude, dans la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik. L'oiseau cherche sa nourriture à la base d'un gros bloc rocheux.



Grive draine (*Turdus viscivorus*)

Le 6/06, une probable traverse la route pendant le trajet Bozkir/Karaman.

Merle noir (*Turdus merula*)

Le 6/06, quelques observations et chanteurs entendus à Akseki, notamment dans une cédraie; une observation pendant le trajet Bozkir/Karaman.

Le 7/06, un chanteur contacté dans une ripisylve, pendant le trajet Nigde/Demirkazik; présent à Çukurbag (ripisylve).

Le 11/06, des observations sur les sites antiques d'Uzuncaburç et d'Olha.

Merle à plastron (*Turdus torquatus*)

Le 8/06, 2 individus (un couple ?) sont observés sous les crêtes sommitales de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik (à environ 3500 m. d'altitude).

Monticole de roche (*Monticola saxatilis*)

Le 8/06, 2 mâles (dont l'un avec le bec chargé de proies) sont observés sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik (2500-3000 m. d'altitude).

Monticole bleu (*Monticola solitarius*)

Le 6/06, 2 observations (un mâle et une femelle) sur les contreforts autour d'Akseki; 2 observations au niveau d'un col (altitude 1825 m.) entre Akseki et Seydisehir.

Iranie à gorge blanche (*Irania gutturalis*)

Le 7/06, une unique mais belle observation d'un mâle à l'occasion d'un arrêt à un col (situé à plus de 1500 m. d'altitude), pendant le trajet Nigde/Demirkazik ; l'oiseau transporte des proies dans le bec, sans doute destinées à une nichée proche.

Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)

Le 7/06, 2 chanteurs contactés à Çukurbag.

Agrobate roux (*Erythropygia galactotes*)

Remarque : en Turquie, on rencontre la sous-espèce *syriacus* (plus terne que les oiseaux de la sous-espèce nominale).

Le 9/06, 2 individus sont observés autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana; ce couple nicheur probable est découvert sur la pente aride d'une digue.

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)

Remarque : en Turquie, on rencontre la sous-espèce nominale (sans miroir alaire blanc).

Le 6/06, un chanteur dans la localité d'Akseki (à 5h00 du matin).

Le 8/06, 3 observations (dont celle d'un chanteur) sous la crête sommitale de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik, à 3000⁺ m. d'altitude; un couple probablement nicheur (alarme) dans un canyon au-dessus de Demirkazik.

Le 9/06, 2 observations sur les contreforts au-dessus de Çukurbag.

Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*)

Le 8/06, un couple est observé sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik, à environ 2500 m. d'altitude.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)

Le 6/06, un couple nicheur (qui nourrit) est découvert dans une carrière, dans la campagne autour d'Akseki; quelques observations (dont des chanteurs) au niveau d'un col (altitude 1825 m.) entre Akseki et Seydisehir; une observation autour du Sugla Golü.

Le 7/06, quelques observations (dont des jeunes) à Adabag; très communs à Tatlikuyu et aux alentours (Akgöl); quelques observations au barrage d'Akkaya/Nigde; quelques observations pendant le trajet Nigde/Demirkazik.

Le 8/06, communément observé sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik, jusqu'à plus de 3000 m. d'altitude.

Traquet de Finsch (*Oenanthe finschii*)

Le 8/06, un superbe mâle est (enfin !) découvert sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik. Voilà une espèce sur laquelle nous avons pas mal fantasmé pendant notre périple...

Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*)

Remarque : en Turquie, on rencontre la sous-espèce *melanoleuca*.

Le 5/06, un premier mâle est observé dès notre arrivée à Akseki.

Le 6/06, communément observé à travers la campagne autour d'Akseki; principalement des mâles (principalement à gorge noire), mais aussi quelques femelles et des jeunes.

Le 7/06, quelques observations pendant le trajet Nigde/Demirkazik.

Le 11/06, une demi-dizaine d'observations sur le site antique d'Uzuncaburç (dont un juvénile), et 3 mâles sur celui d'Olha.

En résumé, une espèce commune à moyenne altitude (1000-1500 m.), remplacée plus haut par les Traquets isabelle et motteux.

Traquet isabelle (*Oenanthe isabellina*)

Le 7/06, très belle observation d'un mâle (où tous les critères d'identification ont bien été notés) au barrage d'Akkaya/Nigde; sans doute plus d'oiseaux présents...

Le 8/06, plus d'une dizaine d'observations sur des pelouses rases (qui semblent constituer l'habitat privilégié de cette espèce), sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik, entre 1500 et 2000 m. d'altitude; parmi celles-ci, un adulte qui nourrit un jeune, et un second chassant un souslik de son territoire en lui grim pant sur le dos !

Le 9/06, quelques observations sur les contreforts au-dessus de Çukurbag.

Roitelet huppé (*Regulus regulus*)

Le 6/06, quelques contacts dans une cédraie, sur les contreforts autour d'Akseki.

Prinia gracile (*Prinia gracilis*)

Le 9/06, quelques observations et des contacts (oiseaux qui chantent et alarment) dans les roselières autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana; une dizaine d'observations/contacts autour de la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana.

Le 10/06, communément contactée sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Le 11/06, contactée sur les berges du Göksü/Silifke.

Locustelle lusciniöide (*Locustella luscinioides*)

Le 10/06, un chanteur est contacté sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)

Remarque : en Turquie, on rencontre la sous-espèce *fuscus* (nettement plus grise que la sous-espèce nominale; certains auteurs en font même une espèce à part entière).

Le 9/06, quelques chanteurs contactés autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana; quelques chanteurs présents dans les roselières autour de la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana (dont certains très bien observés).

Le 10/06, communément contactée sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Le 11/06, communément contactée sur les berges du Göksü/Silifke.

Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)

Le 6/06, plusieurs dizaines de chanteurs sont contactés autour du Sugla Golü (dans la seule petite partie nord-ouest que nous parcourons).

Le 9/06, 3 contacts (dont 2 chanteurs) au sud du barrage de Çatalan/Adana; 2 contacts autour de la lagune de Tuzla Gölü/marais d'Adana.

Le 10/06, quelques contacts sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Le 11/06, un chanteur à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Hypolaïs pâle (*Hippolais pallida*)

Le 6/06, quelques contacts (principalement des chanteurs) dans la campagne autour d'Akseki.

Le 7/06, une observation pendant le trajet Nigde/Demirkazik (l'espèce niche dans un buisson, à la hauteur d'un col); 3 chanteurs notés dans une ripisylve à Çukurbag (l'un d'eux finit par se percher sur une ligne aérienne, et se laisse longuement observer, ce qui nous permet de noter tous les critères d'identification, notamment le mouvement de la queue vers le bas !).

Le 9/06, une observation autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana.

Le 10/06, une observation sur la zone humide l'Akgöl/Silifke.

Pouillot oriental (*Phylloscopus orientalis*)

Le 6/06, au moins 3 individus sont très bien observés dans une cédraie, sur les contreforts autour d'Akseki. Si le chant de cette espèce est analogue à celui du Pouillot de Bonelli (*P. bonelli*), le cri est quant à lui très différent !



Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)

Remarque : les oiseaux rencontrés pendant le voyage semblent tous appartenir à la sous-espèce nominale.

Le 5/06, 2 individus observés dans une haie à Akseki.

Le 6/06, communément observée et entendue à travers la campagne autour d'Akseki.

Le 7/06, une observation pendant le trajet Nigde/Demirkazik (l'espèce niche dans un buisson, à la hauteur d'un col); 2 contacts (dont un chanteur) à Çukurbag.

Le 8/06, l'espèce est observée jusqu'à environ 2500 m. d'altitude, sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik.

Fauvette orphéane (*Sylvia crassirostris*)

Remarque : souvent considérée comme la sous-espèce orientale de la Fauvette orphée (*S. hortensis*).

Le 6/06, 4 contacts (dont deux belles observations, parmi lesquelles celle d'un chanteur) dans la campagne autour d'Akseki.

Fauvette grisette (*Sylvia communis*)

Le 7/06, 2 observations et un chanteur contacté à Çukurbag.

Le 10/06, une observation sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Fauvette de Rüppell (*Sylvia rueppelli*)

Le 6/06, une demi-dizaine de très belles observations (des mâles chanteurs) dans la zone de garrigue, sur les premiers contreforts autour d'Akseki. Les oiseaux sont faciles à voir (au moins en cette période de l'année !), et l'espèce est manifestement commune dans ce milieu de maquis méditerranéen !

Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*)

Le 10/06, un groupe d'une demi-dizaine d'individus est observé sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Mésange lugubre (*Poecile lugubris*)

Le 6/06, une demi-douzaine d'observations (dont celles de chanteurs) dans la campagne autour d'Akseki.

Le 11/06, 2 observations sur le site antique d'Olha.

Mésange noire (*Periparus ater*)

Le 6/06, des contacts (dont quelques observations) dans une cédraie, sur les contreforts autour d'Akseki.

Mésange charbonnière (*Parus major*)

Le 6/06, une observation sur les contreforts autour d'Akseki.

Le 7/06, un chanteur contacté dans une ripisylve pendant le trajet Nigde/Demirkazik; 2 observations à Çukurbag.

Le 9/06, un groupe familial observé au sud du barrage de Çatalan/Adana.

Le 11/06, quelques observations (dont des jeunes) sur le site antique d'Olha.

Mésange bleue (*Cyanistes caeruleus*)

Le 6/06, quelques contacts dans une cédraie, sur les contreforts autour d'Akseki.

Le 11/06, une observation (l'oiseau s'introduit dans un poteau téléphonique creux....) à Uzuncaburç.

Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)

Remarque : en Turquie, on rencontre la sous-espèce *tephronotus* (oiseaux plus foncés que les oiseaux européens).

Le 11/06, 2 individus sont observés sur le site antique d'Olha.

Sittelle de Krüper (*Sitta krueperi*)

Le 6/06, une demi-douzaine d'observations dans une cédraie, sur les contreforts autour d'Akseki, où l'espèce est manifestement commune. Un couple niche dans le trou d'un amandier, à la périphérie de la cédraie (des nourrissages sont notés). De très belles observations; cris très distinctifs.

Sittelle de Neumayer (*Sitta neumayer*)

Le 6/06, une observation, et surtout des oiseaux entendus (qui alarment), sur les contreforts autour d'Akseki.

Le 11/06, une dizaine d'observations au total sur les sites antiques d'Uzuncaburç et d'Olha (où l'espèce est nicheuse : couples qui alarment; nourrissages).

Remarque : l'espèce est manifestement plus facile à contacter (plus commune aussi ?) dans des milieux anthropiques (sites antiques par exemple) que naturels !

Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)

Le 8/06, 1-2 individus sont observés sous la crête sommitale de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik (à environ 3500 m. d'altitude).

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)

Le 7/06, un chanteur contacté et une femelle observée à Çukurbag.

Le 9/06, un chanteur contacté au sud du barrage de Çatalan/Adana.

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)

Le 6/06, un couple est observé dans la campagne autour d'Akseki.

Le 7/06, un mâle observé pendant le trajet Nigde/Demirkazik; une femelle observée à Çukurbag.

Le 8/06, 7 observations (uniquement des mâles !) sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik (l'espèce monte jusqu'à environ 2500 m. d'altitude).

Le 9/06, quelques observations autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana.

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)

Le 6/06, un mâle posé sur un buisson, à Akseki.

Le 11/06, un mâle posé sur la clôture d'une usine désaffectée, entre Taşucu et Silifke.

Pie-grièche masquée (*Lanius nubicus*)

Le 5/06, une observation près de l'aéroport d'Antalya.

Le 6/06, 6 observations à travers la campagne autour d'Akseki (des oiseaux chanteurs).

Le 9/06, une observation dans les environs de Çamardı.

Le 11/06, une observation sur le site antique de Olha.

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)

Remarque : en Turquie, on rencontre la sous-espèce *atricapillus* (à calotte noire).

Le 5/06, une observation dans une pinède, près de Side.

Le 6/06, quelques observations à Akseki; une observation pendant le trajet Bozkir/Karaman.

Le 7/06, une observation pendant le trajet Nigde/Demirkazik (dans une ripisylve).

Le 11/06, 2 observations sur le site antique d'Uzuncaburç, et une observation sur celui d'Olha.

Pie bavarde (*Pica pica*)

Le 6/06, le premier oiseau est observé à proximité de Seydisehir; ensuite, l'espèce est régulièrement notée pendant le trajet Seydisehir/Eregli.

Le 7/06, des observations à Adabag, Nigde et Çukurbag.

Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)

Le 8/06, communément observé (souvent en couples) sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik, et jusque sur les crêtes sommitales (à plus de 3500 m. d'altitude). Quelques individus (nicheurs probables) sont présents dans un canyon situé au-dessus de Demirkazik.

Le 9/06, une observation sur les contreforts au-dessus de Çukurbag.

Chocard à bec jaune (*Pyrrhocorax graculus*)

Le 8/06, 2 individus (un couple qui parade) sont observés sous la crête sommitale de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik (à environ 3500 m. d'altitude).

Choucas des tours (*Corvus monedula*)

Le 7/06, quelques dizaines d'individus sont observés dans les localités d'Adabag et de Tatlikuyu. Des individus présentent sur les côtés du cou le croissant blanc typique de la sous-espèce *soemmerringii*; quelques observations pendant le trajet Eregli/Nigde.

Corneille mantelée (*Corvus cornix*)

Espèce observée quotidiennement pendant tout notre séjour.

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

Espèce observée quotidiennement pendant tout notre séjour.

Moineau domestique (*Passer domesticus*)

Espèce observée quotidiennement pendant tout notre séjour.

Chez les mâles, la bavette m'a semblé s'étendre davantage sur la poitrine que chez nos oiseaux (sous-espèce *biblicus* ?).

Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)

Le 5/06, communément observé autour de l'aéroport d'Antalya.

Le 6/06, quelques observations en plaines pendant le trajet Bozkir/Karaman.

Le 7/06, niche dans des nids de cigognes à Tatlikuyu; quelques observations pendant le trajet Nigde/Demirkazik; un individu s'introduit dans le trou d'un muret à Çukurbag.

Le 9/06, niche dans des nids de cigognes, autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana; quelques observations dans les marais d'Adana.

Moineau friquet (*Passer montanus*)

Le 7/06, quelques observations à Çukurbag; parmi celles-ci, un oiseau qui s'introduit dans un trou creusé dans le tronc d'un arbre fruitier.

Moineau soulcie (*Petronia petronia*)

Le 7/06, communément observé à Adabag, où certains mâles chanteurs exhibent leur caractéristique tache gulaire jaune; un mâle observé pendant le trajet Nigde/Demirkazik.

Le 8/06, quelques observations (dont celle d'un groupe familial) sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik, jusqu'à environ 2500 m. d'altitude; un oiseau nourrit, à l'entrée d'un canyon situé au-dessus de Demirkazik.



Niverolle alpine (*Montifringilla nivalis*)

Le 6/06, 2 individus sont observés au niveau d'un col (altitude 1825 m.) entre Akseki et Seydisehir.

Le 8/06, très communément observée sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik, jusqu'à plus de 3000 m. d'altitude; un groupe familial (avec 2 jeunes) à l'entrée d'un canyon situé au-dessus de Demirkazik (à moins de 2000 m. d'altitude, et loin sous la limite des neiges !).

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

Le 5/06, quelques observations et chanteurs entendus à Akseki (et de nouveau des contacts le lendemain, dans la même pinède/cimetière).

Le 7/06, quelques observations dans une ripisylve à Çukurbag.

Serin à front rouge (*Serinus pusillus*)

L'espèce mythique par excellence de ce voyage !

Le 6/06, 3 individus (2 mâles + une femelle) sont observés au niveau d'un col (altitude 1825 m.) entre Akseki et Seydisehir; à noter que sur ce site, cette espèce côtoie la suivante.

Le 8/06, une demi-douzaine d'observations (dont un mâle chanteur) sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik, entre 2500 et 3000 m. d'altitude.

Le 9/06, un couple observé sur les contreforts au-dessus de Çukurbag.

Serin cini (*Serinus serinus*)

Le 6/06, quelques observations dans la campagne autour d'Akseki; 2 individus observés au niveau d'un col (altitude 1825 m.) entre Akseki et Seydisehir.

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)

Le 5/06, un chanteur près de l'aéroport d'Antalya.

Le 6/06, un chanteur autour du Sugla Golü.

Le 9/06, présent sur les contreforts de la chaîne d'Aladag, à Çukurbag.

Le 10/06, présent dans le delta du Göksü/Silifke.

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)

Le 6/06, quelques observations à Akseki.

Le 7/06, 3 observations dans une ripisylve à Çukurbag.

Le 9/06, quelques observations sur les contreforts de la chaîne d'Aladag, au-dessus de Çukurbag.

Le 10/06, quelques observations dans le delta du Göksü/Silifke.


Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)

Le 6/06, quelques observations (dont des jeunes) dans la campagne autour d'Akseki.

Le 7/06, quelques observations pendant le trajet Nigde/Demirkazik.

Le 8/06, quelques observations jusqu'à environ 2500 m. d'altitude sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik.

Le 11/06, 3 individus observés sur le site antique d'Olha.



Sommet de la
chaîne d'Alapag

Roselin à ailes roses

(*Rhodopechys sanguinea*)

Le 8/06, 3 observations (un couple + un mâle chanteur) sous les crêtes sommitales de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik (à environ 3200 m. d'altitude).

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)

Le 6/06, une observation probable (un chanteur) sur les contreforts autour d'Akseki; cette espèce semble se rencontrer plus haut que l'espèce suivante (au moins dans la partie visitée de la Turquie), mais toutefois une zone de sympatrie existe, comme le suggère cette observation...

Le 7/06, un chanteur contacté pendant le trajet Nigde/Demirkazik.

Le 8/06, une dizaine d'observations (principalement des chanteurs) sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik, jusqu'à plus de 2500 m. d'altitude. Le 11/06, un chanteur contacté sur le site antique d'Olha.

Bruant cendrillard (*Emberiza caesia*)

Remarque : la distinction entre le Cendrillard et l'Ortolan n'est pas franchement évidente dans cette partie de la Turquie (moyenne montagne), les chants des deux espèces étant très proches l'un de l'autre, et les subtilités du plumage n'étant vraiment appréciées que dans de très bonnes conditions d'observation !

Le 6/06, au moins 4 observations (dont un mâle chanteur très bien observé...) sur les contreforts autour d'Akseki.

Bruant mélanocéphale (*Emberiza melanocephala*)

Le 5/06, les premiers oiseaux sont observés dès notre arrivée à Akseki (mâles chanteurs).

Le 6/06, communément observé à travers la campagne autour d'Akseki; nombreux mâles chanteurs (bien visibles et peu farouches !), et seulement une poignée des plus discrètes femelles. Présent autour du Sugla Golü.

Le 7/06, quelques chanteurs contactés pendant le trajet Nigde/Demirkazik; un chanteur à Çukurbag.

Le 8/06, des oiseaux observés jusqu'à environ 2000 m. d'altitude sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik.

Le 9/06, quelques observations sur les contreforts, au-dessus de Çukurbag; présent autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana.

Le 11/06, des observations sur les sites antiques d'Uzuncaburç et d'Olha.

En résumé, une très belle espèce commune et facile à observer partout, sauf sur la frange côtière !

Bruant proyer (*Miliaria calandra*)

Le 5/06, quelques chanteurs sont contactés à Akseki.

Le 6/06, présent autour du Sugla Golü.

Le 7/06, un chanteur au barrage d'Akkaya/Nigde; un chanteur à Çukurbag.

Le 9/06, présent autour du lac de retenue du barrage de Seyhan/Adana.



Serin à Front Rouge - Red-fronted Serin
Demirkazik (Turquie - Turkey) - 13/06/2006
© Raphaël Lebrun

Quelques observations marquantes de mammifères et de reptiles

Ecureuil (de Perse ?)

Le 6/06, une observation à Akseki.

Souslik

Le 6/06, quelques individus présents au niveau d'un col (altitude 1825 m.) entre Akseki et Seydisehir.

Le 7/06, commun dans la région de Nigde, notamment au barrage d'Akkaya.

Le 8/06, commun dans le P.N. de Demirkazik.

Hérisson (oriental ?)

Le 6/06, une observation pendant le trajet Seydisehir/Bozkir.

Campagnol sp.

Le 10/06, un petit rongeur observé dans les dunes du delta du Göksü/Silifke.

Bouquetin

Le 8/06, un troupeau est observé sur les crêtes de la chaîne d'Aladag, dans le P.N. de Demirkazik.

Phoque moine

Le 10/06, 2 individus sont observés en bord de mer, dans le delta du Göksü/Silifke.

Observation exceptionnelle d'une espèce menacée d'extinction au niveau mondial !

Les sites d'observations en Turquie sont localisés dans la Sub-écorégion de la mer Egée - zones côtières de Foca, Karaburun et Cilicia.

Grand Dauphin

Le 11/06, 4 individus sont observés à l'embouchure du Göksü/Silifke.

Tortue grecque *Testudo graeca*

Le 6/06, une observation à Akseki.

Le 9/06, un individu traverse l'autoroute entre Adana et Silifke !

Le 10/06, une dizaine d'observations sur la zone humide d'Akgöl/Silifke ; 4 individus sont découverts sur 30 mètres linéaires.

Le 11/06, quelques observations le long de la route pendant le trajet Silifke/ Uzuncaburç.



Tortue verte *Chelonia mydas*


Dans le delta du Göksü/Silifke, nous avons pu observer et attraper très facilement depuis le bord de mer une tortue verte *Chelonia myda* fatiguée le 10 juin 2009. Nous l'avons relâché rapidement le long de la plage.

Nous avons observé des traces de cheminement dans le sable et de 5 lieux de pontes déposés le 10 ou 11 juin 2009 sur la plage située entre Daylan (environ 2 kilomètres) et l'embouchure du Seyhan dans le delta de Cukurova (région de Silke). Nous n'avons pas identifiée l'espèce de grande taille.



Nos observations corroborent les éléments connus selon la carte de répartition des pontes de tortues marines.

Selon le **Comité permanent de l'union** [files20f_2002.doc] « La tortue verte *Chelonia mydas* est gravement menacée en Méditerranée. Elle est protégée par l'Annexe II de la convention. Ses aires de ponte, pour autant que l'on sache, se situent uniquement dans l'extrême sud-est de la Turquie (principalement à Kazanlı et Akyatan, dans le delta de Cukurova) et à Chypre. Cette espèce a fait l'objet d'une pêche commerciale intensive et plusieurs milliers de tortues vertes ont ainsi été capturées. La plage de Kazanlı se caractérise par une exceptionnelle densité de nids. Elle est confrontée à de graves problèmes : érosion, lumières artificielles, agriculture, ordures (notamment déchets plastiques), pêche, pollution de l'eau. »



Carte de localisation (Points noirs) des pontes de tortues marines *Chelonia mydas* et *Caretta caretta* (2002) selon le **Comité permanent** [files20f_2002.doc] « CONVENTION RELATIVE À LA CONSERVATION DE LA VIE SAUVAGE ET DU MILIEU NATUREL DE L'EUROPE » 22e réunion, Strasbourg, 2-5 décembre-2002. En rouge nos observations en 2009.

Lézard sp.

Le 8/06, une espèce à ventre bleu est observée sur les contreforts de la chaîne d'Aladag/P.N. de Demirkazik.

Agame stellio (plus communément appelé margouillat)

Des observations en plusieurs sites : Akseki, Adana.

Rainette (de Savigny ?)

Le 10/06, une observation sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.

Pélobate sp.

Le 10/06, une observation sur la zone humide d'Akgöl/Silifke.



Chêne Kermes
« géant »