

# Liste commentée des oiseaux observés en Turquie (Montagnes du Nord-Est)

## - North-East Turkey Bird Checklist -

Nicolas MACAIRE & Cédric MROCZKO

Voyage naturaliste du 02 au 15 août 2009

### NOTES

#### Déplacements - Voyage

Voyage en avion : aéroport Paris Charles-de-Gaulle → Istanbul puis Istanbul → Ankara : arrivée en avion à la capitale Ankara (aéroport Ensemboga) le dimanche 2 août 2009 au soir. Prix aller/retour du **billet avion : 730,00 euros**.

Sur place, déplacements **en bus** : la Turquie est très mal desservie par les trains en raison du relief de moyenne montagne partout présent. Par contre, les liaisons en bus sont très développées. Les grandes distances sont couvertes par des bus luxueux et très confortables et pour un petit budget (TV, boissons comprises dans le prix du billet qui est très abordable).

#### Principaux points de prospection

- Ilgaz (Nord Ankara)
- Amasya
- Kelkit (nord Erzincan)
- Massif du Kaçkar – massif montagneux proche de la Géorgie depuis Rize et Cat.
- Trabzon (ville moderne et active au bord de la Mer Noire)
- Gumushane (petite ville de montagne située entre Trabzon au nord et Erzincan au sud).

#### Hôtels

Nous avons dormis dans des petits hôtels pas chers, souvent dans des petites villes non touristiques, hôtels toutefois toujours très bien tenus. Prix moyen d'une chambre à 2 lits entre 15 et 20 euros la nuit. Attention à l'eau du robinet dans les petites villes qui n'est pas forcément potable, mais nous n'avons jamais été malade !

#### Nourriture

Facile à trouver partout : on mange bien en Turquie ! (Kebab). Le thé « *Chai* » est systématiquement offert partout en guise de bienvenue et la restauration n'est pas chère (plat cuisiné entre 4 et 6 euros).

#### Prospection ornithologique

Seules des zones de moyenne montagne (partie nord-est de la Turquie) ont été prospectées. Le nombre d'espèces d'oiseaux contacté est donc limité en raison du milieu et de la saison déjà très avancée. Les zones humides prévues initialement (Lac Van) n'ont pas été prospectées faute de temps, aussi très peu d'oiseaux d'eau figurent dans cette Bird List.

#### Autres prospections

En montagne au dessus de 1800 mètres, beaucoup de plantes étaient encore fleuries. Nombreux insectes également (Lépidoptères, Odonates, Orthoptères (environ 500 taxons en Turquie))...

→ Un chacal doré écrasé sur la route aux environs de Kelkit ;

→ Tortue (Grecque) observée à Kelkit (adulte et jeune) – systématique des [Testudo] mal définie.

LEGENDE :

\* = nouvelle espèce vue

\*\* = sous-espèces

Nom français (Nom anglais)	Nom latin	Sous- espèce	Commentaire / Site d'observation
Grand Cormoran (Great Cormorant)	<i>Phalacrocorax carbo</i>		Notés en bordure de la Mer Noire à Trabzon et Rize.
Cigogne blanche (White Stork)	<i>Ciconia ciconia</i>		Notée en migration à Ilgaz
Cigogne noire (Black Stork)	<i>Ciconia nigra</i>		Notée en migration à Ilgaz
Gypaète barbu (Bearded vulture)	<i>Gypaetus barbatus</i>		Immatures notés dans le massif montagneux au dessus d'Ilgaz.
Aigle royal (Golden royal)	<i>Aquila chrysaetos</i>		2 notés (transport de proie) dans le massif montagneux au dessus d'Ilgaz)
Milan noir (Black Kite)	<i>Milvus migrans</i>		Notés en migration aux environs de Kelkit.
Buse féroce (Long legged Buzzard)	<i>Buteo rufinus</i>		Notée assez souvent dans la campagne, sur les poteaux électriques, notamment entre Sivas et Erzincan.
Faucon crécerelle (Kestrel)	<i>Falco tinnunculus</i>		Très peu noté ! A Kelkit.
Epervier d'Europe (Sparrowhawk)	<i>Accipiter nisus</i>		Belles observations d'adultes dans le massif montagneux près d'Ilgaz.
*Perdrix choukar (Chukar)	<i>Alectoris chukar</i>		1 famille avec au moins 6 pulli dans les montagnes au dessus de Gumushane.
Echasse blanche (Black-winged stilt)	<i>Himantopus himantopus</i>		Noté, un petit groupe sur la route entre Sivas et Erzincan.
Chevalier culblanc (Green Sandpiper)	<i>Tringa ochropus</i>		Noté sur la rivière traversant Kelkit.
Chevalier guignette (Common sandpiper)	<i>Actitis hypoleucos</i>		Noté sur la rivière traversant Kelkit.
Goéland brun (Lesser black-backed Gull)	<i>Larus fuscus</i>	?	Observé le long de la mer noire.
Pigeon biset (Rock Dove)	<i>Columba livia</i>		Notés dans les montagnes au dessus de Gumushane. Nicheurs dans les falaises.
Tourterelle des bois (Turtle Dove)	<i>Streptopelia turtur</i>		

Tourterelle maillée (Laughing Dove)	<i>Streptopelia senegalensis</i>		1 couple noté chanteur et très probablement reproducteur à Kelkit.
Martinet noir (Swift)	<i>Apus apus</i>		Notés en migration active à Kelkit.
Martin-pêcheur d'Europe (European Kingfisher)	<i>Alcedo atthis</i>		Noté à Kelkit reproducteur probable sur le cours d'eau traversant la ville.
Huppe fasciée (Hoopoe)	<i>Upupa epops</i>		Notée dans la campagne aux environs de Kelkit.
Guêpier d'Europe (European bee-eater)	<i>Merops apiaster</i>		Petite colonie notée près de Kelkit au niveau de la petite rivière.
Pic Syriaque (Syrian woodpecker)	<i>Picus syriacus</i>		1 immature noté à Ilgaz (unique contact)
Pic vert (Green woodpecker)	<i>Picus viridis</i>		Noté à Kelkit.
Pic épeichette (Lesser spotted woodpecker)	<i>Dendrocopos minor</i>		Noté dans les monts Kaçkar
Hirondelle de rivage (Sand Martin)	<i>Riparia riparia</i>		Notées à Kelkit
Hirondelle rustique (Barn Swallow)	<i>Hirundo rustica</i>		Notées en mig. active.
Hirondelle de fenêtre (House Martin)	<i>Delichon urbicum</i>		Notées en mig. active
Hirondelle de rochers (Eurasian Crag-Martin)	<i>Hirundo rupestris</i>		Notées à Gumushane (en ville), le long de la rivière.
Bergeronnette grise (Pied Wagtail)	<i>Motacilla alba</i>		Noté près des points d'eau en montagne.
Bergeronnette des ruisseaux (Grey Wagtail)	<i>Motacilla cinerea</i>		Bien représentée sur les cours d'eau de moyenne et haute montagne (notamment Massif du Kaçkar).
Bergeronnette printanière (Yellow Wagtail)	<i>Motacilla flava</i>		Plusieurs individus en migration active (sous-espèces indéterminées)
Cinacle plongeur (White-throated Dipper)	<i>Cinclus cinclus</i>		Très bien représenté dans le massif du Kaçkar à Cat et Rize.
Rosignol philomèle (Nightingale)	<i>Luscinia megarhynchos</i>		Noté en migration (cris de crapauds caractéristiques) à Ilgaz.
Rougequeue noir (Black Redstart)	<i>Phoenicurus ochruros</i>		Noté à Gumushane dans la montagne.

Traquet oreillard (Black-eared Wheatear)	<i>Oenanthe hispanica</i>		Noté à Gumushane (immature)
Monticole de roche (Rock Thrush)	<i>Monticola saxatilis</i>		Immatures notés dans les montagnes au dessus de Gumushane.
Merle noir (Blackbird)	<i>Turdus merula</i>		Noté dans les grandes villes : Ankara – Trabzon – Amasya.
Hypolaïs pâle (Olivaceous Warbler)	<i>Hippolais pallida</i>	** <i>elaeica</i>	Notée dans les buissons bordant la petite rivière à Kelkit. Ssp non reconnue sur le terrain.
*Fauvette orphéane (Eastern Orphean Warbler)	<i>Sylvia (hortensis) crassirostris</i>		Plusieurs immatures et adultes notées dans les montagnes au dessus de Gumushane.
Fauvette à tête noire (Blackcap)	<i>Sylvia atricapilla</i>		Plusieurs notées dans les jardins des grandes villes.
Fauvette grisette (Common Whitethroat)	<i>Sylvia communis</i>		Notée dans le massif du Kaçkar, surtout des jeunes.
*Pouillot du Caucase (Caucasian green Warbler)	<i>Phylloscopus (trochiloides) nitidus</i>		3 individus notés dans le massif du Kaçkar en partant de Rize, dans les forêts primaires de conifères.
*Pouillot de Lorenz (Caucasian Chiffchaff)	<i>Phylloscopus (sindianus) lorenzii</i>		1 individu noté dans le massif du Kaçkar en partant de Rize, dans les forêts primaires de conifères.
Mésange charbonnière (Great Tit)	<i>Parus major</i>		Notée dans le massif du Kaçkar (immatures).
Mésange noire (Coal Tit)	<i>Parus ater</i>		Notée chanteuse dans le Massif du Kaçkar au dessus de Rize – Cat.
*Sittelle de Neumayer (Western rock Nuthatch)	<i>Sitta neumayer</i>		1 nid fixé dans les rochers à Amasya. Plusieurs adultes observés dans les montagnes de Gumushane.
Loriot d'Europe (Golden oriole)	<i>Oriolus oriolus</i>		Plusieurs notés (groupes migration postnuptiale dans les arbres) à Ilgaz.
Pie-grièche à poitrine rose (Lesser grey-shrike)	<i>Lanius minor</i>		Adultes notés dans la campagne environnante de Kelkit.
Pie-grièche écorcheur (Red-backed Shrike)	<i>Lanius collurio</i>		Notée de façon éparse (fin de saison) – des adultes surtout, près de Kelkit.
Etourneau sansonnet (Starling)	<i>Sturnus vulgaris</i>		Présent partout – pas de jeunes étourneau roselin trouvés dans les groupes.
*Geai des chênes (Jay)	<i>Garrulus glandarius</i>	** <i>atricapillus</i>	Sous-espèce du Moyen-Orient, bien notée dans le massif du Kaçkar. Tête foncée joues sales et calotte noire.
Grand Corbeau (Raven)	<i>Corvus corax</i>		2 individus notés en vol dans les montagnes d'Ilgaz.

Corneille mantelée (Hooded Crow)	<i>Corvus cornix</i>		Bien représentée un peu partout, mais jamais en grand nombre. Des individus isolés surtout.
Choucas des tours (Jackdaw)	<i>Corvus monedula</i>		Notés dans les villes et aux alentours.
Pie bavarde (Magpie)	<i>Pica pica</i>		Notée de façon éparse.
Moineau domestique (House Sparrow)	<i>Passer domesticus</i>		Commun partout.
Moineau friquet (Tree sparrow)	<i>Passer montanus</i>		
Moineau soulcie (Rock sparrow)	<i>Petronia petronia</i>		Plusieurs notés en groupes autour de Kelkit dans la campagne cultivée.
Pinson des arbres (Chaffinch)	<i>Fringilla coelebs</i>		Noté près de l'eau en ville.
*Serin à front rouge (Red-fronted Serin)	<i>Serinus pusillus</i>		Plusieurs adultes (5) notés dans les montagnes au dessus de Gumushane.
Verdier d'Europe (Greenfinch)	<i>Carduelis chloris</i>		
Chardonneret élégant (Goldfinch)	<i>Carduelis carduelis</i>		Notés en montagne.
Linotte mélodieuse (Linnet)	<i>Carduelis cannabina</i>		
Bec-croisé des sapins (Crossbill)	<i>Loxia curvirostra</i>		Femelle et immature notés dans les montagnes au dessus d'Ilgaz.
*Roselin cramoisi (Scarlet Finch)	<i>Carpodacus erythrinus</i>		Un couple noté chanteur près de Kelkit au niveau de la rivière.
Bruant ortolan (Ortolan bunting)	<i>Emberiza hortulana</i>		Plusieurs familles notées en montagne au dessus de Gumushane.