



## **Ecosse du 27 mai au 2 Juin 2016**


Côte Nord et Est des Highlands et  
Cairngorns



Bernard Iliou et Antoine Gergaud

Page 1 sur 24

Carte du parcours :



### Parcours (environ 1400 km) :

Arrivée à Edimbourg le 26 vers 23h45. Le temps de récupérer la voiture et nous partons vers 1 heure du matin.

27/05 : Départ d'Edimbourg pour Tarbet (390 km) où nous prenons le bateau à 9 heures pour l'île de Handa. Puis route pour la pointe nord à Durness (40 km). Nuit sur le parking du Golf de Durness, juste après le cimetière.

28/05 : Route pour Bettyhill en faisant une incursion dans les terres (148 km). Nuit à Bettyhill.

29/05 : Départ pour Dunnet Head par la route côtière (70 km). Puis passage à Dunscanby Head (26 km) où nous passons la nuit.

30/05 : Départ de la côte nord jusqu'à un arrêt à Little Ferry (118 km) puis en route pour Aviemore dans les Cairngorns (132 km). Nous passons la nuit à l'auberge de jeunesse à Aviemore.

31/05 : Passage au mont Cairngorm depuis le départ du téléphérique. Puis route vers Troup Head (129 km) où nous passons la nuit.

01/06 : Passage par les deux ports de pêche de Fraserburgh et Peter Head puis descente vers Stonehaven (141 km) où nous passons la nuit.

02/06 : Descente le long de la côte vers Anstruther (114 km) puis retour à Edimbourg (73 km) où nous prenons l'avion en fin d'après-midi.

### Budget pour deux :

Avion : 280 € entre Bordeaux et Edimbourg.

Voiture : 367 € chez Europcar, sans doute pas le meilleur plan.

Essence : 147 €

Nourriture : 102 € dont la moitié sur 2 repas Fish and ships, qui peuvent se révéler parfois très cher, avec notre anglais limité, nous découvrons par exemple une facture de 36 € pour nous deux à Aviemore. Le reste du temps, c'est pain de mie, charcuterie, fromage et un peu de confiture le matin.

Hébergement : 45 € pour 2 à Aviemore, en tente le reste du temps.

Bateau pour l'île de Handa : 32 €.

Café : 24 €, un café tous les matins dans les hôtels ou les cafés.


Bière : 102 €, compter environ 8,40 € pour deux pintes. Ça fait du bien après une journée de terrain.

Total : 1100 € mais nous aurions certainement pu faire des économies en bière et surtout sur la location de voiture.

Météo : Globalement très beau temps sur l'ensemble de la semaine. 2 jours un peu moyens avec la fameuse brume écossaise. Température max : 22°C, minimale 6°C. Le soleil se lève vers 4 heures du matin et se couche vers 23 heures.

## Bilan des observations par jour :

27/05 :



Après avoir traversé les Cairngorms dans la pénombre, et avoir passé Inverness, nous traversons les Highlands d'Est en Ouest pour nous rendre à Tarbet. Nous observons rapidement nos premières **Cornelles mantelées**. Vers 4 heures du matin, alors qu'il commence à faire jour,

nous faisons un premier arrêt entre Ardgay et Bonar Bridge où nous pouvons observer environ **10 Harles bièvres, 2 Oies cendrées, 2 Bernaches du Canada, 4 Canards siffleurs et quelques Tadornes de Belon**. Quelques kilomètres plus loin, nous observons 4 autres **Canards siffleurs, 2 Harles huppés, un Phragmite des joncs et une Locustelle tachetée**.

Ensuite en longeant le Loch Shin, nous observons **2 Plongeurs arctiques**, puis un **Plongeon catmarin** sur un minuscule loch et quelques kilomètres plus loin un **Cygne chanteur**. Nous observons alors un petit groupe de Cerfs au bord de la route. Le paysage est magnifique mais la densité d'oiseaux est globalement très faible.

Nous arrivons vers 8 heures du matin à Tarbet où nous prenons nos billets pour l'île de Handa. Depuis l'embarcadère, nous observons quelques **Eiders à duvet, 3 Plongeurs catmarins, un Guillemot à miroir et quelques Sternes pierregarin**. Nous passons à côté du Guillemot à miroir en nous rendant du l'île.



Figure 1 : Grand labbe sur Handa

En débarquant sur l'île, nous remarquons rapidement les **Labbes parasites et les Grands labbes** qui la survolent. Nous découvrons ensuite une colonie d'**une dizaine de couples de Sternes arctiques**. La déambulation sur l'île nous permet d'observer les deux Labbes dont certains couvent mais la plupart en sont encore au stade de la parade. Les falaises (jusqu'à 120 mètres de hauteur) se révèlent également très bien fournies en alcidés. Entre 75 000 et 100 000 couples d'oiseaux marins se reproduisent sur l'île dont une majorité de **Guillemots de troïl** et de **Pingouins torda** mais également des milliers de **Fulmars boréaux**, des centaines de **Mouettes tridactyles**, quelques **Macareux moines** et **Guillemots à miroir**. Le passage au bord de la mare de l'île nous permet d'observer environ **70 Grands labbes** en train de se toiletter ensemble, elle semble fréquentée en permanence avec un turn-over important. Nous

observons donc probablement au moins **200 Grands labbes** sur l'île alors que le **Labbe parasite** présente des effectifs plus réduits. Le Lagopède d'Écosse est également noté sur l'île mais nous n'aurons pas la chance de l'y observer.



Figure 2 : Labbe parasite

Le **Grand corbeau** est également bien présent et 4 individus seront observés au-dessus de la plage en attendant le bateau du retour.

De retour à terre, nous reprenons la route en direction de Durness. Nous observons à nouveau des cerfs au bord de la route. Dans la Baie de Balnakeil, nous observons **3 Plongeurs imbrins** et **4 Guillemots à miroir**. En longeant la baie et les petites falaises vers l'ouest après le golf, nous découvrons une petite colonie avec quelques **Fulmars boréaux**, **Cormorans huppés** et un **Guillemot à miroir** sur son nid. Ce sera notre seule observation de cette espèce au nid. Nous montons la tente sur les pelouses aéro-halines au niveau du parking du golf face à la baie.



Figure 3 : Bivouac face à la baie de Balnakeil



28/05 :

Au petit matin, nous entreprenons d'explorer la pointe. Dans la baie pêchent des **Sternes caugeks** montrant un comportement qui laisse penser à la présence d'une colonie non loin au Sud-est de la baie mais non découverte (non recherchée non plus). Nous faisons un crochet pour jeter un coup d'œil rapide sur le marais mais à contrejour malheureusement. Nous y observons un **Canard siffleur** sur son nid mais également des **Canards chipeaux** et **souchets** alors qu'un **Chevalier sylvain** parade bruyamment, à priori un migrateur d'après les ornithos écossais rencontrés sur le site. **Une oie à bec court** est posée dans une

dépression dunaire. En nous dirigeant vers la falaise, nous faisons décoller un **Œdicnème criard** qui se pose à découvert sur la dune en face de nous à environ 50 mètres et se laisse bien observer avant de disparaître en contrebas. Nous poursuivons et découvrons les falaises qui sont là encore bien garnies en oiseaux marins. Là encore les **Guillemots de troil**, **Pingouins torda**,



Figure 4 : Oie à bec court à Durness


**Fulmars boréaux** et **Mouettes tridactyles** se comptent en dizaines de milliers. **Une 50aine de Macareux moines** et **une 30aine de Guillemots à miroir** sont aussi présents. Quelques **Grands labbes** longent les falaises et se posent parfois au milieu de la lande et **2 Linottes à bec jaune** se laissent observer posées. Deux petites colonies d'**Hirondelles de rivages** seront également observées dans les dunes.

En rentrant au parking vers 13 heures, nous faisons alors part de notre observation d'Œdicnème criard le matin au groupe d'ornithos écossais présent. Il se révèle alors que l'espèce est une rareté en Ecosse. L'un d'eux, surexcité nous demande si nous pouvons l'emmener voir là où nous l'avons observé. Il nous apprend également qu'une femelle de Phalarope à bec étroit a été observée dans le marais le matin. Nous décidons alors de nous séparer, l'un va sur le phalarope, et l'autre sur l'Œdicnème. Après environ une heure de recherche, nous retrouvons l'œdicnème et tout le groupe d'écossais débarque pour l'observer. Notre interlocuteur écossais nous indique alors qu'il s'agit probablement de la première donnée pour les Highlands et autour de la dixième pour l'Ecosse. Après vérification, il s'agit en fait de la 2<sup>ème</sup> donnée pour les Highlands et la 31<sup>ème</sup> pour l'Ecosse, les autres étant probablement pour la plupart sur les îles Hébrides et les Shetlands. Cependant, même si c'est une espèce sympa que l'on ne pensait pas croiser ici, nous aurions quand même préféré observer le Phalarope que l'on ne retrouvera pas, le gros loupé du séjour.




Notre interlocuteur nous indique également que le marais est très bon pour les américains en période de migration, on le comprend aisément vu la position géographique du site à la pointe Nord-ouest de l'Ecosse.

Nous quittons alors Durness pour rejoindre Bettyhill, nous décidons de faire un détour par l'intérieur des terres pour longer le Loch Loyal qui, d'après les ornithos croisés à Durness, serait bon pour le Pygargue à queue blanche et l'Aigle royal. Nous n'observerons pas ces deux espèces malheureusement. Les seules observations de ce parcours seront quelques **Oies cendrées** avec leurs nichées, **2 Harles huppées**, un **Chevalier aboyeur** en parade, **3 Sarcelles d'hiver** et **une Bécassine des marais** en parade également. Ca fait peu d'oiseaux rapporté au kilomètre mais le paysage est toujours magnifique (Cf. photo de couverture). Nous dormons à Bettyhill.



29/05 :

Dès le matin, nous prenons la route en direction de Dunnet Head.



En baie de Dunnet, nous observons un **Plongeon imbrin** et 3 **Macreuses noires** puis nous nous dirigeons vers la pointe de Dunnet Head où se trouve une grosse colonie d'oiseaux marins. Là encore les **Guillemots de troil**, **Pingouins torda**, **Fulmars boréaux** et **Mouettes tridactyles** se comptent par dizaines de milliers. Quelques **Grands labbes** et **Labbes parasites** longent les falaises et se posent parfois dans la lande. Le site est également connu pour abriter le **Lagopède d'Ecosse**. Après environ 45 minutes d'une marche difficile dans la lande tourbeuse, nous finissons par en faire décoller un, une observation bien furtive.

Nous nous dirigeons alors vers une petite réserve naturelle pourvue d'observatoires au bord du St-John's Loch. Nous y observons une belle colonie de **Sternes caugeks**, **Mouettes rieuses**. **2 couples de Sterne arctique** semblent aussi cantonnés.



Figure 5 : Sterne arctique au milieu de la colonie de Mouettes rieuses et de Sternes caugeks



Nous nous dirigeons également vers Dunscanby Head où nous passons la nuit.



30/05 :

La journée commence par la prospection de la colonie de Dunsanby Head. Nous y observons la encore de nombreux alcidés et notamment **plusieurs dizaines de Macareux moines, 6 Guillemot à miroir, ainsi que quelques Grand labbes, 10 Eiders à duvet, et un Hibou des marais.** Un des secteurs de la falaise permet d'approcher les Macareux moines relativement près et un autre le permet également pour les **Pingouins tordas et les Guillemots de troil.**



Figure 6 : Fulmar boréal à Dunsanby Head



Figure 7 : Guillemots à miroir devant la colonie de Dunsanby Head

A notre retour au parking nous observons **une douzaine de Linottes à bec jaune.** L'espèce semble supplanter la Linotte mélodieuse sur la côte nord de l'Ecosse.



Figure 8 : Linotte à bec jaune sur le parking de Dunsanby Head

Nous quittons alors la côte nord pour rejoindre les Cairngorns. Nous faisons un arrêt au port de Wick où nous observons une petite colonie d'une dizaine de couples de **Sterne pierregarin** installée sur le toit en taule d'un bâtiment du port.

Nous repartons et faisons un nouvel arrêt à Littleferry, le Loch Fleet est connu pour l'**Eider à duvet**. Nous y observons entre 150 et 200 individus et un **Balbuzard pêcheur** fait un passage rapide. Nous y trouverons également plusieurs épreintes de **Loutre d'Europe**. Nous reprenons la route et observons sur la route avant Inverness 2 **Faucons pèlerins** et un peu plus loin un **Milan royal**. Nous arrivons en fin d'après-midi à Aviemore où nous réservons deux lits à l'auberge de jeunesse. Une balade sur le coteaux au-dessus de l'auberge, nous observons **2 Pouillots siffleurs**, plusieurs **Gobemouches gris** et **2 Pipits des arbres**. Une aire de **Faucon pèlerin** est présente sur la falaise et une webcam permet de suivre la nidification depuis le salon de l'Auberge de jeunesse.

31/05 :

Nous entreprenons de monter le mont Cairngorm depuis le départ du téléphérique. L'ascension fait environ 600 mètres et il faut prévoir environ 2 heures de montée. Dès les premiers mètres nous observons un **Merle à plastron** chanteur. Sur le coteau se font entendre des **Lagopèdes d'Écosse** dans les bruyères et des **Lièvres variables** y sont également visibles.



Figure 9 : Lièvre variable sur le mont Cairngorm

Un Lagopède se laisse même observer posé à 2 mètres. Nous montons à pieds dans une épaisse brume et le silence. Arrivés au sommet, le ciel se dégage légèrement entre les passages de nuages.



Figure 10 : Paysage rocailleux en haut du Cairngorm

Nous y observons un couple de **Bruants des neiges**, la femelle transporte des matériaux pour le nid et le mâle chante à tue-tête.



Figure 11 : Mâle et femelle de Bruant des neiges en haut du Cairngorm

Nous décidons ensuite de rechercher le **Pluvier guignard** pour lequel le milieu semble favorable. En 5 minutes nous découvrons un couple plutôt remuant qui s'envolera rapidement.

Nous continuons alors à prospecter et parcourons la pente Sud sur laquelle nous découvrons un autre **Pluvier guignard**. Celui-ci piète et nous emmène probablement loin de son nid.



Figure 12 : Pluvier guignard en haut du Cairngorm



Figure 13 : Lagopède alpin en haut du Cairngorm

Sur le coteau sud nous observons également **3 Lagopèdes alpins** dont un couple cantonné et plusieurs **Lièvres variables**.

Nous redescendons à la voiture plutôt contents de cette ascension. Nous reprenons ensuite la route pour Gardenstown. Ce petit port abrite une **50aine d'Eiders à duvet** dont une femelle couvant 2 œufs au pied de la digue. Quelques autres sont aussi présents dans le port. Nous allons ensuite à Troup Head où nous passons la nuit.

01/06 :



Le site de Troup Head n'est pas aisé à trouver. Nous avons dut demander notre chemin à Gardenstown. Le site abrite la seule colonie continentale de **Fou de bassan** du Royaume-Uni. Environ 5000 couples s'y reproduisent avec de **nombreux alcidés et Mouettes tridactyles**. Le Guillemot à miroir et le Macareux moine en sont absents. La proximité des oiseaux est vraiment exceptionnelle. Dommage que la lumière n'était pas au rendez-vous.






Figure 14 : Au cœur de la colonie de Fous de bassan à Troup Head



Figure 15 : Prise de bec au sens propre pour une place sur la colonie

Nous reprenons ensuite la route pour descendre à Stonehaven. Nous faisons des arrêts dans les grands ports de pêche de Fraserburgh et de Peterhead pour rechercher d'éventuels goélands arctiques mais sans succès. Nous y ferons une lecture de goéland argenté d'un programme local. Nous arrivons à Stonehaven où nous passons la nuit.

02/06 :



Nous accédons à la colonie au lieu-dit Crawton. La colonie s'étend ce lieu-dit jusqu'au Dunnottar Castle. Le site accueille environ 130 000 couples. A la différence des autres colonies que nous avons visitées jusqu'à présent, nous y avons trouvé **peu de Fulmars boréaux**. Quelques **Grands labbes** longent également les falaises. C'est ce site qui offre les meilleures conditions d'observations pour les **Pingouins torda**, les **Mouettes tridactyles** et les **Guillemots de troil**. **2 Macareux moines** sont également observés.



Figure 16 : Mouette tridactyle sur ses œufs et Guillemot de troil à Stonehaven



Figure 17 : Falaise bien garnie de Stonehaven



Figure 18 : Macareux moine à Stonehaven

Nous descendons ensuite vers Edimbourg par la côte en faisant un arrêt à Anstruther où se trouve l'embarcadère pour l'île de May. Nous voyons May et Bass Rock depuis la côte. **Quelques Eiders à duvet** sont présents avec notamment deux nichées.

Liste des espèces d'oiseaux rencontrées (122 espèces) :

Nom français	Nom latin	Commentaire
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	Présent en petit nombre sur la côte est dans les ports et estuaires
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	1 ind. sur le Loch Shin
Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>	1 ind. à Durness
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	Commune surtout au nord d'Inverness sur la côte et au bord des lochs
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	2 ind. entre Ardgay et Bonar Bridge
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	Plusieurs individus à Durness
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	Plusieurs individus à Durness
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	Plusieurs contacts et notamment un couveur à Durness
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	Plusieurs cpl à Durness et à Dunnet head
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>	Commun sur la côte
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	3 ind. en baie de Dunnet Head
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	10 ind. entre Ardgay et Bonar Bridge
Harle huppée	<i>Mergus serrator</i>	Plusieurs cpl un peu partout sur des lochs ou en mer
Lagopède d'Ecosse	<i>Lagopus lagopus scotica</i>	1 ind. à Dunnet Head et plusieurs au dessus du téléphérique du Cairngorm
Lagopède alpin	<i>Lagopus muta</i>	3 ind. sur la face sud du Cairngorm
Faisan de colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	Le plus commun
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	2 ind. entre Inverness et Tarbet
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	3 ind. à Durness et 1 en baie de Dunnet Head
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1 ind. à Tarbet
Fulmar boréal	<i>Fulmarus glacialis</i>	Commun sur toutes les falaises côtières
Fou de bassan	<i>Morus bassanus</i>	Commun au large des colonies d'oiseaux marins et sur la colonie de Troup Head
Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Commun
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	Peu commun (<5 contacts)
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	1 ind. à Littleferry et 2 à Aviemore

Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	1 au dessus de la route au Nord d'Inverness
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	2 ind. au Nord de Anstruther
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	Peu commun (<5 contacts)
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	2 ind. au dessus de la route au Nord d'Inverness. Aire au dessus de l'auberge de jeunesse d'Aviemore.
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	1 ind. dans le marais de Durness
Gallinule poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	
Huitrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	Très commun sur la côte et dispersé dans l'intérieur
Œdicnème criard	<i>Burhinus oediconemus</i>	1 ind. à Durness, très rare en Ecosse
Grand gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	Nicheur commun sur la côte
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	1 couple + 1 ind. cantonné en haut du Cairngorm
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	Dispersé dans l'intérieur, 1 nicheur à Dunnet Head
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	Petit groupe à Durness
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	
Chevalier sylvain	<i>Tringa glaerola</i>	1 ind. en parade à Durness
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	Nicheur commun
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	1 contact auditif à Durness
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	1 ind. en parade sur un petit Loch au bord de la A836 au sud de Tongue sur un petit loch
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	Commun
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	Plusieurs chanteurs dans l'intérieur au Nord d'Inverness
Grand labbe	<i>Stercorarius skua</i>	Commun sur toutes les colonies d'oiseaux marins
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Présent à Handa et Dunnet Head
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Commune
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	Commun
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	Commun
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	Commun
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	Commune sur les colonies
Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>	Commune
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	Contactée à Handa et Wick
Sterne arctique	<i>Sterna paradisea</i>	Petite colonie à Handa et 2 cpl à

		Dunnet Head
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	Présent en petit nombre sur la plupart des colonies d'oiseaux marins
Guillemot à miroir	<i>Cephus grylle</i>	Présent en petit nombre sur les colonies de la côte Nord entre Handa et Dunscahy Head
Guillemot de troil	<i>Uria aalge</i>	Commun sur les colonies
Pingouin torda	<i>Alca torda</i>	Commun sur les colonies
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	Commun sur les colonies
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	Commun notamment dans les immenses landes tourbeuses
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	1 ind. à Dunscahy Head
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	Omniprésente
Hirondelle de rivages	<i>Riparia riparia</i>	
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	
Hirondelle de fenêtres	<i>Delichon urbicum</i>	
Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>	
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	2 ind. à Aviemore
Bergeronnette de yarell	<i>Motacilla alba yarrelli</i>	
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	1 ind. entre Inverness et Tarbet
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquatus</i>	
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	2 ind. au dessus du téléphérique du Cairngorm
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	Peu commune au Nord de Durness, plus commune au Sud dans les ajoncs
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Assez commun
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	2 chanteurs entre Inverness et Tarbet

Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Omniprésent
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2 chanteurs au dessus de l'auberge de jeunesse d'Aviemore
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	Contacté à Aviemore
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	Contacté à Aviemore
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	2 ind. au dessus de l'auberge de jeunesse d'Aviemore
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	1 ind. entre Anstruther et Edimbourg
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	Commun
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	Commun
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	Commune au Nord d'Inverness, absente au sud
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	Commun sur les colonies d'oiseaux marins de la côte Nord
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	Plusieurs ind. à la mangeoire de la réserve naturelle du Loch Strathbeg entre Fraserburgh et Peter Head à l'occasion d'un pique-nique
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	Commune au Sud d'Inverness
Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>	Commune sur les pelouses aéro-halines et pâtures de la côte Nord
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Peu commun (<5 contacts)
Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Un couple + 1 chanteur en haut du Cairngorm
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	Commun au Sud d'Inverness
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	1 ind. au bord de route près de la colonie de Troup Head

### Commentaire général :

La période de fin mai / début juin est probablement un peu précoce pour aller en Écosse. Tous les nicheurs sont présents mais tous ne sont pas cantonnés notamment les plongeurs qui ne semblaient pas cantonnés sur les Lochs. Ceci d'autant plus que des Écossais avec qui nous avons échangé, qui sont très sympa et toujours prêts à nous renseigner pour voir telle ou telle espèce ou accéder à un site dont l'accès ne semble pas évident, nous ont indiqué que toutes les espèces semblaient particulièrement en retard cette année. De même, sur les colonies, tout le monde n'avait pas encore pondu et nous n'avons donc pas pu voir le nourrissage de jeunes par exemple. En revanche, nous avons vu plusieurs espèces en parade, à la fois les oiseaux marins sur les colonies mais aussi des limicoles. Nous avons également pu voir des migrateurs tardifs que nous n'aurions sans doute pas observés quelques semaines plus tard comme le Cygne chanteur, l'Oie à bec court ou le Chevalier sylvain.

Par ailleurs, à cette période, les ajoncs sont bien en fleurs et offrent des vues de coteaux entièrement jaunes magnifiques et les linigrettes sont déjà bien développées. La fin d'été / début d'automne doit être magnifique lorsque les bruyères sont en fleur. Au niveau des paysages, les Cairngorms et les landes tourbeuses du Nord-ouest de l'Écosse sont vraiment magnifiques. La côte Est que nous avons parcourue est plus agricole.

Au niveau des espèces, nous n'avons pas fait la course aux espèces mais avons préféré profiter des colonies d'oiseaux marins et cibler quelques espèces comme le Pluvier guignard et le Bruant des neiges. Ainsi nous avons loupé quelques espèces que nous aurions aimé voir comme le Pygargue à queue blanche qui semble vraiment localisé sur les îles de la côte ouest ou encore le Sizerin flammé et le Bec-croisé d'Écosse que nous pensions croiser dans les boisements des Cairngorms. Nous avons cependant pas prospecté les boisements, c'est ainsi que nous n'avons croisé aucun pic, ni le Grimpereau des bois. Nous pensions également croiser quelques Garrots à œil d'or sur les lochs mais ce ne fut pas le cas.

Site internet utile :

<http://www.highlandbirds.scot/sightings.html>